

DONNÉES DE *VIGIE* ET DE *SURVEILLANCE*

Direction régionale de santé publique de Montréal

28 novembre 2025

RECUEIL STATISTIQUE SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL À MONTRÉAL

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
Liste des tableaux	4
Liste des acronymes.....	5
1. Tableau synthèse	6
2. Portrait de la consommation d'alcool à travers le pays.....	7
3. Portrait de la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.....	11
4. Portrait de la fréquence de consommation d'alcool	13
5. Portrait de la consommation excessive.....	19
6. Portrait du dépassement des limites hebdomadaires.....	25
7. Portrait de la consommation d'alcool chez les jeunes du secondaire	26
8. Portrait de l'utilisation des services médicaux	27
9. Portrait des hospitalisations à Montréal et au Québec	28
10. Portrait de la mortalité	32
Annexe A – Codes de diagnostic attribuables à l'alcool (CIM-10)	33
Annexe B – Codes pour la cause de décès imputable à la consommation d'alcool (CIM-10)	35
11. Références	36

INTRODUCTION

Ce premier recueil statistique présente les données d'enquêtes les plus récentes sur la consommation d'alcool à Montréal et au Québec. Plusieurs enquêtes et bases de données ont été utilisées pour la réalisation de ce recueil.

Les données d'enquêtes :

1. ***Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes*** (ESCC, 2000 à 2020) a permis de tracer l'évolution de la consommation d'alcool de la population de 12 ans et plus.
2. ***Enquête québécoise sur la santé de la population*** (EQSP, 2020-2021) permet de documenter pour une première fois la consommation d'alcool auprès de la population de 15 ans et plus et d'analyser le phénomène à la lumière de différents indicateurs de santé.
3. ***Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*** (EQSJS, 2022-2023), menée auprès de jeunes de 12 à 17 ans fréquentant les écoles secondaires de la région, permet de documenter la consommation d'alcool au sein de cette population.
4. ***Statistique Canada*** (2004-2023). Tableau 10-10-0010-01. Ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d'autres points de vente au détail, selon la valeur, le volume et le volume absolu. DOI : <https://doi.org/10.25318/1010001001-fra>

Les consultations à l'urgence, les hospitalisations et la mortalité :

Pour tracer le portrait global des conséquences graves de l'abus d'alcool pour la santé, les consultations à l'urgence, les hospitalisations et la mortalité totalement (100 %) attribuables à l'alcool ont été examinées.

Plus précisément, l'exploration s'est faite sur les pathologies entièrement imputables à la consommation d'alcool et qui ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu de consommation d'alcool.

Pour ce faire, les bases de données suivantes ont été consultées et les données ont été sélectionnées en suivant les codes de diagnostic CIM-10 attribuables à l'alcool (annexe A) et ceux pour la cause de décès CIM-10 imputable à la consommation d'alcool (annexe B) :

Les données du registre médico-administratif :

1. **Fichier de données du système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) – 2022-2023 et 2023-2024 (lorsque disponible)**
 - Troubles de l'utilisation ou troubles induits
 - Intoxication
 - Diagnostic principal à l'alcool
 - <https://www.inspq.qc.ca/boite-outils-pour-la-surveillance-post-sinistre-des-impacts-sur-la-sante-mentale/systemes-de-surveillance/systeme-integre-de-surveillance-des-maladies-chroniques-du-quebec-sismacq>
2. **Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)**
 - Fichier des décès – 2015 à 2021
 - <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/red-d/>
 - Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO – périodes de 2018 à 2024
 - <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/med-echo/>

Les codes CIM-10 de diagnostics de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS, 2022) :

1. **L'annexe A** présente les codes de diagnostics CIM-10 pour les admissions à l'hôpital attribuables à l'alcool (ou les codes de fraction 100 % attribuables à l'alcool) :
 - Conditions médicales et causes externes
 - Troubles mentaux et comportementaux
 - Intoxication
2. **L'annexe B** présente les codes pour la cause initiale de décès 100 % imputable à la consommation d'alcool :
 - Causes chroniques
 - Causes aiguës

Notons que les taux d'hospitalisations liées à la consommation d'alcool doivent être interprétés avec prudence, car ils font référence au nombre d'admissions à l'hôpital et non au nombre de patients.

NOTES AUX LECTEURS

Plusieurs signes conventionnels sont utilisés tout au long de ce recueil statistique. Lorsqu'un de ces signes conventionnels sera utilisé, celui-ci sera indiqué au bas de chaque tableau.

Signes conventionnels utilisés

Les données non présentées

Dnp : Donnée non présentée en raison d'un faible nombre (n<5).

Lorsque le nombre dans une cellule est inférieur à 5, il est nécessaire de procéder au masquage de données, selon les normes établies dans le guide méthodologique de l'*EQSP*.

Les différences statistiquement différentes

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec pour un même indicateur ou une même catégorie, et ce, au seuil de 5 % ou au seuil de 1 %.

↑/↓ : Pour le même indicateur ou le même territoire, la proportion la plus élevée est significativement différente de la plus faible parmi les catégories, et ce, au seuil de 5 % ou au seuil de 1 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, et ce, au seuil de 5 % ou au seuil de 1 %.

Les coefficients de variation (CV)

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ou entre 16,66 % et 33,33 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ou à 33,33 % ; à titre d'information seulement.

Le taux ajusté ou la proportion ajustée pour l'âge

Cela signifie que le résultat prend en compte la structure d'âge de la population, genres réunis, de la population de l'ensemble du Québec en 2011. Lorsque c'est le cas, la mention « **ajusté** » est ajoutée au titre du tableau (p. ex., taux ajusté ou proportion ajustée).

Québec et le reste du Québec

La catégorie « Ensemble du Québec » fait référence, pour sa part, aux 18 régions sociosanitaires (RSS) alors que le « reste du Québec » fait référence à l'ensemble des régions du Québec, à l'exception de la RSS de Montréal.

Liste des tableaux

Tableau 1 – Tableau synthèse des principaux résultats de la consommation d'alcool chez la population de 15 ans et plus, selon le type de consommation, Montréal, 2020-2021	6
Tableau 2 – Répartition de la population canadienne de 18 ans et plus, selon un niveau de risque lié à la consommation d'alcool, le genre, le groupe d'âge et la province, Canada, à l'exclusion des territoires, 2023	7
Tableau 3 – Consommation moyenne d'alcool per capita en litres d'alcool pur, population de 15 ans et plus, Québec et Canada, 2004-2005 à 2022-2023	9
Tableau 4 - Proportion de la population de 12 ans et plus, ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon le genre, à Montréal et au Québec, 2007-2008 à 2019-2020	10
Tableau 5 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques, à Montréal et au Québec, 2020-2021	11
Tableau 6 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, selon le genre et le groupe d'âge, à Montréal et au Québec, 2020-2021	12
Tableau 7 - Répartition de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois et de certaines caractéristiques, à Montréal et au Québec, 2020-2021	13
Tableau 8 - Répartition de la population 15 ans et plus selon la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois, le genre et le groupe d'âge, à Montréal et au Québec, 2020-2021	15
Tableau 9 – Répartition de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois et certaines caractéristiques spécifiques de la population montréalaise, Montréal, 2020-2021	16
Tableau 10 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon certaines caractéristiques, à Montréal et au Québec, 2020-2021	19
Tableau 11 - Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon le groupe d'âge et le genre, à Montréal et au Québec, 2020-2021	20
Tableau 12 - Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon certaines caractéristiques de la population montréalaise, Montréal, 2020-2021	21
Tableau 13 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon le RTS, le RLS et le genre, Montréal, 2020-2021	23
Tableau 14 - Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un dépassement des limites hebdomadaires en consommation d'alcool, à Montréal et au Québec, 2000-2001 à 2019-2020	25
Tableau 15 - Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, à Montréal et au Québec, 2022-2023	26
Tableau 16 - Proportion ajustée d'utilisation d'un service médical parmi la population de 12 ans et plus ayant des troubles liés à l'alcool seulement, selon le genre, à Montréal et au Québec, 2018-2019 à 2022-2023	27
Tableau 17 – Proportion pour mille (%) d'hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool selon les codes de diagnostic de l'ICIS, Montréal et Québec, 2018-2019 à 2022-2023	28
Tableau 18 – Taux ajusté d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool en diagnostic principal selon la définition de l'ICIS ¹ , pour 10 000 personnes, à Montréal et au Québec, 2015-2018 à 2021-2024	29
Tableau 19 - Taux d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool en diagnostic principal selon la définition de l'ICIS ¹ , pour 10 000 personnes, selon le genre et l'âge, à Montréal et au Québec, 2015-2018 à 2021-2024	30
Tableau 20 – Proportion d'hospitalisations pour affections au foie liées à l'alcool sur l'ensemble des affections au foie, à Montréal et au Québec, 2022-2023	32
Tableau 21 – Mortalité causée par les troubles liés à l'utilisation de l'alcool, à Montréal et au Québec, 2016-2021	32

Liste des acronymes

Acronymes	Nom complet
CCSMTL	Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal
CIUSSS	Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
DRSP	Direction régionale de santé publique
EQSJS	Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire
EQSP	Enquête québécoise sur la santé de la population
ESCC	Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
ICIS	Institut canadien d'information sur la santé
INSPQ	Institut national de santé publique du Québec
ISQ	Institut de la statistique du Québec
MSSS	Ministère de la santé et des services sociaux
RCAS	Repères canadiens sur l'alcool et la santé
RLS	Réseaux locaux de services
RSS	Région sociosanitaire
RTS	Réseaux territoriaux de services

1. TABLEAU SYNTHÈSE

Le Tableau 1 présente la population montréalaise de 15 ans et plus selon chacune des trois catégories de consommation d'alcool, et ce, en fonction de variables telles que les caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques, l'état de santé général et mental, ainsi que la consommation de certaines substances.

Ce tableau synthèse peut se lire de la façon suivante : au sein de la population montréalaise de 15 ans et plus, ceux qui ne consomment pas d'alcool sont plus souvent des femmes, des personnes âgées entre 15 et 24 ans, ayant un faible niveau de scolarité, nées à l'extérieur du pays, ayant un faible revenu, une mauvaise perception de leur état de santé générale et ne consommant pas d'autres substances psychoactives.

Tableau 1 – Tableau synthèse des principaux résultats de la consommation d'alcool chez la population de 15 ans et plus, selon le type de consommation, Montréal, 2020-2021

Type de consommation d'alcool chez la population de 15 ans et plus			
	Aucune consommation	Consommation quotidienne	Consommation excessive ¹
Sociodémographiques			
Genre	Femmes	Hommes	Hommes
Âge	15-24 ans	65 ans et plus	25-44 ans
Niveau de scolarité	Inférieur au DES	ns	DEC Diplôme collégial
Occupation principale	Aux études ou sans emploi	Retraité	Au travail
Composition du ménage	Couple avec enfants	Couple sans enfant	Personne vivant seule
Langue parlée à la maison	Ni français ni anglais	Au moins le français	Au moins le français
Naissance au Canada	Non	Oui	Oui
Socioéconomiques			
Revenu du ménage	Faible revenu	Revenu élevé	Revenu élevé
Défavorisation matérielle	Quartile 4 (défavorisé)	Quartile 1 (favorisé)	Quartile 1 (favorisé)
Santé générale et santé mentale			
Perception de sa santé	Mauvaise ou passable	ns	Excellent ou très bonne
Satisfaction à sa vie sociale	Satisfaisante	ns	Insatisfaisante
Santé mentale			
Détresse psychologique	ns	ns	Élevé
Trouble de stress post traumatisque	ns	ns	ns
Symptômes d'anxiété généralisée	ns	ns	Oui
Consommation de tabac et d'autres substances psychoactives			
Tabagisme	Non-fumeurs	Fumeurs quotidiens	Fumeurs quotidiens
Cigarette électronique	Non	ns	Oui
Consommation de cannabis	Non	ns	Oui
Consommation de drogues	Non	ns	Oui

1 : La consommation excessive d'alcool représente une consommation, en une même occasion, d'au moins cinq verres d'alcool chez les hommes et d'au moins quatre verres d'alcool chez les femmes, et ce, au moins une fois par mois sur une période de 12 mois.

ns = non significatif signifie qu'il n'y a aucune différence significative entre les proportions.

2. PORTRAIT DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL À TRAVERS LE PAYS

AU CANADA ET DANS LES PROVINCES¹

Le Tableau 2 présente la répartition de la population canadienne de 18 ans et plus selon le niveau de risque lié à la consommation d'alcool, le genre, le groupe d'âge et la province, à l'exclusion des territoires. Les niveaux de risque sont : 1) Aucun risque (0 verre standard par semaine), 2) Risque faible (1 à 2 verres standards par semaine), 3) Risque modéré (3 à 6 verres standards par semaine) et 4) Risque de plus en plus élevé (7 verres standards ou plus par semaine).

Tableau 2 – Répartition de la population canadienne de 18 ans et plus, selon un niveau de risque lié à la consommation d’alcool, le genre, le groupe d’âge et la province, Canada, à l’exclusion des territoires, 2023

	Niveau de risque lié à la consommation d'alcool			
	Aucun	Faible	Modéré	Élevé
	%			
Total pour le Canada (sauf les territoires)	54,4	15,2	15,2	15,1
Genre¹				
Hommes+	49,9	14,9	15,9	19,3
Femmes+	58,8	15,5	14,6	11,1
Âge				
18 à 22 ans	67,1	11,4	13,2	8,4
23 à 34 ans	55,3	14,6	15,8	14,2
35 à 44 ans	51,9	16,3	16,6	15,1
45 à 54 ans	50,7	16,7	16,0	16,6
55 à 64 ans	50,7	15,6	16,3	17,4
65 ans et plus	56,9	14,8	12,9	15,4
Provinces				
Terre-Neuve-et-Labrador	58,1	13,1	14,7	14,2
Île-du-Prince-Édouard	55,6	12,8	17,2	14,4
Nouvelle-Écosse	56,6	13,8	14,3	15,2
Nouveau-Brunswick	60,2	12,8	14,4	12,7



	Niveau de risque lié à la consommation d'alcool			
	Aucun	Faible	Modéré	Élevé
	%			
Québec	46,5	16,3	19,0	18,1
Ontario	57,6	14,9	13,5	14,0
Manitoba	57,4	14,4	14,0	14,1
Saskatchewan	58,8	15,4	13,3	12,5
Alberta	56,5	14,9	14,9	13,8
Colombie-Britannique	53,3	15,6	15,2	15,9
Type de région				
Urbaine	55,5	15,2	14,9	14,4
Rurale (moins de 1 000 habitants)	48,8	15,1	16,9	19,2

1 : Le signe + désigne l'inclusion des personnes non binaires dans les deux catégories de genre.

Source : Statistique Canada (2024). *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC 2023).

AU QUÉBEC ET AU CANADA

Tableau 3 – Consommation moyenne d'alcool per capita en litres d'alcool pur, population de 15 ans et plus, Québec et Canada, 2004-2005 à 2022-2023

		Évolution de la consommation d'alcool en litres d'alcool pur par personne par année						
		2004-2005	2007-2008	2010-2011	2013-2014	2016-2017	2019-2020	2022-2023
Québec	Vins	2,3	2,6	2,9	2,9	3,0	3,1	2,9
	Bières	4,7	4,6	4,6	4,4	4,1	3,9	3,6
	Spiritueux	0,9	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6
	Total	8,0	8,5	8,7	8,5	8,4	8,5	8,3
Canada	Vins	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9
	Bières	4,2	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,1
	Spiritueux	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2
	Total	8,0	8,4	8,2	8,0	8,2	8,1	7,8

Source : Statistique Canada (2004-2023). Tableau 10-10-0010-01. Ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d'autres points de vente au détail, selon la valeur, le volume et le volume absolu.

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Tableau 4 - Proportion de la population de 12 ans et plus, ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon le genre, à Montréal et au Québec, 2007-2008 à 2019-2020

	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	2019-2020
Montréal							
Total	78,1 (-)	78,6 (-)	75,8 (-)	75,8 (-)	76,8 (-)	77,0 (-)	74,0 (-)
Genre							
Hommes	80,3 (-)	82,1	78,2 (-)	78,9 (-)	82,2	80,0 (-)	78,6 (-)
Femmes	76,0 (-)	75,3 (-)	73,5 (-)	72,8 (-)	71,7 (-)	74,2 (-)	69,5 (-)
Québec							
Total	81,9	82,8	81,7	81,9	81,6	81,3	79,8
Genre							
Hommes	84,2	85,4	83,8	84,1	84,3	83,5	82,4
Femmes	79,8	80,3	79,8	79,8	78,9	79,2	77,3

1 : La comparaison entre les cycles de l'enquête va comme suit : de 2007-2008 à 2013-2014 et de 2015-2016 à 2019-2020.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 1 %.

Source : Statistique Canada (2000-2020). Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'*Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC 2007-2008 à 2019-2020).

3. PORTRAIT DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Cet indicateur représente la proportion de personnes qui ont consommé de l'alcool au moins une fois au cours des 12 derniers mois (EQSP, 2020-2021).

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Tableau 5 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois selon certaines caractéristiques, à Montréal et au Québec, 2020-2021

Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois chez la population de 15 ans et plus		
	Montréal	Québec
	%	%
Total	73,2 (-)	79,3
Genre		
Hommes	76,5 (-)	81,1
Femmes	70,0 (-)	77,5
Âge		
15 à 24 ans	64,2 ↓ (-)	73,9 ↓
25 à 44 ans	75,9 ↑ (-)	83,3 ↑
45 à 64 ans	74,0 (-)	80,6
65 ans et plus	73,3	75,0
Niveau de scolarité		
Inférieur au DES	53,1 ↓ (-)	63,9 ↓
Diplôme d'études secondaires (DES)	68,3 (-)	78,6
Diplôme d'études collégiales	78,0 (-)	84,9 ↑
Diplôme d'études universitaires	79,4 ↑ (-)	84,4
Occupation principale		
Au travail	77,7 ↑ (-)	84,4 ↑
Aux études	62,7 ↓ (-)	71,1
Sans emploi	62,9	64,7 ↓
À la retraite	73,8 (-)	76,2
Composition du ménage		
Personne vivant seul	76,3	76,1 ↓
Couple sans enfant	83,4 ↑	84,9 ↑
Couple avec enfants	66,7 ↓ (-)	79,1
Famille monoparentale	68,5 (-)	77,4

Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois chez la population de 15 ans et plus

	Montréal	Québec
	%	%
Revenu du ménage (MFR)		
Faible revenu	60,6↓ (-)	65,3↓
Revenu moyen-faible	71,5 (-)	78,8
Revenu moyen-élevé	80,7 (-)	86,2
Revenu élevé	86,6↑ (-)	89,2↑
Tabagisme		
Fumeurs quotidiens	81,2↑	78,2
Non-fumeurs	67,2↓ (-)	76,2

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑/↓ : Pour la même catégorie, la proportion la plus élevée est significativement différente de la plus faible, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %

Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP, 2020-2021).

SELON LE GENRE ET LE GROUPE D'ÂGE

Tableau 6 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, selon le genre et le groupe d'âge, à Montréal et au Québec, 2020-2021

Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois selon le genre et le groupe d'âge		
	Montréal	Québec
Âge	Genre	%
15 à 24 ans	Homme	60,4 (-)
	Femme	68,1 (-)
	Total	64,2 (-)
		73,9
25 à 44 ans	Homme	79,1 (-)
	Femme	72,6 (-)
	Total	75,9 (-)
		83,3
45 à 64 ans	Homme	78,5 (-)
	Femme	69,4 (-)
	Total	74,0 (-)
		80,6
65 ans et plus	Homme	80,5
	Femme	67,4 (-)
	Total	73,3
		75,0

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %

Source : ISQ (2021). Fichier maître de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP, 2020-2021).

4. PORTRAIT DE LA FRÉQUENCE DE CONSOMMATION D'ALCOOL

L'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP, 2020-2021) présente la fréquence de consommation d'alcool en quatre catégories distinctes :

1) Aucune consommation ; 2) 3 fois par mois ou moins ; 3) 1 à 6 fois par semaine et 4) Tous les jours. Notons que la consommation quotidienne, soit tous les jours, est une consommation d'alcool à risque, l'autre étant la consommation excessive abordée dans la prochaine section.

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Tableau 7 - Répartition de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois et de certaines caractéristiques, à Montréal et au Québec, 2020-2021

Fréquence de consommation d'alcool chez la population de 15 ans et plus								
	Montréal				Québec			
	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours
	% %				% %			
Total	26,9 (+)	33,0	34,8 (-)	5,3	20,7	32,1	41,5	5,6
Genre								
Hommes	23,6 (+)	30,7	38,8 (-)	6,9	18,9	29,0	44,7	7,4
Femmes	30,1 (+)	35,3	30,9 (-)	3,8	22,6	35,3	38,3	3,8
Âge								
15 à 24 ans	35,9↑ (+)	41,8↑ (-)	Dnp	Dnp	26,1↑	50,0↑	23,3↓	0,6**↓
25 à 44 ans	24,2↓ (+)	34,2	38,4 (-)	3,2↓	16,7↓	33,6	46,2	3,5
45 à 64 ans	26,0 (+)	28,8↓ (+)	38,6↑ (-)	6,5	19,4	26,8↓	47,4↑	6,3
65 ans et plus	26,9	30,4 (+)	31,3 (-)	11,4↑	25,1	27,9	36,7	10,3↑
Niveau de scolarité								
Inférieur au DES	47,2↑ (+)	31,3	17,0↓ (-)	4,6*	36,3↑	33,4	25,2↓	5,1↓
Diplôme d'études secondaires (DES)	31,7 (+)	35,4	27,5 (-)	5,4	21,4	34,5↑	37,7	6,3↑
Diplôme d'études collégiales	22,0 (+)	38,3↑ (+)	34,8 (-)	4,9	15,1↓	33,7	46,0	5,2
Diplôme d'études universitaires	20,6↓ (+)	30,3↓ (+)	43,2↑ (-)	5,9	15,6	28,3↓	50,1↑	6,0

Fréquence de consommation d'alcool chez la population de 15 ans et plus

	Montréal				Québec			
	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours
	%				%			
Composition du ménage								
Personne vivant seule	23,9	35,8	33,6	6,8	24,0↑	32,6	36,3↓	7,0
Couple sans enfant	16,6	28,1	46,2↑	9,1↓	15,1	27,6	49,1↑	8,2↓
Couple avec enfants	33,3↑ (+)	31,5	31,5	3,6↓	21,0	33,4	42,2	3,4↓
Famille monoparentale	31,5	41,7↑	Dnp	Dnp	22,7	37,6↑	36,3↓	3,4↓
Occupation principale								
Au travail	22,3↓ (+)	32,0	41,0↑ (-)	4,7↓	15,6↓	30,8	48,8↑	4,8
Aux études	37,3↑	39,2↑	Dnp	Dnp	28,9	48,5↑	21,9↓	0,7*↓
Sans emploi	37,2	33,6	24,0↓	5,2*	35,4↑	32,8	27,2	4,7
À la retraite	26,4 (+)	30,2↓ (+)	32,0 (-)	11,4↑	23,9	27,2↓	38,8	10,2↑
Revenu du ménage (MFR)								
Faible revenu	39,5↑ (+)	35,3	21,6↓ (-)	3,5↓ (-)	34,8↑	35,0↑	25,6↓	4,6↓
Revenu moyen-faible	28,6 (+)	35,9↑	30,8 (-)	4,7 (-)	21,3	34,1	38,8	5,9
Revenu moyen-élevé	19,3 (+)	34,6 (+)	39,6 (-)	6,5	13,8	31,3	49,3	5,6
Revenu élevé	13,4↓ (+)	23,7↓ (-)	55,1↑	7,8↑	10,8↓	26,3↓	56,3↑	6,6↑
Statut de fumeur								
Fumeurs quotidiens	18,9↓	31,7	37,7↑	11,7↑	21,9	30,6↓	36,6	10,9↑
Non-fumeurs	32,8↑ (+)	36,0	29,0↓ (-)	2,2↓	23,9	36,1↑	37,4	2,6↓

Dnp: Donnée non présentée en raison d'un faible nombre (n<5).

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ; à titre d'information seulement.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑/↓ : Pour la même catégorie, la proportion la plus élevée est significativement différente de la plus faible, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP 2020-2021).

SELON LE GENRE ET LE GROUPE D'ÂGE

Tableau 8 - Répartition de la population 15 ans et plus selon la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois, le genre et le groupe d'âge, à Montréal et au Québec, 2020-2021

		Fréquence de consommation d'alcool selon le genre et le groupe d'âge							
		Montréal				Québec			
Âge	Genre	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours
		% Dnp				% Dnp			
15 à 24 ans	Homme	39,6 (+)	36,2 (-)	Dnp	Dnp	28,3	46,1	25,0	0,6**
	Femme	32,0 (+)	47,5 (-)	Dnp	Dnp	23,8	54,2	21,4	0,6**
	Total	35,9 (+)	41,8 (-)	Dnp	Dnp	26,1	50,0	23,3	0,6**
25 à 44 ans	Homme	21,0 (+)	32,9	42,1 (-)	4,0*	15,1	30,6	49,5	4,7
	Femme	27,5 (+)	35,6	34,7 (-)	2,3*	18,4	36,7	42,7	2,2
	Total	24,2 (+)	34,2	38,4 (-)	3,2	16,7	33,6	46,2	3,5
45 à 64 ans	Homme	21,5 (+)	26,2	42,5 (-)	9,8	18,1	23,8	49,7	8,3
	Femme	30,6 (+)	31,6	34,6 (-)	3,2*	20,8	29,8	45,1	4,3
	Total	26,0 (+)	28,8 (+)	38,6 (-)	6,5	19,4	26,8	47,4	6,3
65 ans et plus	Homme	19,6	28,7 (+)	37,6 (-)	14,1	20,1	24,0	41,7	14,2
	Femme	32,8 (+)	31,8	26,2 (-)	9,2 (+)	29,5	31,4	32,3	6,9
	Total	26,9	30,4 (+)	31,3 (-)	11,4	25,1	27,9	36,7	10,3

Dnp : Donnée non présentée en raison d'un faible nombre (n<5).

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ; à titre d'information seulement.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP 2020-2021).

SELON CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION MONTRÉALAISE

Tableau 9 – Répartition de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois et certaines caractéristiques spécifiques de la population montréalaise, Montréal, 2020-2021

Fréquence de consommation d'alcool selon certaines caractéristiques de la population montréalaise de 15 ans et plus				
	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours
Total pour Montréal	26,9	33,0	34,8	5,3
Sociodémographiques				
Langue parlée à la maison				
Au moins le français	23,9↓	30,8↓	38,8↑	6,4↑
Au moins l'anglais mais pas le français	24,1	38,7↑	33,4	3,8*
Ni le français et ni l'anglais	46,4↑	33,9	17,0↓	2,7*↓
Pays de naissance				
Canada	18,6↓	32,1	42,2↑	7,0↑
Extérieur du Canada	38,1↑	34,2	24,7↓	3,0↓
Socioéconomiques				
Défavorisation matérielle (Indice régional)				
Quartile 1 (favorisé)	18,2↓	29,8↓	45,5↑	6,5↑
Quartile 2 et 3 (moyen)	25,0	33,8	35,4	5,8
Quartile 4 (défavorisé)	41,0↑	35,0↑	21,3↓	2,7*↓

Fréquence de consommation d'alcool selon certaines caractéristiques de la population montréalaise de 15 ans et plus

	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours				
	%							
Habitudes de vie								
Tabagisme								
Fumeurs quotidiens	18,9↓	31,7	37,7↑	11,7↑				
Non-fumeurs	32,8↑	36,0	29,0↓	2,2↓				
Vapotage de nicotine								
Oui	18,8*↓	34,7	41,4	5,1**				
Non	27,3↑	32,9	34,5	5,3				
Drogues								
Oui	6,3↓	36,2↑	51,4↑	6,1				
Non	32,3↑	32,1↓	30,5↓	5,1				
Cannabis								
Oui	5,9↓	36,8↑	51,1↑	6,2				
Non	32,0↑	32,1↓	30,8↓	5,1				
Santé générale								
Perception de sa santé								
Excellent ou très bonne	24,1↓	31,3↓	39,6↑	5,0				
Bonne	28,3	35,2	30,5	6,0				
Mauvaise ou passable	37,1↑	35,7↑	22,3↓	4,9*				
Satisfaction face à sa vie sociale								
Satisfaisante (ou très)	27,9↑	31,7↓	35,0	5,3				
Insatisfaisante (ou très)	21,5↓	38,8↑	34,6	5,1*				

Fréquence de consommation d'alcool selon certaines caractéristiques de la population montréalaise de 15 ans et plus

	Aucune	1 à 3 fois/mois	1 à 6 fois/sem.	Tous les jours
%				
Santé mentale				
Détresse psychologique				
Élevée	26,5	34,7	34,1	4,7
Faible ou moyen	26,8	31,8	35,7	5,7
Anxiété généralisée				
Oui	27,7	35,1	30,8	6,4**
Non	26,7	31,9	35,3	6,1
Trouble de stress post-traumatique				
Oui	38,1*	24,5*	30,5*	7,0**
Non	26,1	32,9	34,8	6,1

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 25 % ; à titre d'information seulement.

↑/↓ : Pour la même catégorie, la proportion la plus élevée est significativement différente de la plus faible, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP 2020-2021).

5. PORTRAIT DE LA CONSOMMATION EXCESSIVE

Dans l'Enquête québécoise sur la santé de la population (ESQP, 2020-2021), la consommation excessive d'alcool représente une consommation, en une même occasion, d'au moins cinq verres d'alcool chez les hommes et d'au moins quatre verres d'alcool chez les femmes, et ce, au moins une fois par mois sur une période de 12 mois.

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Tableau 10 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon certaines caractéristiques, à Montréal et au Québec, 2020-2021

Consommation excessive d'alcool chez la population de 15 ans et plus		
	Montréal	Québec
	%	%
Total	19,1 (-)	23,6
Genre		
Hommes	21,6 (-)	26,7
Femmes	16,7 (-)	20,5
Âge		
15 à 24 ans	20,5	22,3
25 à 44 ans	23,3↑ (-)	30,2↑
45 à 64 ans	19,1 (-)	25,1
65 ans et plus	10,0↓ (-)	13,4↓
Niveau de scolarité		
Inférieur au DES	10,3↓ (-)	17,4↓
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,6 (-)	24,1
Diplôme d'études collégiales	22,3↑ (-)	27,5↑
Diplôme d'études universitaires	20,6 (-)	23,6
Composition du ménage		
Personne vivant seule	22,5↑	22,9↓
Couple sans enfant	21,5	23,3
Couple avec enfants	14,3↓ (-)	23,6
Famille monoparentale	18,5 (-)	28,1↑
Occupation principale		
Au travail	22,7↑ (-)	29,0↑
Aux études	17,7	19,6
Sans emploi	19,0	19,9
À la retraite	10,3↓ (-)	14,6↓
Revenu du ménage (MFR)		
Faible revenu	15,2↓ (-)	17,3↓
Revenu moyen-faible	16,8 (-)	21,7
Revenu moyen-élevé	20,1 (-)	25,9
Revenu élevé	27,4↑ (-)	31,8↑

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil de 5 %.

↑/↓ : Pour la même catégorie, la proportion la plus élevée est significativement différente de la plus faible, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP 2020-2021).

SELON LE GENRE ET LE GROUPE D'ÂGE

Tableau 11 - Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon le groupe d'âge et le genre, à Montréal et au Québec, 2020-2021

		Consommation excessive d'alcool selon le genre et le groupe d'âge	
Âge	Genre	Montréal	Québec
		%	%
15 à 24 ans	Homme	21,6	22,4
	Femme	19,4	22,2
	Total	20,5	22,3
25 à 44 ans	Homme	25,4 (-)	33,2
	Femme	21,1 (-)	27,0
	Total	23,3 (-)	30,2
45 à 64 ans	Homme	22,2 (-)	28,6
	Femme	15,9 (-)	21,5
	Total	19,1 (-)	25,1
65 ans et plus	Homme	12,2 (-)	16,8
	Femme	8,3 (-)	10,3
	Total	10,0 (-)	13,4

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP 2020-2021).

SELON CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION MONTRÉALAISE

Tableau 12 - Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon certaines caractéristiques de la population montréalaise, Montréal, 2020-2021

Consommation excessive d'alcool chez la population montréalaise de 15 ans et plus	
	%
Total pour Montréal	19,1
Sociodémographiques	
Langue parlée à la maison	
Au moins le français	22,2↑
Au moins l'anglais mais pas le français	16,0
Ni le français et ni l'anglais	9,0↓
Pays de naissance	
Canada	24,8↑
Extérieur du Canada	11,4↓
Socioéconomiques	
Défavorisation matérielle (Indice régional)	
Quartile 1 (favorisé)	22,3↑
Quartile 2-3 (moyen)	20,1
Quartile 4 (défavorisé)	14,4↓
Habitudes de vie	
Tabagisme	
Fumeurs quotidiens	38,1↑
Non-fumeurs	12,3↓
Vapotage	
Oui	41,3↑
Non	18,0↓
Drogues	
Oui	40,5↑
Non	13,3↓
Cannabis	
Oui	39,7↑
Non	13,9↓

Consommation excessive d'alcool chez la population montréalaise de 15 ans et plus

%

Santé générale

Perception de sa santé

Excellente ou très bonne	20,6↑
Bonne	17,0↓
Mauvaise ou passable	17,4

Satisfaction face à sa vie sociale

Satisfaisante	18,0↓
Insatisfaisante	24,4↑

Santé mentale

Détresse psychologique

Élevée	24,0↑
Faible ou moyen	15,7↓

Anxiété généralisée

Oui	28,4↑
Non	18,4↓

Trouble de stress post-traumatique

Oui	22,2*
Non	19,6

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

↑/↓ : Pour la même catégorie, la proportion la plus élevée est significativement différente de la plus faible, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP 2020-2021).

SELON LES RTS ET LES RLS² DE MONTRÉAL

Tableau 13 – Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool de façon excessive, selon le RTS, le RLS et le genre, Montréal, 2020-2021

Consommation excessive d'alcool chez la population montréalaise de 15 ans et plus	
	%
Total pour Montréal	19,1
Genre	
Hommes	21,6
Femmes	16,7
RTS Ouest	16,6
Genre	
Hommes	19,4
Femmes	13,8
RLS	
Ouest-de-l'Île	13,7 (-)
Dorval- Lachine - LaSalle	21,1
RTS Centre-Ouest	13,9 (-)
Genre	
Hommes	16,9 (-)
Femmes	11,0* (-)
RLS	
Cavendish	14,1 (-)
De la Montagne	13,9 (-)
RTS Centre-Sud	31,0 (+)
Genre	
Hommes	30,8 (+)
Femmes	31,2 (+)
RLS	
Sud-Ouest-Verdun	26,0 (+)
Jeanne-Mance	36,1 (+)
RTS Nord	18,4
Genre	
Hommes	20,3
Femmes	16,6
RLS	
Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent	10,5* (-)
Ahuntsic - Montréal-Nord	16,0
Cœur-de-l'Île	32,3 (+)

² Dans ce recueil, les RLS sont désignés par le nom provenant des anciens noms des territoires de CSSS.

Consommation excessive d'alcool chez la population montréalaise de 15 ans et plus

	%
RTS Est	17,7
Genre	
Hommes	21,8
Femmes	13,8 (-)
RLS	
Saint-Léonard - Saint-Michel	11,8 (-)
Pointe-de-l'Île	15,1 (-)
Lucille-Teasdale	24,6 (+)

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La proportion du RTS ou du RLS est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste de Montréal au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2020-2021). Fichier maître de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP 2020-2021).

6. PORTRAIT DU DÉPASSEMENT DES LIMITES HEBDOMADAIRES

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Dans l'Enquête sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC, 2019-2020), l'indicateur du dépassement des limites hebdomadaires correspond à une consommation de plus de 15 verres chez les hommes et de plus de 10 verres chez les femmes.

Précisons que la consommation excessive d'alcool et le dépassement des limites hebdomadaires sont tous deux des types de consommation d'alcool à risque, mais ils diffèrent en termes de temps et de quantité. La consommation excessive est caractérisée par une grande quantité d'alcool ingérée en peu de temps, tandis que le dépassement des limites hebdomadaires se réfère à une consommation régulière qui excède les recommandations par semaine.

Tableau 14 - Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un dépassement des limites hebdomadaires en consommation d'alcool, à Montréal et au Québec, 2000-2001 à 2019-2020

Évolution de la population ayant dépassé les limites hebdomadaires de consommation d'alcool ¹						
	2000-2001	2003	2005	2013-2014	2015-2016	2019-2020
	%					
Montréal						
Total	5,8	6,0	6,9	5,5	6,4	4,3
Hommes	7,8	7,5	8,2	7,1*	6,9	5,2
Femmes	4,0	4,6*	5,6	4,0*	5,9*	3,4*
Québec						
Total	5,3	5,4	6,4	6,0	6,3	5,2
Hommes	7,2	7,2	8,1	7,3	7,5	6,3
Femmes	3,5	3,6	4,7	4,7	5,1	4,2

1 : La comparaison entre les cycles de l'enquête va comme suit : de 2000-2001 à 2013-2014 et de 2015-2016 à 2019-2020.

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec au seuil de 1 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 1 %.

Source : Statistique Canada (2000-2020). Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2000-2001 à 2019-2020).

7. PORTRAIT DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL CHEZ LES JEUNES DU SECONDAIRE

Cette section présente sommairement les résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS, 2022-2023) sur la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois chez les jeunes du secondaire. Précisons que dans cette enquête, la consommation excessive est définie comme le fait d'avoir pris 5 consommations d'alcool ou plus en une même occasion.

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Tableau 15 - Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, à Montréal et au Québec, 2022-2023

Consommation d'alcool chez les élèves du secondaire		
	Montréal	Québec
Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois		
	%	%
Cycle		
2022-2023	31,3↓ (-)	46,6↓
2016-2017	40,7 (-)	52,6
2010-2011	47,3↑ (-)	59,7↑
Genre		
Garçons	29,0 (-)	43,5
Filles	33,6 (-)	49,9
Niveau de scolarité		
1er cycle	14,5↓ (-)	27,0↓
2e cycle	43,5↑ (-)	61,8↑
Consommation excessive d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois		
Cycle		
2022-2023	17,6↓ (-)	29,4↓
2016-2017	21,9 (-)	34,4
2010-2011	29,1↑ (-)	41,1↑
Genre		
Garçons	15,8 (-)	27,5
Filles	19,4 (-)	31,5
Niveau de scolarité		
1er cycle	5,5↓ (-)	12,9↓
2e cycle	26,5↑ (-)	42,2↑

Note : le 1er cycle du secondaire : 1 et 2 alors que le 2e cycle du secondaire : 3, 4 et 5.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

↑/↓ : Pour une même variable, la proportion la plus faible est significativement différente de la proportion la plus élevée, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des garçons est significativement différente de celle des filles, au seuil de 5 %.

Source : ISQ (2024). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire (EQSJS, 2022-2023).

8. PORTRAIT DE L'UTILISATION DES SERVICES MÉDICAUX

À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

Tableau 16 - Proportion ajustée d'utilisation d'un service médical parmi la population de 12 ans et plus ayant des troubles liés à l'alcool seulement, selon le genre, à Montréal et au Québec, 2018-2019 à 2022-2023

		Utilisation d'un service médical en lien avec des troubles liés à l'alcool seulement									
Services	Genre	Montréal					Québec				
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Hospitalisation	Hommes	5,9 (-)	5,6 (-)	5,2 (-)	5,3 (-)	5,5	6,4	6,3	6,1	6,0	6,0
	Femmes	3,9 (-)	3,9 (-)	3,2 (-)	4,0 (-)	4,2 (-)	5,5	5,5	5,3	5,7	5,5
	Total	5,2 (-)	5,0 (-)	4,5 (-)	4,9 (-)	5,1 (-)	6,2	6,1	5,9	6,0	5,9
Urgence	Hommes	7,4	6,8	3,3	4,7	4,7	6,7	6,7	3,4	4,6	4,7
	Femmes	7,6	6,7	3,2	4,9	5,6	6,8	6,6	3,5	4,6	4,7
	Total	7,5 (+)	6,8	3,3	4,8	5,2	6,7	6,6	3,4	4,6	4,7
Psychiatre ¹	Hommes	0,4*	0,4 (+)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
	Femmes	0,4	0,4	0,5 (+)	0,5 (+)	0,6* (+)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Total	0,4 (+)	0,4 (+)	0,4 (+)	0,4 (+)	0,4* (+)	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Md de famille ¹	Hommes	2,8	3,2	2,2 (-)	3,0 (-)	2,5 (-)	2,9	3,1	2,8	3,8	3,5
	Femmes	2,0 (-)	2,4	1,7 (-)	2,6 (-)	2,6	2,5	2,6	2,7	3,5	3,1
	Total	2,5 (-)	2,8	2,0 (-)	2,9 (-)	2,5 (-)	2,8	2,9	2,7	3,6	3,3
Md spécialiste ¹	Hommes	3,1 (+)	2,7	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
	Femmes	2,0	1,7	1,5	2,1	2,3	1,8	1,9	1,7	2,2	2,3
	Total	2,7 (+)	2,3	2,3	2,6	2,4	2,2	2,2	2,1	2,4	2,5

1 : Psychiatre, médecin de famille et médecins spécialistes en ambulatoire.

* : Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 1 %.

INSPQ (2022-2023). Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ, 2022-2023).

9. PORTRAIT DES HOSPITALISATIONS À MONTRÉAL ET AU QUÉBEC

La consommation d'alcool peut avoir des conséquences graves pour la santé. L'hospitalisation est une conséquence liée à la consommation d'alcool et représente un fardeau évitable pour le système de santé (ICIS, 2022)³. Cet indicateur permet de dresser le portrait des hospitalisations qui sont totalement (100 %) attribuables à l'alcool, mais aussi selon des codes diagnostics CIM-10 attribuables à l'alcool (voir Annexe A pour la description détaillée des codes diagnostics CIM-10).

Rappelons que les taux d'hospitalisations liés à la consommation d'alcool doivent être interprétés avec prudence, car ils font référence au nombre d'admissions à l'hôpital et non au nombre de patients. De plus, précisons que les hospitalisations à Montréal représentent les épisodes d'hospitalisation de personnes vivant à Montréal, peu importe le lieu de leur hospitalisation.

LES HOSPITALISATIONS TOTALEMENT ATTRIBUABLES À L'ALCOOL

Tableau 17 – Proportion pour mille (%) d'hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool selon les codes de diagnostic de l'ICIS, Montréal et Québec, 2018-2019 à 2022-2023

Causes d'hospitalisation	Évolution des hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool									
	Montréal					Québec				
	2018 2019	2019 2020	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2018 2019	2019 2020	2020 2021	2021 2022	2022 2023
Conditions médicales	3,5	3,5	4,4	4,3	3,9	3,3	3,1	4,2	3,7	3,4
Troubles mentaux et comportementaux	7,5	6,9	6,9	7,2	7,6	6,5	6,7	7,6	7,5	7,7
Intoxication	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Total	11,1	10,5	11,4	11,7	11,6	10,0	10,1	12,0	11,4	11,4

Source : MSSS (2023). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO.

³ Institut canadien d'information sur la santé (ICIS, 2022). [Hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool / ICIS \(cihi.ca\)](https://www.cihi.ca/en/hospitalisations-entierement-attribuables-l-alcool-icis)

LES HOSPITALISATIONS CAUSÉES PAR LES TROUBLES LIÉS À L'ALCOOL

Tableau 18 – Taux ajusté d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool en diagnostic principal selon la définition de l'ICIS¹, pour 10 000 personnes, à Montréal et au Québec, 2015-2018 à 2021-2024

Évolution du taux d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool						
	Montréal			Québec		
	2015-2018	2018-2021	2021-2024	2015-2018	2018-2021	2021-2024
Troubles d'utilisations ou troubles induits						
Total	8,3 (+)	8,6	8,3 (-)	7,6	8,4	8,7
Genre						
Hommes	12,8 (+)	13,5 (+)	12,6	11,1	12,3	12,3
Femmes	3,9	3,8 (-)	3,9 (-)	4,1	4,6	5,1
Âge (taux brut)						
15 à 24 ans	1,5 (-)	1,1 (-)	1,2 (-)	3,5	3,6	3,4
25 à 44 ans	6,7 (-)	7,2 (-)	7,5 (-)	7,8	9,5	10,6
45 à 64 ans	16,6 (+)	17,2 (+)	16,0 (+)	12,9	14,4	14,2
65 ans et +	8,6 (+)	8,8, (+)	8,3 (+)	8,0	7,7	7,7
Intoxication						
Total	0,1 (-)	0,1 (-)	0,1 (-)	0,2	0,2	0,2
Genre						
Hommes	0,1* (-)	0,1 (-)	0,1* (-)	0,3	0,3	0,2
Femmes	0,1* (-)	0,1* (-)	0,1* (-)	0,2	0,2	0,2
Âge (taux brut)						
15 à 24 ans	0,1** (-)	0,2* (-)	0,1** (-)	0,4	0,3	0,3
25 à 44 ans	0,1*	0,1*	0,1*	0,3	0,3	0,2
45 à 64 ans	0,1* (-)	0,1* (-)	0,1* (-)	0,3	0,2	0,2
65 ans et +	0,1*	0,1*	0,1**	0,1	0,1	0,1
Troubles liés à l'alcool en diagnostic principal						
Total	8,4 (+)	8,7	8,3 (-)	7,8	8,6	8,9
Genre						
Hommes	12,9 (+)	13,7 (+)	12,7	11,4	12,5	12,5
Femmes	4,0 (-)	3,8 (-)	4,0 (-)	4,3	4,8	5,2

Évolution du taux d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool

	Montréal			Québec		
	2015-2018	2018-2021	2021-2024	2015-2018	2018-2021	2021-2024
Âge (taux brut)						
15 à 24 ans	1,6 (-)	1,3 (-)	1,3 (-)	3,9	3,9	3,7
25 à 44 ans	6,8 (-)	7,3 (-)	7,6 (-)	8,0	9,7	10,8
45 à 64 ans	16,7 (+)	17,3 (+)	16,0 (+)	13,2	14,6	14,4
65 ans et +	8,7 (+)	8,9 (+)	8,3 (+)	8,1	7,8	7,8

1 : Selon la définition de l'ICIS, les codes F1X.0 sont exclus de la définition de cas d'intoxication de l'ICIS et sont plutôt inclus dans la catégorie des troubles d'utilisation et des troubles induits.

* : Coefficient de variation entre 16,66 % et 33,33 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 33,33 % ; à titre d'information seulement.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

MSSS (2025). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO et Estimations et projections démographiques ; (ICIS, 2025). Base de données sur les congés des patientS.

SELON LE GENRE ET LE GROUPE D'ÂGE

Tableau 19 - Taux d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool en diagnostic principal selon la définition de l'ICIS¹, pour 10 000 personnes, selon le genre et l'âge, à Montréal et au Québec, 2015-2018 à 2021-2024

Évolution du taux d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool						
	Sexe	Montréal			Québec	
		2015-2018	2018-2021	2021-2024	2015-2018	2018-2021
Âge						
15 à 24 ans	Hommes	1,9 (-)	1,4 (-)	1,3 (-)	4,0	4,0
	Femmes	1,0 (-)	0,7* (-)	1,1 (-)	3,0	3,1
	Total	1,5 (-)	1,1 (-)	1,2 (-)	3,5	3,6
25 à 44 ans	Hommes	9,9 (-)	10,4 (-)	10,2 (-)	10,8	12,9
	Femmes	3,5 (-)	3,9 (-)	4,6 (-)	4,6	5,9
	Total	6,7 (-)	7,2 (-)	7,5 (-)	7,8	9,5
45 à 64 ans	Hommes	25,5 (+)	27,6 (+)	25,1 (+)	19,2	21,6
	Femmes	7,5 (+)	6,6	6,5 (-)	6,6	7,1
	Total	16,6 (+)	17,2 (+)	16,0 (+)	12,9	14,4
65 ans et plus	Hommes	15,0 (+)	15,1 (+)	14,5 (+)	13,6	12,8
	Femmes	3,9 (+)	4,0 (+)	3,5	3,3	3,5
	Total	8,6 (+)	8,8 (+)	8,3 (+)	8,0	7,7

Évolution du taux d'hospitalisation en lien avec les troubles liés à l'alcool

Âge	Sexe	Montréal			Québec		
		2015-2018	2018-2021	2021-2024	2015-2018	2018-2021	2021-2024
Troubles liés à l'alcool en diagnostic principal							
15 à 24 ans	Hommes	2,0 (-)	1,7 (-)	1,4 (-)	4,4	4,5	3,7
	Femmes	1,1 (-)	0,8* (-)	1,2 (-)	3,3	3,3	3,6
	Total	1,6 (-)	1,3 (-)	1,3 (-)	3,9	3,9	3,7
25 à 44 ans	Hommes	10,0 (-)	10,6 (-)	10,3 (-)	11,2	13,2	14,0
	Femmes	3,5 (-)	4,0 (-)	4,7 (-)	4,8	6,1	7,4
	Total	6,8 (-)	7,3 (-)	7,6 (-)	8,0	9,7	10,8
45 à 64 ans	Hommes	25,6 (+)	27,7 (+)	25,1 (+)	19,6	21,9	21,2
	Femmes	7,6 (+)	6,7 (-)	6,6 (-)	6,8	7,3	7,4
	Total	16,7 (+)	17,3 (+)	16,0 (+)	13,2	14,6	14,4
65 ans et plus	Hommes	15,2 (+)	15,3 (+)	14,6 (+)	13,8	13,0	12,7
	Femmes	3,9 (+)	4,0 (+)	3,5	3,4	3,4	3,5
	Total	8,7 (+)	8,9 (+)	8,3 (+)	8,1	7,8	7,8

1 : Selon la définition de l'ICIS, les codes F1X.0 sont exclus de la définition de cas d'intoxication de l'ICIS et sont plutôt inclus dans la catégorie des troubles d'utilisation et des troubles induits.

* : Coefficient de variation entre 16,66 % et 33,33 % ; interpréter avec prudence.

** : Coefficient de variation supérieur à 33,33 % ; à titre d'information seulement.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

MSSS (2025). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO et Estimations et projections démographiques ; (ICIS, 2025). Base de données sur les congés des patientS.

LES HOSPITALISATIONS CAUSÉES PAR UNE MALADIE HÉPATITE INDUITE PAR L'ALCOOL

Tableau 20 – Proportion d'hospitalisations pour affections au foie liées à l'alcool sur l'ensemble des affections au foie, à Montréal et au Québec, 2022-2023

Hospitalisation pour affections au foie liées à l'alcool		
	Montréal	Québec
	%	%
Total	32,4 (+)	28,8
Genre		
Hommes	42,1 (+)	35,0
Femmes	19,5	21,1
Âge		
Moins de 25 ans	8,3**	10,0**
25 à 44 ans	52,8	50,4
45 à 64 ans	43,5	41,4
65 ans et plus	20,0	16,9

** : Coefficient de variation supérieur à 33,33 % ; à titre d'information seulement.

(+/-) : La proportion de Montréal est significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Le caractère gras orange : La proportion des hommes est significativement différente de celle des femmes, au seuil de 5 %.

Source : MSSS (2023). Fichier des hospitalisations MED-ECHO.

10. PORTRAIT DE LA MORTALITÉ

L'annexe B présente en détail les codes pour les causes chroniques et celles aiguës de décès imputable (100 %) à la consommation d'alcool. Notons que les causes aiguës de décès liées à l'alcool sont les intoxications accidentelles, l'auto-intoxication, les intoxications intentionnelles ou non par l'alcool ainsi que l'exposition à l'alcool.

Tableau 21 – Mortalité causée par les troubles liés à l'utilisation de l'alcool, à Montréal et au Québec, 2016-2021

	Évolution de la mortalité causée par les troubles liés à l'utilisation de l'alcool											
	Montréal						Québec					
Nombre de décès	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Causes chroniques	96	106	69	82	112	90	374	367	375	357	386	446
Causes aiguës	6	12	7	9	6	5	37	48	56	35	29	39
Total	102	118	76	91	118	95	411	415	431	392	415	485

Source : MSSS (2021). Fichier des décès, 2016 à 2021 ; MSSS (2023). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO et Estimations et projections démographiques ; ICIS (2023). Base de données sur les congés des patients.

Annexe A – Codes de diagnostic attribuables à l'alcool (CIM-10)

Codes de diagnostic pour les admissions à l'hôpital attribuables à l'alcool ou les codes de fraction 100 % attribuables à l'alcool (CIM-10)

Conditions médicales et causes externes	
E24.4	Voir l'annexe pour plus de détails
G31.2	Dégénérescence du système nerveux lié à l'alcool
G62.1	Polynévrite alcoolique
G72.1	Myopathie alcoolique
I42.6	Myocardiopathie alcoolique
K29.2	Gastrite alcoolique
K70.0	Stéatose hépatique alcoolique
K70.1	Hépatite alcoolique
K70.2	Fibrose et sclérose alcoolique du foie
K70.3	Cirrhose alcoolique du foie
K70.4	Insuffisance hépatique alcoolique
K70.9	Maladie alcoolique du foie, sans précision
K85.2	Pancréatite aiguë induite par l'alcool
K86.0	Pancréatite chronique alcoolique
O35.4	Soins maternels pour lésions fœtales (présurm.es) dues à l'alcoolisme
O99.3	Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpérale
Q86.0	Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphie)
R78.0	Présence d'alcool dans le sang
X45	Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool
X65	Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool
Y15	Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée
Troubles mentaux et comportementaux	
F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, intoxication aiguë
F10.1	Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d'alcool nocive pour la santé
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage avec delirium
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome amnésique
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, autres troubles mentaux et du comportement
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, troubles mentaux et du comportement non précisés

Codes de diagnostic pour les admissions à l'hôpital attribuables à l'alcool ou les codes de fraction 100 % attribuables à l'alcool (CIM-10)

Intoxication	
T51.1	Effet toxique du méthanol
T51.2	Effet toxique du 2-propanol
T51.3	Effet toxique de l'huile de fusel
T51.8	Effet toxique d'autres alcools
T51.9	Effet toxique de l'alcool, sans précision

Annexe B – Codes pour la cause de décès imputable à la consommation d'alcool (CIM-10)

Codes pour la cause initiale de décès – 100 % imputable à la consommation d'alcool (CIM-10)	
Causes chroniques	
F10.0	Troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, intoxication aiguë
F10.1	Troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d'alcool nocive pour la santé
F10.2	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance
F10.3	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage
F10.4	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de sevrage avec delirium
F10.5	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique
F10.6	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome amnésique
F10.7	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive
F10.8	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, autres troubles mentaux et du comportement
F10.9	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, troubles mentaux et du comportement non précisés
G31.2	Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool
G62.1	Polynévrite alcoolique
G72.1	Myopathie alcoolique
I42.6	Myocardiopathie alcoolique
K29.2	Gastrite alcoolique
K70.0	Stéatose hépatique alcoolique
K70.1	Hépatite alcoolique
K70.2	Fibrose et sclérose alcoolique du foie
K70.3	Cirrhose alcoolique du foie
K70.4	Insuffisance hépatique alcoolique
K70.9	Maladie alcoolique du foie, sans précision
K85.2	Pancréatite aiguë induite par l'alcool
K86.0	Pancréatite chronique alcoolique
Q86.0	Syndrome d'alcoolisme foetal (dysmorphie)
P04.3	Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère
Causes aiguës	
X45	Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool
X65	Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool
Y15	Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée

11. RÉFÉRENCES

- Institut de la statistique du Québec** (ISQ, 2024). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, EQSJS 2022-2023. Québec : Gouvernement du Québec.
- Institut de la statistique du Québec** (ISQ, 2023). Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population, EQSP 2020-2021. Québec : Gouvernement du Québec.
- Institut national de santé publique du Québec** (INSQ, 2023-2024). Fichier de données du système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) : Gouvernement du Québec.
- Institut national de santé publique du Québec** (INSQ, 2022-2023). Fichier de données du système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) : Gouvernement du Québec.
- Ministère de la Santé et des Services sociaux** (MSSS, 2016 à 2023). Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2026 à M34-2023. Québec : Gouvernement du Québec.
- Ministères de la Santé et des Services sociaux** (MSSS, 2015 à 2021). Fichiers des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial M34-2015 à M34-2021. Québec : Gouvernement du Québec.
- Statistique Canada** (2000 à 2021). Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2000-2001 à 2019-2020 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). Ottawa : Gouvernement du Canada.

Numéro d'ISBN : 978-2-555-01547-0

Analyse et rédaction : Nadine Girouard, agente de planification, de programmation et de recherche
Garbis Meshefedjian, agent de planification, de programmation et de recherche

Traitement des données : Garbis Meshefedjian, agent de planification, de programmation et de recherche
Nadine Girouard, agente de planification, de programmation et de recherche

Validation des données : James Massie, technicien en recherche psychosociale

Révision : Bruno Thibert, agent de planification, de programmation et de recherche
Maxime Roy, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et responsable médical

Révision linguistique et mise en page : Sonia Abid, agente administrative

Tous les auteurs sont affiliés au Service de Surveillance de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal.

Graphisme : Delphine Forest-Maurice et Linda Daneau, graphistes



Une production de la Direction régionale de la santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal