

ÉTUDE CLINIQUE SUR L'ÉTAT DE SANTÉ BUCCODENTAIRE DES ÉLÈVES MONTRÉLAIS DU PRIMAIRE 2012-2013

Annexes



L'Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves montréalais du primaire 2012-2013 est une production de la Direction régionale de santé publique - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

1301, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1M3
514 528-2400
ciuss-centresudmtl.gouv.qc.ca

Auteurs du rapport

Martin Généreux, D.M.D., dentiste-conseil
Daniel Picard, D.M.D., M. Sc., dentiste-conseil
Ginette Veilleux, D.M.D., M. Sc., dentiste-conseil
Jacques Durocher, D.M.D., M. Sc., dentiste-conseil

Contribution

Sadoune Ait Kaci Azzou, Ph. D., statisticien
Audrey Lozier-Sergerie, technicienne de recherche
Garbis Meshefedjian, Ph. D., épidémiologiste et statisticien

Mise en page

Charles Tétrault, agent administratif
Danielle Fortin, agente administrative

Note

Dans ce document, l'emploi du masculin générique désigne aussi bien les femmes que les hommes et est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

Pour citer ce document :

GÉNÉREUX, M., D. PICARD, G. VEILLEUX et J. DUROCHER (2017). *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves montréalais du primaire 2012-2013 (ÉCSBQ-Montréal 2012-2013)*, Montréal, Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 205 p.

Ce document est disponible en ligne à la section Publication du site Web : dsp.santemontreal.qc.ca

© Gouvernement du Québec, 2017

ISBN 978-2-550-79472-1 (En ligne)

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017
Bibliothèque et Archives Canada, 2017

Table des matières

Liste des tableaux.....	i
Annexe 1 Questionnaire aux parents	1
Annexe 2 Présence de dents.....	5
Annexe 3 Carie dentaire	21
Dentition temporaire	23
Dentition permanente.....	64
Dentitions temporaire et permanente combinées	106
Distribution de la carie selon le type de dents et de faces (dentition temporaire).....	152
Distribution de la carie selon le type de dents et de faces (dentition permanente)	164
Distribution de la carie selon le type de dents et de faces (dentitions temporaire et permanente combinées)	183
Caractéristiques associées à l'expérience de la carie.....	198
Caractéristiques des élèves ayant une expérience élevée de carie	292
Besoin de soins préventifs de la carie	307
Besoin de traitement de la carie	323
Niveau de traitement de la carie.....	339
Nombre moyen de faces obturées, avec présence simultanée ou non de lésion carieuse.....	355
Obturations en amalgame et obturations en matériaux esthétiques	356
Besoin évident de traitement lié à la carie (BET)	375
Annexe 4 Agents de scellement de puits et fissures	387
Annexe 5 Hygiène buccodentaire.....	405
Annexe 6 Maladies des gencives	453
Annexe 7 Traumatismes dentaires	469
Annexe 8 Fluorose dentaire.....	483

Liste des tableaux

Tableau 1	Nombre moyen de dents présentes en dentition temporaire des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	7
Tableau 2	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant supérieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	8
Tableau 3	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant supérieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	9
Tableau 4	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant inférieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	10
Tableau 5	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant inférieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	11
Tableau 6	Nombre moyen de dents présentes en dentition permanente des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	12
Tableau 7	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant supérieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	13
Tableau 8	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant supérieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	15
Tableau 9	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant inférieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	17
Tableau 10	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant inférieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	19
Tableau 11	Nombre moyen de dents présentes en dentitions combinées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	20
Tableau 12	Nombre moyen de dents cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (caod) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	23
Tableau 13	Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	24

Tableau 14	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	25
Tableau 15	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	27
Tableau 16	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	28
Tableau 17	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	40
Tableau 18	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	52
Tableau 19	Nombre moyen de dents cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (CAOD) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	64
Tableau 20	Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128, 140, 144 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	65
Tableau 21	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	68
Tableau 22	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	70

Tableau 23	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	71
Tableau 24	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	82
Tableau 25	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	93
Tableau 26	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	105
Tableau 27	Nombre moyen de dents cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	106
Tableau 28	Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 et 140 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	107
Tableau 29	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	109
Tableau 30	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentitions combinées (144 faces), ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	111
Tableau 31	Répartition (quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	112

Tableau 32	Répartition (quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	125
Tableau 33	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	138
Tableau 34	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces), ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	151
Tableau 35	Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	152
Tableau 36	Nombre moyen de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face autre que occlusale temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	153
Tableau 37	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	154
Tableau 38	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stade 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	156
Tableau 39	Proportion des incisives et canines, premières molaires et deuxièmes molaires cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie parmi les différents types de dents temporaires des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	158
Tableau 40	Proportion des incisives et canines, premières molaires et deuxièmes molaires parmi les dents temporaires cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	159

Tableau 41	Répartition (trois catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	160
Tableau 42	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	161
Tableau 43	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	162
Tableau 44	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses, cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	163
Tableau 45	Nombre moyen de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 et 144 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	164
Tableau 46	Nombre moyen de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	166
Tableau 47	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	167
Tableau 48	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	169

Tableau 49	Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 et 144 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	171
Tableau 50	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	173
Tableau 51	Proportion des incisives, canines et prémolaires, premières molaires et deuxièmes molaires cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie parmi les différents types de dents permanentes des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	175
Tableau 52	Proportion des incisives, canines et prémolaires, premières molaires et deuxièmes molaires parmi les dents permanentes cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	176
Tableau 53	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	177
Tableau 54	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	178
Tableau 55	Répartition (trois catégories) des élèves de 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	179
Tableau 56	Répartition (trois catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1, 2 ,3 ,4 ,5 et 6 en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	180

Tableau 57	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	181
Tableau 58	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des molaires en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	182
Tableau 59	Nombre moyen de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	183
Tableau 60	Nombre moyen de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	184
Tableau 61	Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	185
Tableau 62	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	186
Tableau 63	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	188
Tableau 64	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	190
Tableau 65	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	192

Tableau 66	Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	193
Tableau 67	Répartition (trois catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	194
Tableau 68	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	195
Tableau 69	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5, et 6 en dentitions combinées (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	196
Tableau 70	Répartition (deux catégories) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5, et 6 des molaires en dentitions combinées (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	197
Tableau 71	Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	198
Tableau 72	Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	205
Tableau 73	Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	212
Tableau 74	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	219

Tableau 75	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	226
Tableau 76	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	232
Tableau 77	Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	238
Tableau 78	Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	244
Tableau 79	Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	250
Tableau 80	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	256
Tableau 81	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	262
Tableau 82	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	268
Tableau 83	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	274
Tableau 84	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	280

Tableau 85	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	286
Tableau 86	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	292
Tableau 87	Proportion des faces cariées, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves ayant une expérience élevée de la carie parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	298
Tableau 88	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e année du primaire ayant un $C_{4-6}AOF_{88}$ entre 1 et 4 faces, 5 et 9 faces et 10 faces ou plus, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	298
Tableau 89	Nombre moyen de dents cariées au stade 1 à 6 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire du tiers des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire les plus sévèrement atteints par la carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	298
Tableau 90	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	299
Tableau 91	Proportion des faces cariées, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves ayant une expérience élevée de la carie parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 6 ^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	305
Tableau 92	Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 6 ^e année du primaire ayant un $C_{4-6}AOF_{128}$ entre 1 et 4 faces ainsi que de 5 faces ou plus, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	305
Tableau 93	Nombre moyen de dents cariées au stade 1 à 6 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente du tiers des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente les plus sévèrement atteints par la carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	305

Tableau 94	Nombre moyen de dents cariées au stade 1 à 6 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées du tiers des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire et/ou permanente les plus sévèrement atteints par la carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	306
Tableau 95	Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	307
Tableau 96	Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	312
Tableau 97	Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (144 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	317
Tableau 98	Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade de carie 1 à 6 ou obturées pour cause de carie des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de face et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	322
Tableau 99	Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	323
Tableau 100	Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	328
Tableau 101	Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	333
Tableau 102	Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de faces et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	338
Tableau 103	Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	339
Tableau 104	Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	344
Tableau 105	Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	349

Tableau 106	Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le type de faces et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	354
Tableau 107	Nombre moyen de faces obturées pour cause de carie, cariées ou non, des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une face présente ou absente pour cause de carie selon le type de faces et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	355
Tableau 108	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie parmi ceux ayant au moins une dent présente ou absente pour cause de carie et selon la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	356
Tableau 109	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	357
Tableau 110	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie parmi ceux ayant au moins une dent présente ou absente pour cause de carie et selon la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	365
Tableau 111	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	366
Tableau 112	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales obturées en amalgame pour cause de carie des molaires selon la dentition choisie parmi ceux ayant au moins une dent de la dentition concernée présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	374
Tableau 113	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie des molaires selon la dentition choisie parmi ceux ayant au moins une dent de la dentition concernée présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	374
Tableau 114	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	375
Tableau 115	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	381
Tableau 116	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire scellée parmi ceux ayant une dent temporaire présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	389
Tableau 117	Nombre moyen de dents temporaires scellées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire scellée, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	389

Tableau 118	Proportion des premières et deuxièmes molaires parmi les dents temporaires scellées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	389
Tableau 119	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	390
Tableau 120	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de dents permanentes scellées parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	396
Tableau 121	Nombre moyen de dents permanentes scellées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	397
Tableau 122	Proportion des types de dents parmi les dents permanentes scellées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	401
Tableau 123	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une molaire permanente scellée parmi ceux ayant au moins une molaire permanente présente selon la condition clinique, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	401
Tableau 124	Nombre moyen de molaires permanentes scellées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une molaire permanente scellée, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	402
Tableau 125	Proportion des types de dents parmi les dents scellées en dentitions combinées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	402
Tableau 126	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent scellée en dentitions combinées, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	402
Tableau 127	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le nombre de dents scellées en dentitions combinées, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	403
Tableau 128	Nombre moyen de dents scellées des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une dent scellée en dentitions combinées, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	403
Tableau 129	Score moyen des indices de débris, de tartre et d'hygiène buccodentaire des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	407
Tableau 130	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	408
Tableau 131	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	419
Tableau 132	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	429
Tableau 133	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	441

Tableau 134	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon l'indice d'hygiène buccodentaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	452
Tableau 135	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	455
Tableau 136	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire présentant un saignement gingival, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	468
Tableau 137	Score moyen pour l'indice gingival des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	468
Tableau 138	Nombre moyen d'incisives permanentes fracturées ou perdues à la suite d'un traumatisme dentaire des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant fracturé ou perdu au moins une incisive permanente à la suite d'un traumatisme selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013.....	471
Tableau 139	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	476
Tableau 140	Proportion des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	485
Tableau 141	Répartition des élèves de 2 ^e et 6 ^e année du primaire selon la gravité de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013	491

Annexe 1

Questionnaire aux parents

QUESTIONS AUX PARENTS

à retourner dans l'enveloppe

INFORMATION SUR LA FAMILLE

- S'il vous plaît, indiquez votre code postal : _____
- Lien du répondant avec l'enfant :
 mère père conjointe du père conjoint de la mère
 autre, précisez : _____
- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?
 français anglais autre, précisez : _____
- Combien d'enfants de 18 ans ou moins vivent dans votre maison?
 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants ou plus



Pour les questions 5 et 6, veuillez répondre pour les deux parents ou tuteurs

5. Avez-vous immigré au Canada?

Mère (ou tutrice)

- non
 oui, indiquez quel pays : _____

Depuis combien de temps :

- moins de 5 ans
 5 ans et plus

Père (ou tuteur)

- non
 oui, indiquez quel pays : _____

Depuis combien de temps :

- moins de 5 ans
 5 ans et plus

6. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?

Mère (ou tutrice)

- Moins que secondaire 5
 Secondaire 5
 (Diplôme d'études secondaires)
 Diplôme d'études collégiales,
 école de métiers, institut technique,
 diplôme d'études professionnelles
 Diplôme universitaire
 Ne sais pas

Père (ou tuteur)

- Moins que secondaire 5
 Secondaire 5
 (Diplôme d'études secondaires)
 Diplôme d'études collégiales,
 école de métiers, institut technique,
 diplôme d'études professionnelles
 Diplôme universitaire
 Ne sais pas

HABITUDES DE SANTÉ DENTAIRE DE L'ENFANT

- Votre enfant s'est-il brossé les dents hier?
 non 1 fois 2 fois 3 fois et plus ne sais pas
- Votre enfant a-t-il utilisé la soie dentaire hier?
 oui non ne sais pas



9. Votre enfant a-t-il pris une collation (aliment ou breuvage) hier soir juste avant de se coucher?

- oui, précisez : _____
 non ne sais pas



10. Au cours de la **DERNIÈRE SEMAINE** à la maison **ET** à l'école, combien de fois votre enfant a-t-il mangé les aliments suivants **EN GUISE DE COLLATION**, c'est-à-dire, entre les repas ou juste avant le coucher?

- Si votre enfant est en garde partagée, faire référence à la dernière semaine passée avec vous
- Prière d'encercler **une seule réponse** par énoncé

Au cours de la dernière semaine :	Aucune	Fois (dans la semaine)			Fois (par jour)			
		1-2	3-4	5-6	1	2	3	4 et +
a) Boissons aux fruits (avec sucre ajouté)	1	2	3	4	5	6	7	8
b) Jus de fruits (sans sucre ajouté)	1	2	3	4	5	6	7	8
c) Boissons énergisantes (Red Bull, Monster, Burn, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8
d) Boissons gazeuses (Coca Cola, Pepsi, Seven-Up, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8
e) Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, All Sport, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8
f) Crème glacée, sorbets, yogourts glacés, popsicles	1	2	3	4	5	6	7	8
g) Biscuits sucrés, pâtisseries, barres granolas	1	2	3	4	5	6	7	8
h) Bonbons, confitures, sirop, miel, gomme à mâcher avec sucre	1	2	3	4	5	6	7	8

11. Votre enfant a-t-il visité le dentiste depuis 1 an?

- oui (*aller à la question 12*)
 non (complétez les questions 11a et 11b)

11a. Quelle en est la principale raison?

- aucun besoin coûte trop cher peur du dentiste
 autre, précisez : _____

11b. À quand remonte sa dernière visite?

- moins de 2 ans de 2 à 5 ans plus de 5 ans
 il n'a jamais visité le dentiste ne sais pas



N'oubliez pas de compléter
la page suivante...

12. Votre enfant a-t-il actuellement dans sa bouche les conditions suivantes?

12a. Une ou des dents avec carie non réparées?

oui non ne sais pas

12b. Une ou des dents réparées suite à la carie?

oui non ne sais pas

12c. Une ou des dents extraites suite à la carie?

oui non ne sais pas

12d. Une ou des dents postérieures d'adulte (molaires ou dents du fond) couvertes par une couche de plastique pour protéger contre la carie dentaire (scellant)?

oui, fait dans une clinique dentaire oui, fait à l'école ou au CSSS

oui, fait ailleurs (exemple : clinique dentaire d'une université)

non ne sais pas



Si votre enfant est en 6^e année ou fréquente l'école privée, passez à la question 14.

Si votre enfant est en 2^e année et fréquente une école publique, passez à la question 13 :

À l'entrée en maternelle, une hygiéniste dentaire du CSSS rencontre tous les enfants. Certains d'entre eux sont alors sélectionnés pour participer à un programme de suivi dentaire préventif individualisé, pour la période allant de la maternelle à la deuxième année (ex. application de fluor sur les dents).

13. Est-ce que votre enfant a été sélectionné en maternelle pour participer à un programme de suivi dentaire préventif individualisé?

oui (passez à la question 13a)

non

ne sais pas } (passez à la question 14)

13a. Participe-t-il encore à ce programme?

oui non ne sais pas

INFORMATION SUR LES PARENTS

Pour les questions suivantes, veuillez répondre pour les deux parents ou tuteurs.

14. Actuellement, êtes-vous prestataire de l'aide sociale?

Mère (ou tutrice)

oui

non

Père (ou tuteur)

oui

non

15. Dans quel groupe d'âge vous situez-vous?

Mère (ou tutrice)

moins de 25 ans

de 25 à 34 ans

de 35 à 44 ans

de 45 à 54 ans

55 ans et plus

Père (ou tuteur)

moins de 25 ans

de 25 à 34 ans

de 35 à 44 ans

de 45 à 54 ans

55 ans et plus

16. Est-ce que les soins dentaires de votre enfant sont couverts par une assurance dentaire privée?

oui non ne sais pas

17. Vivez-vous actuellement avec un (e) conjoint (e)?

oui

non

18. Quel est votre revenu annuel, avant impôts?

Mère (ou tutrice)

moins de 5 000 \$

entre 5 000 \$ et 9 999 \$

entre 10 000 \$ et 19 999 \$

entre 20 000 \$ et 29 999 \$

entre 30 000 \$ et 39 999 \$

entre 40 000 \$ et 49 999 \$

entre 50 000 \$ et 74 999 \$

75 000 \$ ou plus

Père (ou tuteur)

moins de 5 000 \$

entre 5 000 \$ et 9 999 \$

entre 10 000 \$ et 19 999 \$

entre 20 000 \$ et 29 999 \$

entre 30 000 \$ et 39 999 \$

entre 40 000 \$ et 49 999 \$

entre 50 000 \$ et 74 999 \$

75 000 \$ ou plus

Veuillez vous assurer que vous avez rempli les documents suivants et les retourner dès demain à l'école par le biais de votre enfant dans l'enveloppe fournie.



Formulaire de consentement



Fiche santé



Questions aux parents

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Annexe 2

Présence de dents

Tableau 1 Nombre moyen de dents présentes en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Aucune	12,80	(12,56 – 13,06)	2,16	(1,79 – 2,53)
Sexe				
Masculin	13,26	(12,88 – 13,65)	2,59	(1,95 – 3,23)
Féminin	12,32	(11,98 – 12,65)	1,75	(1,39 – 2,12)

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 2 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant supérieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant supérieur droit	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 55)	96,6	(94,8 – 98,5)	28,3	(23,6 – 33,0)
Sexe				
Masculin	97,4	(94,8 – 99,6)		
Féminin	95,9	(92,7 – 98,8)		
1re molaire (no 54)	94,0	(91,8 – 95,9)	12,7*	(8,4 – 17,1)
Sexe				
Masculin	95,3	92,3 – 98,0)		
Féminin	92,5	(89,1 – 95,8)		
Canine (no 53)	97,7	(96,2 – 99,1)	17,8	(13,8 – 21,7)
Sexe				
Masculin	98,4	(96,4 – 99,9)		
Féminin	96,9	(94,4 – 99,3)		
Incisive latérale (no 52)	35,6	(30,7 – 40,9)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	42,5	(34,8 – 50,4)		
Féminin	28,4	(22,5 – 35,0)		
Incisive centrale (no 51)	10,4*	(7,2 – 13,8)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	14,2*	(8,7 – 20,1)		
Féminin	6,6*	(3,3 – 10,2)		

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.
n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.
Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 3 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant supérieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant supérieur gauche	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 65)	97,6	(96,0 – 99,1)	30,0	(24,9 – 35,1)
Sexe				
Masculin	96,8	(94,1 – 99,2)		
Féminin	n.p.	n.p.		
1re molaire (no 64)	94,6	(92,4 – 96,7)	12,1*	(8,2 – 16,3)
Sexe				
Masculin	95,6	(92,7 – 98,1)		
Féminin	93,5	(90,1 – 96,7)		
Canine (no 63)	97,9	(96,4 – 99,2)	18,2	(13,9 – 22,4)
Sexe				
Masculin	n.p.	n.p.		
Féminin	97,0	(94,4 – 99,3)		
Incisive latérale (no 62)	35,4	(31,1 – 39,8)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	41,9	(35,2 – 49,2)		
Féminin	28,6	(22,7 – 34,7)		
Incisive centrale (no 61)	9,2*	(6,1 – 12,5)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	12,3*	(7,2 – 17,8)		
Féminin	6,0**	(2,9 – 9,4)		

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 4 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant inférieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant inférieur gauche	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 75)	98,0	(96,5 – 99,2)	32,2	(26,8 – 37,4)
Sexe				
Masculin	97,2	(94,8 – 99,4)		
Féminin	n.p.	n.p.		
1re molaire (no 74)	94,9	(92,4 – 97,0)	9,8*	(6,7 – 12,8)
Sexe				
Masculin	95,9	(92,5 – 98,6)		
Féminin	93,8	(89,7 – 97,5)		
Canine (no 73)	94,4	(92,3 – 96,3)	6,5*	(3,7 – 9,2)
Sexe				
Masculin	97,6	(95,3 – 99,5)		
Féminin	91,2	(87,2 – 94,6)		
Incisive latérale (no 72)	17,0	(13,5 – 20,8)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	24,1	(17,8 – 30,8)		
Féminin	9,6*	(5,9 – 13,4)		
Incisive centrale (no 71)	1,0**	(0,1 – 2,2)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	2,0**	(0,2 – 4,4)		
Féminin	n.p.	n.p.		

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 5 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents temporaires présentes dans le quadrant inférieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant inférieur droit	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 85)	98,7	(97,3 – 99,8)	31,2	(26,6 – 35,8)
Sexe				
Masculin	n.p.	n.p.		
Féminin	n.p.	n.p.		
1re molaire (no 84)	94,8	(92,8 – 96,7)	11,4*	(7,6 – 15,1)
Sexe				
Masculin	96,1	(92,9 – 98,7)		
Féminin	93,6	(90,3 – 96,5)		
Canine (no 83)	92,8	(90,3 – 95,1)	5,6*	(2,9 – 8,6)
Sexe				
Masculin	95,5	(92,3 – 98,3)		
Féminin	90,1	(86,1 – 93,6)		
Incisive latérale (no 82)	17,8	(14,2 – 21,5)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	23,9	(18,0 – 30,3)		
Féminin	11,4*	(7,3 – 15,8)		
Incisive centrale (no 81)	1,3**	(0,1 – 2,7)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin	n.p.	n.p.		
Féminin	n.p.	n.p.		

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 6 Nombre moyen de dents présentes en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Aucune	10,46	(10,16 – 10,73)	23,73	(23,24 – 24,22)
Sexe				
Masculin	9,97	(9,52 – 10,40)	22,97	(22,15 – 23,77)
Féminin	10,96	(10,64 – 11,29)	24,47	(23,88 – 25,07)

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 7 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant supérieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant supérieur droit	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 17)	n.p.	n.p.	42,5	(37,0 – 47,8)
Sexe				
Masculin			36,2	(29,3 – 43,4)
Féminin			48,6	(39,9 – 57,7)
1re molaire (no 16)	97,6	(95,8 – 99,1)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
2e prémolaire (no 15)	1,9**	(0,5 – 3,4)	71,4	(66,6 – 76,2)
Sexe				
Masculin			66,6	(58,3 – 74,5)
Féminin			76,2	(70,9 – 81,4)
1re prémolaire (no 14)	4,9*	(3,0 – 7,0)	86,8	(82,3 – 91,1)
Sexe				
Masculin			84,2	(78,2 – 90,1)
Féminin			89,3	(83,4 – 94,6)
Canine (no 13)	n.p.	n.p.	76,6	(71,9 – 81,5)
Sexe				
Masculin			70,7	(62,8 – 78,3)
Féminin			82,3	(76,1 – 88,1)

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 7 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant supérieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Quadrant supérieur droit	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Incisive latérale (no 12)	49,8	(44,6 – 54,8)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
Incisive centrale (no 11)	85,5	(81,2 – 89,5)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 8 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant supérieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant supérieur gauche	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 27)	n.p.	n.p.	44,6	(39,1 – 50,3)
Sexe				
Masculin			37,4	(29,6 – 45,3)
Féminin			51,8	(43,2 – 61,3)
1re molaire (no 26)	97,4	(95,6 – 99,0)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
2e prémolaire (no 25)	1,1**	(0,1 – 2,3)	69,5	(64,5 – 74,7)
Sexe				
Masculin			67,0	(58,2 – 75,9)
Féminin			71,9	(65,5 – 78,4)
1re prémolaire (no 24)	4,1*	(2,2 – 6,2)	87,0	(82,7 – 90,8)
Sexe				
Masculin			84,0	(77,3 – 89,9)
Féminin			90,0	(85,6 – 94,1)
Canine (no 23)	n.p.	n.p.	77,0	(72,9 – 81,4)
Sexe				
Masculin			72,0	(64,9 – 79,1)
Féminin			81,9	(76,2 – 87,5)

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 8 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant supérieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Quadrant supérieur gauche	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Incisive latérale (no 22)	49,9	(44,9 – 54,5)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
Incisive centrale (no 21)	87,4	(83,8 – 90,8)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 9 Proportion des élèves de 2e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant inférieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant inférieur gauche	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 37)	n.p.	n.p.	61,8	(56,0 – 67,2)
Sexe				
Masculin			54,2	(46,2 – 62,2)
Féminin			69,3	(62,0 – 76,3)
1re molaire (no 36)	98,2	(95,8 – 99,8)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
2e prémolaire (no 35)	n.p.	n.p.	67,0	(61,8 – 72,5)
Sexe				
Masculin			64,5	(55,7 – 73,0)
Féminin			69,5	(62,2 – 77,2)
1re prémolaire (no 34)	2,5**	(1,1 – 4,0)	88,7	(85,5 – 91,8)
Sexe				
Masculin			84,1	(78,3 – 89,9)
Féminin			93,2	(89,2 – 96,6)
Canine (no 33)	3,1*	(1,7 – 4,8)	91,8	(88,9 – 94,8)
Sexe				
Masculin			85,8	(80,1 – 91,4)
Féminin			97,8	(95,5 – 99,6)

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 9 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant inférieur gauche, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Quadrant inférieur gauche	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Incisive latérale (no 32)	79,5	(75,5 – 83,3)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
Incisive centrale (no 31)	99,0	(97,8 – 99,9)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 10 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant inférieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Quadrant inférieur droit	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
2e molaire (no 47)	n.p.	n.p.	61,8	(56,7 – 66,8)
Sexe				
Masculin			55,5	(47,7 – 63,0)
Féminin			68,1	(61,4 – 74,7)
1re molaire (no 46)	97,3	(95,3 – 99,1)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
2e prémolaire (no 45)	n.p.	n.p.	67,8	(63,3 – 72,2)
Sexe				
Masculin			64,2	(57,5 – 71,4)
Féminin			71,4	(64,7 – 78,0)
1re prémolaire (no 44)	2,8**	(1,2 – 4,4)	87,2	(83,0 – 91,3)
Sexe				
Masculin			82,8	(75,9 – 89,4)
Féminin			91,6	(86,9 – 95,8)
Canine (no 43)	3,5*	(2,0 – 5,3)	92,9	(89,8 – 95,8)
Sexe				
Masculin			88,2	(82,5 – 93,7)
Féminin			97,6	(94,9 – 99,8)

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 10 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de dents permanentes présentes dans le quadrant inférieur droit, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Quadrant inférieur droit	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Incisive latérale (no 42)	79,4	(74,9 – 83,3)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.
Incisive centrale (no 41)	98,7	(97,3 – 99,9)	n.p.	n.p.
Sexe				
Masculin			n.p.	n.p.
Féminin			n.p.	n.p.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 11 Nombre moyen de dents présentes en dentitions combinées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Aucune	23,25	(23,14 – 23,37)	25,89	(25,67 – 26,10)
Sexe				
Masculin	23,23	(23,06 – 23,39)	25,56	(25,28 – 25,84)
Féminin	23,28	(23,11 – 23,44)	26,22	(25,93 – 26,52)

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Annexe 3

Carie dentaire

Dentition temporaire

Tableau 12 Nombre moyen de dents cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (caod) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₆aod						
Toutes les composantes	4,59 [†]	(4,32 – 4,88)	3,70	1,97	(1,65 – 2,29)	1,82
Composante c	2,91 [†]	(2,63 – 3,18)	2,36	1,46 [†]	(1,22 – 1,71)	1,11
Composante a	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,06**	0,01**	(0,00 – 0,02)	0,01**
Composante o	1,60 [†]	(1,40 – 1,82)	1,28	0,50 [†] *	(0,34 – 0,66)	0,70
c₁₋₃aod						
Toutes les composantes	4,19 [†]	(3,93 – 4,47)	3,28	1,72	(1,43 – 2,04)	1,65
Composante c	2,50 [†]	(2,25 – 2,77)	1,94	1,22	(0,98 – 1,47)	0,94
Composante a	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,06**	0,01**	(0,00 – 0,02)	0,01**
Composante o	1,60 [†]	(1,40 – 1,82)	1,28	0,50 [†] *	(0,34 – 0,66)	0,70
c₄₋₆aod						
Toutes les composantes	2,78 [†]	(2,52 – 3,05)	2,34	1,17	(0,89 – 1,45)	1,24
Composante c	0,40	(0,32 – 0,49)	0,40	0,24*	(0,16 – 0,33)	0,17
Composante a	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,06**	0,01**	(0,00 – 0,02)	0,01**
Composante o	2,29 [†]	(2,04 – 2,53)	1,90	0,92	(0,68 – 1,19)	1,06

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 13 Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₆aof₈₈						
Toutes les composantes	9,96†	(9,16 – 10,85)	7,62	4,30	(3,52 – 5,11)	3,72
Composante c	4,34	(3,84 – 4,85)	3,72	2,40†	(1,98 – 2,81)	1,66
Composante a	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,04**	(0,00 – 0,12)	0,05**
Composante o	5,18†	(4,50 – 5,91)	3,58	1,86	(1,37 – 2,40)	2,01
c₁₋₃aof₈₈						
Toutes les composantes	9,23†	(8,45 – 10,10)	6,82	3,82	(3,11 – 4,56)	3,41
Composante c	3,61	(3,15 – 4,07)	2,92	1,92†	(1,56 – 2,31)	1,35
Composante a	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,04**	(0,00 – 0,12)	0,05**
Composante o	5,18†	(4,50 – 5,91)	3,58	1,86	(1,37 – 2,40)	2,01
c₄₋₆aof₈₈						
Toutes les composantes	6,73†	(5,95 – 7,56)	5,23	2,64	(2,02 – 3,28)	2,69
Composante c	0,73	(0,56 – 0,93)	0,75	0,48*	(0,29 – 0,68)	0,33
Composante a	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,04**	(0,00 – 0,12)	0,05**
Composante o	5,56†	(4,88 – 6,33)	4,25	2,11	(1,58 – 2,69)	2,32

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 14 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₁₋₆aof₈₈							
Toutes les composantes	0	14,6 [†]	(10,9 – 18,4)	24,5	29,0	(21,5 – 37,2)	31,7
	1 ou plus	85,4 [†]	(81,6 – 89,1)	75,5	71,0	(62,8 – 78,5)	68,3
Composante c	0	23,7 [†]	(18,7 – 28,8)	31,8	35,3	(27,2 – 44,1)	45,8
	1 ou plus	76,3 [†]	(71,2 – 81,3)	68,2	64,7	(55,9 – 72,8)	54,2
Composante a	0	94,3	(92,0 – 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 – 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	0,9 ^{**}
Composante o	0	51,5	(47,3 – 55,9)	54,7	59,5	(51,0 – 67,9)	59,3
	1 ou plus	48,5	(44,1 – 52,7)	45,3	40,5	(32,1 – 49,0)	40,7
c₁₋₃aof₈₈							
Toutes les composantes	0	15,1 [†]	(11,2 – 18,9)	24,9	30,9	(23,0 – 39,5)	34,2
	1 ou plus	84,9 [†]	(81,1 – 88,8)	75,1	69,1	(60,5 – 77,0)	65,8
Composante c	0	25,4 [†]	(20,5 – 30,6)	33,2	38,0	(29,8 – 46,7)	49,7
	1 ou plus	74,6 [†]	(69,4 – 79,5)	66,8	62,0	(53,3 – 70,2)	50,3
Composante a	0	94,3	(92,0 – 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 – 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	0,9 ^{**}
Composante o	0	51,5	(47,3 – 55,9)	54,7	59,5	(51,0 – 67,9)	59,3
	1 ou plus	48,5	(44,1 – 52,7)	45,3	40,5	(32,1 – 49,0)	40,7

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 14 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie, en dentition temporaire (88 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₄₋₆aof₈₈							
Toutes les composantes	0	43,2	(38,7 – 47,5)	48,1	52,6	(44,7 – 60,9)	53,1
	1 ou plus	56,8	(52,5 – 61,3)	51,9	47,4	(39,1 – 55,3)	46,9
Composante c	0	79,7	(75,6 – 83,7)	81,5	85,0	(80,0 – 89,6)	87,8
	1 ou plus	20,3	(16,3 – 24,4)	18,5	15,0*	(10,4 – 20,0)	12,2
Composante a	0	94,3	(92,0 – 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7*	(3,6 – 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	0,9**
Composante o	0	49,7	(45,5 – 53,9)	53,8	58,8	(50,3 – 67,2)	57,4
	1 ou plus	50,3	(46,1 – 54,5)	46,2	41,2	(32,8 – 49,7)	42,6

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 15 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	60,9	(54,1 – 67,3)	57,4	73,1	(66,2 – 80,0)	78,1
	1 ou plus	39,1	(32,7 – 45,9)	42,6	26,9	(20,0 – 33,8)	21,9
Stade 2	0	38,7†	(32,8 – 44,5)	57,4	51,8	(43,2 – 61,3)	62,2
	1 ou plus	61,3†	(55,5 – 67,2)	42,6	48,2	(38,7 – 56,8)	37,8
Stade 3	0	82,7†	(78,3 – 86,6)	87,5	84,0†	(77,4 – 90,1)	94,8
	1 ou plus	17,3†	(13,4 – 21,7)	12,5	16,0†*	(9,9 – 22,6)	5,2*
Stade 4	0	92,6†	(89,8 – 95,3)	86,6	95,0	(91,5 – 97,9)	93,4
	1 ou plus	7,4†*	(4,7 – 10,2)	13,4	5,0**	(2,1 – 8,5)	6,6
Stade 5	0	82,7†	(78,7 – 86,5)	88,7	87,3†	(82,8 – 91,7)	92,9
	1 ou plus	17,3†	(13,5 – 21,3)	11,3	12,7†*	(8,3 – 17,2)	7,1
Stade 6	0	95,6	(93,6 – 97,4)	93,8	95,7	(92,5 – 98,7)	95,2
	1 ou plus	4,4*	(2,6 – 6,4)	6,2	4,3**	(1,3 – 7,5)	4,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	14,6 [†]	(10,9 – 18,4)	24,5	0	29	(21,5 – 37,2)	31,7
	1 à 4	25,6	(20,9 – 30,1)	27,4	1 à 4	37,2	(29,8 – 44,6)	39,9
	5 à 9	18,4	(14,3 – 22,6)	18,4	5 ou plus	33,7	(26,6 – 40,8)	28,4
	10 ou plus	41,3 [†]	(37,0 – 45,8)	29,7				
Variable sociodémographique								
Sexe				p=0,4966				
Masculin	0	12,7*	(7,6 – 18,4)					
	1 à 4	27,3	(21,0 – 33,9)					
	5 à 9	19,9	(13,7 – 26,1)					
	10 ou plus	40,1	(33,3 – 47,0)					
Féminin	0	16,7*	(11,4 – 21,6)					
	1 à 4	23,8	(18,8 – 29,2)					
	5 à 9	16,9*	(11,8 – 22,3)					
	10 ou plus	42,6	(36,6 – 48,7)					

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0166	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison						
Au moins le français	0	14,7*	(9,3 – 20,4)			
	1 à 4	28,3	(21,6 – 35,1)			
	5 à 9	19,5*	(13,4 – 25,9)			
	10 ou plus	37,6	(30,7 – 44,7)			
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	19,8*	(10,6 – 29,4)			
	1 à 4	27,4*	(19,2 – 35,8)			
	5 à 9	15,4*	(8,9 – 23,8)			
	10 ou plus	37,3	(28,6 – 46,2)			
Ni le français, ni l'anglais	0	11,1**	(3,5 – 19,6)			
	1 à 4	14,5**	(5,6 – 24,0)			
	5 à 9	14,2*	(7,5 – 21,3)			
	10 ou plus	60,2	(49,3 – 71,3)			
Non-réponse partielle ¹				1,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,3184	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
1 enfant	0	10,5**	(4,1 – 18,2)			
	1 à 4	25,6*	(14,4 – 35,9)			
	5 à 9	17,7**	(7,6 – 29,7)			
	10 ou plus	46,1	(35,3 – 57,1)			
2 enfants	0	19,4*	(13,0 – 25,8)			
	1 à 4	24,5	(17,7 – 31,7)			
	5 à 9	18,8 *	(13,0 – 25,2)			
	10 ou plus	37,3	(29,7 – 45,5)			
3 enfants	0	10,6**	(4,5 – 16,9)			
	1 à 4	26,7	(18,6 – 34,8)			
	5 à 9	15,6	(8,0 – 23,8)			
	10 ou plus	47,1	(37,9 – 56,6)			
4 enfants ou plus	0	16,1**	(3,5 – 29,5)			
	1 à 4	14,1**	(3,6 – 26,9)			
	5 à 9	15,1**	(3,3 – 29,3)			
	10 ou plus	54,7*	(35,8 – 72,9)			
Non-réponse partielle ¹				3,1%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=n.p.	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Plus haut niveau de scolarité de la mère						
Pas de diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.			
	1 à 4	n.p.	n.p.			
	5 à 9	n.p.	n.p.			
	10 ou plus	n.p.	n.p.			
Diplôme d'études secondaires	0	11,4**	(13,7 – 19,7)			
	1 à 4	19,2**	(8,4 – 31,7)			
	5 à 9	19,2**	(9,6 – 29,9)			
	10 ou plus	50,3	(36,7 – 63,7)			
Diplôme d'études postsecondaires	0	16,8	(12,2 – 21,5)			
	1 à 4	25,2	(19,9 – 30,5)			
	5 à 9	17,6	(12,8 – 22,7)			
	10 ou plus	40,3	(34,9 – 45,9)			
Non-réponse partielle ¹				3,5%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0013	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents							
Deux parents non-immigrants	0	23,6	(17,2 – 30,7)				
	1 à 4	27,5	(20,5 – 34,5)				
	5 à 9	20,5*	(13,0 – 28,3)				
	10 ou plus	28,4	(21,8 – 35,4)				
Deux parents immigrants récents	0	10,3**	(1,2 - 20,6)				
	1 à 4	27,1**	(10,7 - 44,1)				
	5 à 9	18,4**	(5,5 - 33,3)				
	10 ou plus	44,2*	(30,0 - 59,7)				
Autres combinaisons	0	10,7**	(5,8 - 16,2)				
	1 à 4	22,5	(16,7 - 27,9)				
	5 à 9	14,7*	(9,7 - 19,8)				
	10 ou plus	52,1	(45,3 - 59,5)				
Non-réponse partielle ¹				5,4%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,1134	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Indice régional de défavorisation sociale						
Quartile 1 (favorisé)	0	15,4*	(8,6 – 22,8)			
	1 à 4	29,5	(20,8 – 37,9)			
	5 à 9	19,8*	(11,9 – 28,1)			
	10 ou plus	35,3	(27,7 – 43,9)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	17,8*	(11,9 – 24,3)			
	1 à 4	21,9	(15,4 – 28,4)			
	5 à 9	16,1*	(9,6 – 23,1)			
	10 ou plus	44,2	(36,8 – 51,1)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	6,0**	(1,1 – 11,8)			
	1 à 4	22,9*	(13,5 – 33,0)			
	5 à 9	17,6**	(8,3 – 28,1)			
	10 ou plus	53,6	(41,8 – 64,8)			
Non-réponse partielle ¹				9,9 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
				p=0,0220		
Quartile 1 (favorisé)	0	23,7*	(14,7 – 32,3)			
	1 à 4	31,3*	(21,1 – 42,4)			
	5 à 9	15,9*	(8,9 – 24,0)			
	10 ou plus	29,1*	(19,2 – 39,9)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	13,0*	(7,3 – 19,0)			
	1 à 4	20,6*	(13,4 – 28,1)			
	5 à 9	17,2*	(11,2 – 23,2)			
	10 ou plus	49,2	(41,8 – 57,0)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	10,2**	(4,5 – 16,8)			
	1 à 4	25,5*	(17,4 – 34,6)			
	5 à 9	19,8*	(12,8 – 27,9)			
	10 ou plus	44,5	(35,1 – 53,1)			
Non-réponse partielle ¹				9,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p=0,0254			
Quartile 1 (favorisé)	0	21,3*	(13,8 – 28,7)				
	1 à 4	26,2	(18,9 – 33,4)				
	5 à 9	17,2*	(10,6 – 23,6)				
	10 ou plus	35,4	(27,3 – 44,8)				
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	15,2*	(8,9 – 22,2)				
	1 à 4	24,1*	(15,6 – 33,4)				
	5 à 9	17,9*	(10,5 – 24,7)				
	10 ou plus	42,8	(34,8 – 51,3)				
Quartile 4 (défavorisé)	0	6,6**	(2,4 – 11,4)				
	1 à 4	23,5	(16,4 – 30,8)				
	5 à 9	18,0*	(10,9 – 26,0)				
	10 ou plus	51,9	(43,6 – 59,9)				
Non-réponse partielle ¹				9,9%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])						
						p=0,0830
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	19,5*	(11,8 – 27,1)			
	1 à 4	24,6	(17,0 – 32,1)			
	5 à 9	21,4*	(13,2 - 29,5)			
	10 ou plus	34,6	(26,7 – 42,9)			
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	18,1*	(9,8 – 26,9)			
	1 à 4	25,3*	(14,7 – 36,6)			
	5 à 9	20,4*	(11,2 – 30,0)			
	10 ou plus	36,2	(27,2 – 45,8)			
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	9,2*	(5,1 – 13,8)			
	1 à 4	26,5	(20,5 – 32,2)			
	5 à 9	15,2*	(9,6 – 21,4)			
	10 ou plus	49,1	(42,7 – 55,8)			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Prestations de l'aide sociale						
Aucun parent	0	17,2	(12,8 – 21,7)	p=n.p.		
	1 à 4	26,2	(21,4 – 31,0)			
	5 à 9	16,9	(12,3 – 21,6)			
	10 ou plus	39,7	(34,9 - 45,0)			
Au moins un parent	0	n.p.	n.p.			
	1 à 4	n.p.	n.p.			
	5 à 9	22,4**	(11,3 - 36,3)			
	10 ou plus	53,6	(36,6 - 70,0)			
Non-réponse partielle ¹				5,2 %		
Assurance dentaire privée						
Oui	0	21,1	(14,8 – 27,3)	p=0,0114		
	1 à 4	23,5	(17,6 – 29,7)			
	5 à 9	18,4*	(11,8 – 24,9)			
	10 ou plus	37,0	(31,0 – 43,5)			
Non	0	10,1*	(5,8 – 14,8)			
	1 à 4	28,3	(21,4 – 35,0)			
	5 à 9	15,3*	(10,2 – 20,7)			
	10 ou plus	46,3	(39,4 – 53,2)			
Non-réponse partielle ¹				7,4 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0003	6 ^e année				
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		
Revenu le plus élevé des parents									
Moins de 40 000 \$	0	7,7**	(3,9 - 11,8)						
	1 à 4	26,1	(18,2 - 33,5)						
	5 à 9	15,3*	(10,0 - 21,1)						
	10 ou plus	50,9	(43,5 - 58,5)						
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	17,0*	(10,3 - 24,7)						
	1 à 4	23,9*	(15,9 - 31,8)						
	5 à 9	23,9*	(14,6 - 33,9)						
	10 ou plus	35,1	(23,3 - 44,7)						
75 000 \$ et plus	0	29,1*	(18,8 - 39,6)						
	1 à 4	24,3*	(15,9 - 32,8)						
	5 à 9	15,1**	(6,8 - 24,2)						
	10 ou plus	31,5*	(21,4 - 43,7)						
Non-réponse partielle¹							10,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 16 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					
Faible	0	41,8*	(22,1 – 61,3)	p<0,0001	
	1 à 4	27,3**	(10,8 – 46,3)		
	5 à 9	16,8**	(2,2 – 36,0)		
	10 ou plus	14,2**	(0,2 – 30,2)		
Moyen	0	15,2*	(10,6 – 20,2)		
	1 à 4	26,4	(20,7 – 32,2)		
	5 à 9	20,7	(15,4 – 26,4)		
	10 ou plus	37,7	(31,8 – 43,3)		
Élevé	0	5,2**	(1,2 – 9,6)		
	1 à 4	21,8*	(13,4 – 30,1)		
	5 à 9	12,3**	(6,0 – 19,6)		
	10 ou plus	60,7	(51,4 – 70,8)		
Non-réponse partielle ¹			0,2 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	15,1 [†]	(11,2 – 18,9)	24,9	0	30,9	(23,0 – 39,5)	34,2
	1 à 4	27,5	(23,0 – 32,0)	29,6	1 à 4	38,1	(30,2 – 45,6)	39,4
	5 à 9	20,4	(16,6 – 24,5)	18,6	5 ou plus	31,1	(24,1 – 38,1)	26,4
	10 ou plus	37,0 [†]	(32,8 – 41,5)	26,9				
Variable sociodémographique								
Sexe				p=0,4626				
Masculin	0	13,0*	(8,1 – 18,7)					
	1 à 4	30,1	(23,6 – 36,7)					
	5 à 9	19,5	(13,7 – 25,1)					
	10 ou plus	37,4	(30,8 – 44,2)					
Féminin	0	17,1	(12,0 – 22,2)					
	1 à 4	24,8	(19,8 – 30,1)					
	5 à 9	21,4	(16,1 – 27,4)					
	10 ou plus	36,7	(30,5 – 43,2)					

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p=0,0282		
Au moins le français	0	14,9*	(9,5 – 20,7)			
	1 à 4	31,2	(25,0 – 37,8)			
	5 à 9	20,6	(14,5 – 26,9)			
	10 ou plus	33,4	(27,6 – 40,0)			
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	20,3*	(11,1 – 30,0)			
	1 à 4	28,0*	(19,2 – 36,8)			
	5 à 9	16,3*	(9,4 – 24,7)			
	10 ou plus	35,4	(26,6 – 44,2)			
Ni le français, ni l'anglais	0	12,0**	(4,1 – 20,9)			
	1 à 4	14,5**	(5,6 – 24,0)			
	5 à 9	20,7**	(10,8 – 30,9)			
	10 ou plus	52,8	(42,0 – 63,8)			
Non-réponse partielle ¹				1,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,5128	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Nombre d'enfants dans la maison						
1 enfant	0	11,2**	(4,6 – 9,1)			
	1 à 4	25,7*	(14,3 – 36,3)			
	5 à 9	21,8**	(10,5 – 34,3)			
	10 ou plus	41,3	(31,0 – 52,3)			
2 enfants	0	19,4*	(13,0 – 25,8)			
	1 à 4	26,5	(19,4 – 33,8)			
	5 à 9	19,4	(14,0 – 25,1)			
	10 ou plus	34,8	(27,7 – 43,2)			
3 enfants	0	11,4**	(5,5 – 17,9)			
	1 à 4	28,5	(20,1 – 36,7)			
	5 à 9	20,1*	(12,6 – 28,1)			
	10 ou plus	40,0	(31,1 – 49,9)			
4 enfants ou plus	0	17,6**	(5,0 – 30,7)			
	1 à 4	18,7**	(5,9 – 33,0)			
	5 à 9	13,8**	(3,3 – 26,9)			
	10 ou plus	49,9*	(31,3 – 68,7)			
Non-réponse partielle ¹				3,1%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=n.p.	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Plus haut niveau de scolarité de la mère						
Pas de diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.			
	1 à 4	n.p.	n.p.			
	5 à 9	n.p.	n.p.			
	10 ou plus	n.p.	n.p.			
Diplôme d'études secondaires	0	11,4**	(3,7 – 19,7)			
	1 à 4	20,7**	(9,8 – 33,4)			
	5 à 9	20,4*	(10,6 – 30,6)			
	10 ou plus	47,5	(33,3 – 61,9)			
Diplôme d'études postsecondaires	0	17,2	(12,5 – 21,8)			
	1 à 4	27,0	21,7 – 32,3)			
	5 à 9	20,2	(15,6 – 25,1)			
	10 ou plus	35,6	(30,5 – 41,0)			
Non-réponse partielle ¹				4,5%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0073	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Statut d'immigration des parents						
Deux parents non-immigrants	0	24,0	(17,5 - 31,2)			
	1 à 4	29,7	(23,1 - 36,7)			
	5 à 9	18,6*	(12,1 - 25,3)			
	10 ou plus	27,6	(21,2 - 34,5)			
Deux parents immigrants récents	0	12,1**	(2,5 - 23,1)			
	1 à 4	27,1**	(10,7 - 44,1)			
	5 à 9	25,6**	(10,7 - 41,7)			
	10 ou plus	35,2*	(21,3 - 49,8)			
Autres combinaisons	0	11,0*	(6,0 - 16,4)			
	1 à 4	23,6	(17,6 - 29,4)			
	5 à 9	19,1	(13,3 - 24,6)			
	10 ou plus	46,3	(39,0 - 54,4)			
Non-réponse partielle ¹				5,4%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0776	6 ^e année				
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		
Indice régional de défavorisation sociale									
Quartile 1 (favorisé)	0	15,8*	(8,9 - 23,2)						
	1 à 4	32,9	(24,5 - 41,1)						
	5 à 9	16,9*	(9,4 - 24,8)						
	10 ou plus	34,4	(26,9 - 43,0)						
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	12,5*	(12,5 - 25,3)						
	1 à 4	22,7	(16,0 - 29,8)						
	5 à 9	19,4*	(12,7 - 26,5)						
	10 ou plus	39,4	(32,5 - 46,3)						
Quartile 4 (défavorisé)	0	6,0**	(1,1 - 11,8)						
	1 à 4	24,8*	(15,2 - 34,9)						
	5 à 9	25,6*	(16,3 - 34,6)						
	10 ou plus	43,6	(32,9 - 54,5)						
Non-réponse partielle ¹							9,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
			p=0,0234			
Quartile 1 (favorisé)	0	24,3*	(15,2 – 33,4)			
	1 à 4	34,3*	(23,4 – 45,4)			
	5 à 9	13,6*	(7,3 – 21,2)			
	10 ou plus	27,9*	(18,1 – 38,4)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	13,3*	(7,5 – 19,4)			
	1 à 4	22,1*	(14,7 – 29,6)			
	5 à 9	21,9	(15,2 – 28,4)			
	10 ou plus	42,8	(34,5 – 51,0)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	10,9**	(4,9 – 17,8)			
	1 à 4	27,2*	(18,8 – 36,2)			
	5 à 9	21,4*	(14,1 – 29,4)			
	10 ou plus	40,5	(31,1 – 49,3)			
Non-réponse partielle ¹					9,9%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		P=0,0208	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale						
Quartile 1 (favorisé)	0	22,0*	(14,4 – 29,7)	9,9%		
	1 à 4	29,0	(21,5 – 36,2)			
	5 à 9	14,9*	(8,7 – 20,9)			
	10 ou plus	34,1	(26,1 – 43,2)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	15,2*	(8,9 – 22,2)			
	1 à 4	24,8*	(16,3 – 34,6)			
	5 à 9	21,4*	(14,5 – 27,9)			
	10 ou plus	38,5	(30,4 – 47,4)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	7,3*	(2,6 – 12,7)			
	1 à 4	25,5	(18,3 – 33,1)			
	5 à 9	23,5*	(16,2 – 31,0)			
	10 ou plus	43,7	(35,6 – 51,7)			
Non-réponse partielle ¹						

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])						
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	20,3*	(12,4 – 28,0)			
	1 à 4	25,9*	(17,9 – 34,3)			
	5 à 9	21,8*	(13,6 – 29,7)			
	10 ou plus	31,9	(23,6 – 40,6)			
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	18,1*	(9,8 – 26,9)			
	1 à 4	26,4*	(16,3 – 37,2)			
	5 à 9	22,1*	(14,6 – 29,6)			
	10 ou plus	33,4	(24,7 – 42,3)			
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	9,6*	(5,4 – 14,3)			
	1 à 4	29,2	(23,1 – 34,9)			
	5 à 9	18,4*	(12,5 – 24,7)			
	10 ou plus	42,8	(36,3 – 49,5)			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				p=n.p.			
Aucun parent	0	17,5	(12,9 - 22,0)				
	1 à 4	27,8	(23,0 - 32,6)				
	5 à 9	19,1	(14,6 - 23,3)				
	10 ou plus	35,6	(30,5 - 41,0)				
Au moins un parent	0	n.p.	n.p.				
	1 à 4	n.p.	n.p.				
	5 à 9	24,7*	(13,0 - 39,1)				
	10 ou plus	47,2*	(31,0 - 63,8)				
Non-réponse partielle ¹				5,2%			
Assurance dentaire privée				p=0,0342			
Oui	0	21,6	(15,3 - 27,8)				
	1 à 4	25,8	(20,0 - 32,2)				
	5 à 9	18,9*	(13,0 - 24,9)				
	10 ou plus	33,7	(27,7 - 40,1)				
Non	0	10,6*	(6,2 - 15,3)				
	1 à 4	29,5	(22,5 - 36,3)				
	5 à 9	19,6*	(13,3 - 26,1)				
	10 ou plus	40,3	(32,6 - 47,9)				
Non-réponse partielle ¹				7,4%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Revenu le plus élevé des parents				p=0,0007		
Moins de 40 000 \$	0	8,1*	(4,3 - 12,3)			
	1 à 4	27,8	(20,1 - 35,0)			
	5 à 9	19,5*	(13,6 - 25,5)			
	10 ou plus	44,6	(37,2 - 52,4)			
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	17,0*	(10,3 - 24,7)			
	1 à 4	26,5*	(17,5 - 35,1)			
	5 à 9	24,3*	(14,7 - 34,0)			
	10 ou plus	32,1	(23,1 - 41,8)			
75 000 \$ et plus	0	30,3*	(20,2 - 40,8)			
	1 à 4	25,8*	(17,0 - 34,6)			
	5 à 9	14,7*	(7,3 - 22,7)			
	10 ou plus	29,2*	(18,8 - 42,0)			
Non-réponse partielle ¹				10,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 17 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année					
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %			
Variable buccodentaire									
Niveau d'accumulation de débris									
Faible	0	41,8	(22,1 – 61,3)	p=n.p.					
	1 à 4	27,3**	(10,8 – 46,3)						
	5 à 9	n.p.	n.p.						
	10 ou plus	n.p.	n.p.						
Moyen	0	15,8*	(11,1 – 20,9)						
	1 à 4	28,1	(22,7 – 33,6)						
	5 à 9	23,4	(18,0 – 29,1)						
	10 ou plus	32,7	(27,2 – 38,1)						
Élevé	0	5,2**	(1,2 – 9,6)						
	1 à 4	24,7*	(16,1 – 33,2)						
	5 à 9	12,1**	(5,3 – 20,0)						
	10 ou plus	58,0	(48,0 – 68,6)						
Non-réponse partielle ¹							0,2%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %
Aucune	0	43,2	(38,7 – 47,5)	0	52,6	(44,7 – 60,9)
	1 à 4	15,0	(10,9 – 19,6)	1 à 4	25,7	(19,9 – 31,7)
	5 à 9	14,5	(10,8 – 18,6)	5 ou plus	21,7*	(15,3 – 28,4)
	10 ou plus	27,3	(23,1 – 31,6)			
Variable socio-démographique						
Sexe						
Masculin	0	44,1	(36,9 – 50,7)	p=0,3524		
	1 à 4	14,4*	(9,3 – 20,0)			
	5 à 9	16,9*	(11,5 – 22,7)			
	10 ou plus	24,7	(18,8 – 30,6)			
Féminin	0	42,3	(36,4 – 48,1)			
	1 à 4	15,6*	(10,6 – 21,3)			
	5 à 9	12,1*	(7,9 – 17,1)			
	10 ou plus	30,0	(23,9 – 36,1)			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0308	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison						
Au moins le français	0	47,8	(40,3 – 55,0)			
	1 à 4	13,8*	(8,3 – 19,4)			
	5 à 9	13,5*	(8,8 – 18,5)			
	10 ou plus	24,8	(18,9 – 31,2)			
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	44,6	(34,9 – 54,1)			
	1 à 4	17,8*	(10,5 – 25,5)			
	5 à 9	13,2*	(7,2 – 19,6)			
	10 ou plus	24,4*	(16,5 – 32,7)			
Ni le français, ni l'anglais	0	27,1*	(15,4 – 38,5)			
	1 à 4	13,5**	(5,4 – 24,5)			
	5 à 9	19,5*	(10,1 – 29,4)			
	10 ou plus	39,9	(30,6 – 50,3)			
Non-réponse partielle ¹				1,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,5488	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Nombre d'enfants dans la maison						
1 enfant	0	44,6	(32,2 – 56,2)	3,1%		
	1 à 4	9,9**	(3,1 – 17,7)			
	5 à 9	16,5*	(8,4 – 25,6)			
	10 ou plus	28,9*	(19,6 – 39,5)			
2 enfants	0	45,4	(37,2 – 53,0)			
	1 à 4	14,7 *	(9,1 – 21,1)			
	5 à 9	14,5*	(9,4 – 19,9)			
3 enfants	10 ou plus	25,4	(18,8 – 33,1)			
	0	38,0	(29,4 – 46,2)			
	1 à 4	16,4*	(8,7 – 24,7)			
4 enfants ou plus	5 à 9	11,9**	(5,6 – 19,4)			
	10 ou plus	33,6	(24,6 – 43,0)			
	0	32,5*	(16,9 – 49,5)			
Non-réponse partielle ¹	1 à 4	18,4**	(5,5 – 33,4)			
	5 à 9	24,2**	(7,7 – 41,6)			
	10 ou plus	24,9**	(9,6 – 41,9)			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=n.p.	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère							
Pas de diplôme d'études secondaires	0	38,9*	(18,1 – 59,5)				
	1 à 4	13,3**	(1,6 – 26,8)				
	5 à 9	n.p.	n.p.				
	10 ou plus	n.p.	n.p.				
Diplôme d'études secondaires	0	30,1*	(19,1 – 42,8)				
	1 à 4	16,1**	(6,9 – 26,6)				
	5 à 9	15,9**	(5,7 – 26,9)				
	10 ou plus	38,0	(26,0 – 49,1)				
Diplôme d'études postsecondaires	0	44,8	(39,6 – 50,0)				
	1 à 4	14,6*	(9,8 – 20,1)				
	5 à 9	15,2	(11,3 – 19,6)				
	10 ou plus	25,3	(21,0 – 30,1)				
Non-réponse partielle ¹				4,5%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=n.p.	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents							
Deux parents non-immigrants	0	51,2	(43,2 – 59,5)				
	1 à 4	15,6*	(9,6 – 22,0)				
	5 à 9	9,9**	(5,0 – 15,2)				
	10 ou plus	23,3	(17,4 – 29,1)				
Deux parents immigrants récents	0	47,8*	(30,4 - 63,8)				
	1 à 4	12,2**	(3,2 - 22,9)				
	5 à 9	n.p.	n.p.				
	10 ou plus	n.p.	n.p.				
Autres combinaisons	0	35,2	(28,9 - 41,3)				
	1 à 4	14,1*	(8,7 - 20,0)				
	5 à 9	20,7*	(14,5 - 27,5)				
	10 ou plus	29,9	(23,1 - 36,6)				
Non-réponse partielle ¹				5,4%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,8221	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale							
Quartile 1 (favorisé)	0	42,5	(34,7 – 50,6)	p=0,8221			
	1 à 4	15,7*	(9,7 – 22,8)				
	5 à 9	15,1*	(7,9 – 22,0)				
	10 ou plus	26,6	(20,2 – 33,1)				
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	44,6	(37,3 – 52,1)				
	1 à 4	12,1*	(6,7 – 18,1)				
	5 à 9	16,1*	(10,3 – 22,7)				
	10 ou plus	27,2	(19,5 – 34,2)				
Quartile 4 (défavorisé)	0	36,0	(25,7 – 47,7)				
	1 à 4	16,8**	(8,1 – 25,9)				
	5 à 9	15,1**	(6,5 – 24,1)				
	10 ou plus	32,1*	(21,4 – 43,9)				
Non-réponse partielle ¹					9,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
Quartile 1 (favorisé)	0	61,0	(49,4 – 71,9)			
	1 à 4	9,4**	(3,7 – 15,8)			
	5 à 9	10,6**	(5,1 – 17,2)			
	10 ou plus	19,0*	(10,5 – 28,9)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	37,7	(30,0 – 45,2)			
	1 à 4	14,2*	(8,4 – 21,1)			
	5 à 9	15,6*	(9,7 – 21,8)			
	10 ou plus	32,5	(24,9 – 40,1)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	34,3	(26,5 – 42,5)			
	1 à 4	18,1*	(10,7 – 26,9)			
	5 à 9	19,5*	(12,0 – 28,2)			
	10 ou plus	28,1*	(19,3 – 37,0)			
Non-réponse partielle ¹						9,9%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,1718	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale							
Quartile 1 (favorisé)	0	49,4	(40,3 – 58,0)	p=0,1718			
	1 à 4	12,3*	(7,1 – 18,4)				
	5 à 9	12,6*	(6,0 – 19,0)				
	10 ou plus	25,8	(18,5 – 33,9)				
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	43,2	(35,2 – 50,8)				
	1 à 4	12,9**	(6,6 – 20,2)				
	5 à 9	18,5*	(11,4 – 25,7)				
	10 ou plus	25,5*	(17,4 – 33,9)				
Quartile 4 (défavorisé)	0	33,0	(25,3 – 41,2)				
	1 à 4	18,0*	(10,5 – 26,6)				
	5 à 9	15,7*	(8,9 – 23,2)				
	10 ou plus	33,2	(24,7 – 41,1)				
Non-réponse partielle ¹					9,9%		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p=0,3677			
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	46,2	(37,5 – 55,3)				
	1 à 4	14,3**	(6,7 – 24,7)				
	5 à 9	17,1*	(9,6 – 24,3)				
	10 ou plus	22,4	(16,7 – 28,3)				
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	49,1	(38,7 – 59,6)				
	1 à 4	16,5**	(6,9 – 27,9)				
	5 à 9	10,1**	(2,7 – 18,6)				
	10 ou plus	24,3*	16,2 – 32,8)				
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	37,4	(31,8 – 43,1)				
	1 à 4	14,6*	(9,2 – 10,1)				
	5 à 9	15,6*	(10,3 – 21,4)				
	10 ou plus	32,4	(25,0 – 39,7)				

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				p=0,3484			
Aucun parent	0	45,1	(40,5 – 49,6)				
	1 à 4	14,4*	(10,0 – 19,3)				
	5 à 9	13,4	(9,6 – 17,3)				
	10 ou plus	27,1	(22,8 – 31,7)				
Au moins un parent	0	33,1*	(15,8 - 49,3)				
	1 à 4	14,4**	(5,4 - 26,6)				
	5 à 9	22,2**	(9,2 - 37,5)				
	10 ou plus	30,3*	(16,2 - 45,6)				
Non-réponse partielle ¹				5,2%			
Assurance dentaire privée				p=0,8441			
Oui	0	40,7	(32,5 – 48,2)				
	1 à 4	14,7*	(8,7 – 21,6)				
	5 à 9	15,4*	(10,1 – 21,0)				
	10 ou plus	29,2	(21,9 – 37,1)				
Non	0	44,3	(37,3 – 50,7)				
	1 à 4	15,7*	(10,2 – 22,0)				
	5 à 9	14,0*	(9,4 – 19,1)				
	10 ou plus	26,0	(20,4 – 32,3)				
Non-réponse partielle ¹				7,4%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0874	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents							
Moins de 40 000 \$	0	38,8	(30,4 - 46,8)				
	1 à 4	12,6*	(7,7 - 18,4)				
	5 à 9	15,7*	(10,0 - 22,0)				
	10 ou plus	32,9	(25,1 - 41,1)				
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	39,6	(30,7 - 48,1)				
	1 à 4	18,6*	(10,6 - 26,7)				
	5 à 9	17,9**	(9,2 - 27,8)				
	10 ou plus	24,0*	(15,7 - 32,9)				
75 000 \$ et plus	0	55,7	(43,3 - 65,9)				
	1 à 4	14,7**	(7,7 - 23,1)				
	5 à 9	8,3**	(2,6 - 14,4)				
	10 ou plus	21,3*	(12,2 - 33,0)				
Non-réponse partielle ¹				10,9%			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 18 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris						
Faible	0	68,9	(51,6 – 88,2)			
	1 à 4	14,8**	(2,1 – 31,3)			
	5 à 9	n.p.	n.p.			
	10 ou plus	n.p.	n.p.			
Moyen	0	45,2	(39,6 – 50,7)			
	1 à 4	15,1*	(10,2 – 20,5)			
	5 à 9	15,7	(11,5 – 20,2)			
	10 ou plus	24,0	(18,8 – 29,2)			
Élevé	0	28,9*	(19,8 – 37,7)			
	1 à 4	15,0**	(7,6 – 23,1)			
	5 à 9	11,0**	(4,5 – 19,2)			
	10 ou plus	45,1	(35,9 – 55,0)			
Non-réponse partielle ¹						0,2%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Dentition permanente

Tableau 19 Nombre moyen de dents cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (CAOD) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆AOD						
Toutes les composantes	2,01	(1,81 – 2,22)	1,83	5,33	(4,88 – 5,79)	4,91
Composante C	1,92	(1,71 – 2,14)	1,71	5,00	(4,56 – 5,47)	4,53
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00***	(-)	0,01**
Composante O	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,12*	0,33	(0,24 – 0,43)	0,37
C₁₋₃AOD						
Toutes les composantes	1,95	(1,76 – 2,16)	1,78	5,18	(4,74 – 5,62)	4,78
Composante C	1,86	(1,65 – 2,08)	1,67	4,86	(4,42 – 5,31)	4,39
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00***	(-)	0,01**
Composante O	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,12*	0,33	(0,24 – 0,43)	0,37
C₄₋₆AOD						
Toutes les composantes	0,25	(0,19 – 0,31)	0,22	0,95	(0,79 – 1,12)	0,93
Composante C	0,06*	(0,03 – 0,09)	0,05*	0,15*	(0,10 – 0,20)	0,15
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00***	(-)	0,01**
Composante O	0,19	(0,14 – 0,24)	0,17	0,80	(0,65 – 0,97)	0,76

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 20 Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128, 140, 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆AOF₁₂₈						
Toutes les composantes	3,11	(2,74 – 3,53)	3,03	8,60	(7,81 – 9,48)	8,05
Composante C	2,89	(2,50 – 3,32)	2,79	7,57	(6,80 – 8,38)	6,92
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,06**
Composante O	0,22*	(0,15 – 0,29)	0,23	1,03	(0,80 – 1,30)	1,08
C₁₋₆AOF₁₄₀						
Toutes les composantes	3,26	(2,87 – 3,70)	3,14	8,92	(8,08 – 9,84)	8,31
Composante C	3,02	(2,61 – 3,46)	2,90	7,79	(6,99 – 8,65)	7,09
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00**	(-)	0,07**
Composante O	0,24*	(0,17 – 0,32)	0,24	1,13	(0,88 – 1,42)	1,15
C₁₋₆AOF₁₄₄						
Toutes les composantes	3,59	(3,13 – 4,09)	3,43	9,70	(8,77 – 10,71)	9,02
Composante C	3,28	(2,82 – 3,80)	3,12	8,28	(7,43 – 9,18)	7,53
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,07**
Composante O	0,31*	(0,21 – 0,40)	0,31	1,42	(1,12 – 1,78)	1,43
C₁₋₃AOF₁₂₈						
Toutes les composantes	3,04	(2,67 – 3,46)	2,97	8,43	(7,65 – 9,27)	7,67
Composante C	2,83	(2,44 – 3,25)	2,74	7,40	(6,65 – 8,18)	6,72
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,06**
Composante O	0,22*	(0,15 – 0,29)	0,23	1,03	(0,80 – 1,30)	1,08

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 20 Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128, 140, 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₃AOF₁₄₀						
Toutes les composantes	3,19	(2,80 – 3,62)	3,09	8,74	(7,92 – 9,63)	8,11
Composante C	2,95	(2,54 – 3,39)	2,84	7,62	(6,84 – 8,43)	6,89
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,07**
Composante O	0,24*	(0,17 – 0,32)	0,24	1,13	(0,88 – 1,42)	1,15
C₁₋₃AOF₁₄₄						
Toutes les composantes	3,51	(3,07 – 4,02)	3,38	9,52	(8,60 – 10,50)	8,82
Composante C	3,20	(2,74 – 3,72)	3,06	8,1	(7,25 – 8,98)	7,32
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,07**
Composante O	0,31*	(0,21 – 0,40)	0,31	1,42	(1,12 – 1,78)	1,43
C₄₋₆AOF₁₂₈						
Toutes les composantes	0,34	(0,25 – 0,42)	0,31	1,46	(1,19 – 1,79)	1,49
Composante C	0,07**	(0,04 – 0,10)	0,06*	0,18*	(0,12 – 0,25)	0,21
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,06**
Composante O	0,27	(0,19 – 0,35)	0,25	1,28	(1,02 – 1,59)	1,23
C₄₋₆AOF₁₄₀						
Toutes les composantes	0,35	(0,26 – 0,45)	0,32	1,50	(1,22 – 1,83)	1,52
Composante C	0,07**	(0,04 – 0,12)	0,06*	0,18*	(0,12 – 0,25)	0,21
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,07**
Composante O	0,28	(0,20 – 0,36)	0,26	1,32	(1,05 – 1,63)	1,24

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 20 Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128, 140, 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₄₋₆AOF₁₄₄						
Toutes les composantes	0,41	(0,30 – 0,52)	0,38	1,76	(1,42 – 2,15)	1,77
Composante C	0,08*	(0,04 – 0,12)	0,07*	0,19*	(0,12 – 0,26)	0,22
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00***	(-)	0,07**
Composante O	0,33	(0,23 – 0,42)	0,31	1,57	(1,25 – 1,95)	1,48

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 21 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₁₋₆ AOF₁₂₈							
Toutes les composantes	0	26,1†	(21,4 – 30,8)	35,7	6,6†*	(4,3 – 9,2)	13,2
	1 ou plus	73,9†	(69,2 – 78,6)	64,3	93,4†	(90,8 – 95,7)	86,8
Composante c	0	27,5†	(22,7 – 32,3)	38,6	8,1†*	(5,5 – 10,8)	15,3
	1 ou plus	72,5†	(67,7 – 77,3)	61,4	91,9†	(89,2 – 94,5)	84,7
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,6
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,4**
Composante o	0	89,7	(86,5 – 92,7)	90,6	70,5	(65,3 – 75,4)	69,4
	1 ou plus	10,3	(7,3 – 13,5)	11,5	29,5	(24,6 – 34,7)	30,6
C₁₋₃ AOF₁₂₈							
Toutes les composantes	0	26,3†	(21,5 – 30,9)	35,9	6,6†*	(4,3 – 9,2)	13,2
	1 ou plus	73,7†	(69,1 – 78,5)	64,1	93,4†	(90,8 – 95,7)	86,8
Composante c	0	27,7	(22,8 – 32,5)	39,0	8,4†*	(5,8 – 11,1)	15,5
	1 ou plus	72,3	(67,5 – 77,2)	61,0	91,6†	(88,9 – 94,2)	84,5
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,6
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,4**
Composante o	0	89,7	(86,5 – 92,7)	90,6	70,5	(65,3 – 75,4)	69,4
	1 ou plus	10,3	(7,3 – 13,5)	9,4	29,5	(24,6 – 34,7)	30,6

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 21 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₄₋₆AOF₁₂₈							
Toutes les composantes	0	85,7	(82,2 – 89,0)	88,6	62,6	(57,3 – 67,7)	64,3
	1 ou plus	14,3	(11,0 – 17,8)	11,4	37,4	(32,3 – 42,7)	35,7
Composante c	0	95,8	(94,1 – 97,5)	96,8	90,3	(87,0 – 93,3)	91,6
	1 ou plus	4,2*	(2,5 – 5,9)	3,2	9,7*	(6,7 – 13,0)	8,4
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,6
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,4**
Composante o	0	88,3	(85,0 – 91,5)	91,0	68,0	(63,1 – 72,9)	68,0
	1 ou plus	11,7	(8,5 – 15,0)	9,0	32,0	(27,1 – 36,9)	32,0

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 22 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	58,2	(51,7 – 64,6)	53,8	32,7	(26,8 – 39,2)	33,9
	1 ou plus	41,8	(35,4 – 48,3)	46,2	67,3	(60,7 – 73,2)	66,1
Stade 2	0	47,4†	(42,1 – 52,7)	64,0	21,4†	(16,3 – 26,8)	36,7
	1 ou plus	52,6†	(47,3 – 57,9)	36,0	78,6†	(73,2 – 83,7)	63,3
Stade 3	0	91,1	(88,2 – 93,8)	92,6	72,0†	(66,5 – 77,3)	86,3
	1 ou plus	8,9*	(6,2 – 11,8)	7,4	28,0†	(22,7 – 33,5)	13,7
Stade 4	0	99,1	(98,1 – 99,9)	98,3	96,3	(94,3 – 98,1)	94,9
	1 ou plus	0,9**	(0,1 – 1,9)	1,7*	3,7**	(1,9 – 5,7)	5,1
Stade 5	0	96,7	(95,1 – 98,3)	98	93,4	(90,1 – 96,0)	95,4
	1 ou plus	3,3*	(1,7 – 4,9)	2,0*	6,6*	(4,0 – 9,9)	4,6
Stade 6	0	n.p.	n.p.	99,7	n.p.	n.p.	99,3
	1 ou plus	n.p.	n.p.	0,3**	n.p.	n.p.	0,7*

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	6,6 [†]	(4,3 – 9,2)	13,2
	1 à 4	29,1	(24,2 – 34,1)	30,2
	5 ou plus	64,3	(58,9 – 69,6)	56,6
Variable sociodémographique				
Sexe				p=0,4639
Masculin	0	5,1**	(2,3 – 8,3)	
	1 à 4	30,3	(24,4 – 36,1)	
	5 ou plus	64,6	(59,0 – 70,4)	
Féminin	0	8,0**	(3,9 – 12,7)	
	1 à 4	28,0	(20,8 – 35,4)	
	5 ou plus	64,0	(56,0 – 71,8)	

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p=n.p.
Au moins le français	0	6,8**	(3,0 – 11,3)	
	1 à 4	30,8	(23,1 – 38,2)	
	5 ou plus	62,4	(54,6 – 70,6)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	9,5**	(4,4 – 14,8)	
	1 à 4	31,0	(21,8 – 40,8)	
	5 ou plus	59,5	(49,3 – 68,9)	
Ni le français, ni l'anglais	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	22,9*	(14,0 – 33,0)	
	5 ou plus	n.p.	n..p.	
Non-réponse partielle ¹				1,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison			p=n.p.
1 enfant	0	6,0**	(0,5 – 13,5)
	1 à 4	30,8*	(20,3 – 40,7)
	5 ou plus	63,2	(52,2 – 74,1)
2 enfants	0	6,0*	(3,0 – 9,2)
	1 à 4	30,5	(23,7 – 37,1)
	5 ou plus	63,5	(57,0 – 69,9)
3 enfants	0	10,4**	(3,4 – 17,8)
	1 à 4	24,1*	(14,5 – 35,1)
	5 ou plus	65,5	(54,1 – 77,3)
4 enfants ou plus	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	33,9*	(17,0 – 50,8)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle¹			2,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	16,9**	(4,2 – 32,2)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	34,9*	(23,4 – 47,3)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Diplôme d'études postsecondaires	0	8,2*	(5,2 – 11,5)	
	1 à 4	30,4	(24,7 – 36,2)	
	5 ou plus	61,4	(55,5 – 67,3)	
Non-réponse partielle ¹				5,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Statut d'immigration des parents				p=n.p.
Deux parents non-immigrants	0	9,9**	(4,9 – 18,8)	
	1 à 4	35,8	(27,1 – 44,9)	
	5 ou plus	54,3	(44,9 – 64,0)	
Deux parents immigrants récents	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	21,5**	(7,1 - 39,6)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Autres combinaisons	0	5,5**	(2,5 - 8,7)	
	1 à 4	26,6	(20,1 - 33,4)	
	5 ou plus	67,9	(61,0 - 74,6)	
Non-réponse partielle ¹				6,7%
Indice régional de défavorisation sociale				p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	0	7,8**	(2,9 – 13,5)	
	1 à 4	30,0	(21,1 – 39,1)	
	5 ou plus	62,3	(53,2 – 70,8)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	6,3**	(2,9 – 10,2)	
	1 à 4	30,7	(21,8 – 39,6)	
	5 ou plus	63,0	(54,4 – 71,5)	
Quartile 4 (défavorisé)	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	23,5**	(9,1 – 38,0)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle ¹				7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique			
Indice régional de défavorisation matérielle			p=0,0249
Quartile 1 (favorisé)	0	10,7**	(5,3 – 16,6)
	1 à 4	37,8	(28,0 – 48,1)
	5 ou plus	51,6	(40,5 – 62,8)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	7,1**	(2,7 – 12,0)
	1 à 4	27,9	(20,3 – 35,6)
	5 ou plus	65,0	(57,2 – 72,4)
Quartile 4 (défavorisé)	0	3,1**	(0,3 – 6,6)
	1 à 4	25,2	(17,3 – 33,0)
	5 ou plus	71,7	(63,6 – 79,9)
Non-réponse partielle ¹			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p=0,0691
Quartile 1 (favorisé)	0	10,3**	(5,2 – 15,9)
	1 à 4	34,7	(25,1 – 45,0)
	5 ou plus	55,1	(45,6 – 64,5)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	5,0**	(1,2 – 9,4)
	1 à 4	29,4	(21,1 – 38,3)
	5 ou plus	65,6	(56,6 – 74,4)
Quartile 4 (défavorisé)	0	4,2**	(0,8 – 8,6)
	1 à 4	22,9*	(14,8 – 31,3)
	5 ou plus	72,9	(63,4 – 81,7)
Non-réponse partielle ¹			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p=0,0126
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	11,5*	(5,8 – 17,4)
	1 à 4	36,0	(28,2 – 44,7)
	5 ou plus	52,5	(43,0 – 62,1)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	6,0**	(1,4 – 11,1)
	1 à 4	22,3*	(13,5 – 31,5)
	5 ou plus	71,7	(62,5 – 80,9)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	3,3**	(1,0 – 6,2)
	1 à 4	29,3	(20,3 – 38,2)
	5 ou plus	67,4	(58,8 – 76,3)
Prestations de l'aide sociale			p=n.p.
Aucun parent	0	7,5*	(4,7 – 10,5)
	1 à 4	31,3	(25,9 – 36,7)
	5 ou plus	61,2	(55,4 – 67,3)
Au moins un parent	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	22,5**	(9,9 - 36,6)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			4,5%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Assurance dentaire privée				p=0,0042
Oui	0	10,2*	(6,1 – 14,7)	
	1 à 4	34,8	(26,9 – 42,4)	
	5 ou plus	55,0	(47,1 – 63,3)	
Non	0	3,6**	(1,1 – 6,4)	
	1 à 4	25,7	(19,2 – 32,8)	
	5 ou plus	70,7	(63,1 – 77,8)	
Non-réponse partielle ¹				6,7%
Revenu le plus élevé des parents				p=0,0001
Moins de 40 000 \$	0	2,6**	(0,5 - 5,1)	
	1 à 4	18,4*	(12,5 - 24,8)	
	5 ou plus	79,1	(72,1 - 85,4)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	10,0**	(4,5 - 16,3)	
	1 à 4	33,0	(23,5 - 42,2)	
	5 ou plus	57,0	(47,5 - 66,6)	
75 000 \$ et plus	0	10,7**	(3,8 - 18,7)	
	1 à 4	44,4*	(30,1 - 58,8)	
	5 ou plus	44,9*	(31,2 - 59,5)	
Non-réponse partielle ¹				13,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire			
Niveau d'accumulation de débris			
Faible	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	33,3*	(19,3 – 48,3)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
Moyen	0	7,2*	(4,3 – 10,0)
	1 à 4	29,3	(22,9 – 35,5)
	5 ou plus	63,6	(56,9 – 70,5)
Élevé	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	25,5*	(14,7 – 36,8)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			0,4%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 23 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Nombre de dents scellées			p=n.p.
0 dents	0	3,9**	(1,3 – 6,6)
	1 à 4	24,1	(18,3 – 30,4)
	5 ou plus	72,0	(65,4 – 78,4)
1 à 3 dents	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	33,1*	(20,3 – 44,8)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
4 dents et plus	0	16,8**	(9,2 – 25,9)
	1 à 4	36,5	(27,0 – 45,2)
	5 ou plus	47,6	(37,1 – 56,7)
Non-réponse partielle ¹			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	6,6*†	(4,3 – 9,2)	13,2
	1 à 4	30,1	(24,8 – 35,3)	30,8
	5 ou plus	63,3	(57,8 – 68,9)	56,0
Variable sociodémographique				
Sexe				p=0,4682
Masculin	0	5,1**	(2,3 – 8,3)	
	1 à 4	31,6	(25,4 – 37,9)	
	5 ou plus	63,3	(57,1 – 69,5)	
Féminin	0	8,0**	(3,9 – 12,7)	
	1 à 4	28,7	(21,1 – 36,6)	
	5 ou plus	63,3	(54,8 – 71,4)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p=n.p.
Au moins le français	0	6,8**	(3,0 – 11,3)	
	1 à 4	31,9	(24,2 – 39,4)	
	5 ou plus	61,3	(53,3 – 69,8)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	9,5**	(4,4 – 14,8)	
	1 à 4	31,5	(22,2 – 41,2)	
	5 ou plus	59,0	(48,6 – 68,7)	
Ni le français, ni l'anglais	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	24,2*	(14,6 – 34,6)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle ¹				1,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison			p=n.p.
1 enfant	0	6,0**	(0,5 – 13,5)
	1 à 4	30,8*	(20,3 – 40,7)
	5 ou plus	63,2	(52,2 – 74,1)
2 enfants	0	6,0*	(3,0 – 9,2)
	1 à 4	31,6	(24,7 – 38,4)
	5 ou plus	62,4	(55,7 – 69,2)
3 enfants	0	10,4**	(3,4 – 17,8)
	1 à 4	26,1*	(15,6 – 37,6)
	5 ou plus	63,5	(51,4 – 75,6)
4 enfants ou plus	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	33,9*	(17,0 – 50,8)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle¹			2,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	16,9*	(4,2 – 32,2)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	34,9*	(23,4 – 47,3)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Diplôme d'études postsecondaires	0	8,2*	(5,2 – 11,5)	
	1 à 4	31,7	(25,7 – 37,8)	
	5 ou plus	60,1	(54,0 – 66,1)	
Non-réponse partielle ¹				5,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Statut d'immigration des parents				p=n.p.
Deux parents non-immigrants	0	9,9**	(4,9 – 15,8)	
	1 à 4	36,9	(28,2 – 46,1)	
	5 ou plus	53,2	(43,6 – 63,0)	
Deux parents immigrants récents	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	24,6**	(9,3 - 43,7)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Autres combinaisons	0	5,5**	(2,5 - 8,7)	
	1 à 4	27,2	(20,4 - 34,4)	
	5 ou plus	67,2	(60,3 - 74,2)	
Non-réponse partielle ¹				6,7%
Indice régional de défavorisation sociale				p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	0	7,8**	(2,9 – 13,5)	
	1 à 4	31,4	(22,5 – 40,8)	
	5 ou plus	60,9	(52,1 - 69,6)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	6,3**	(2,9 – 10,2)	
	1 à 4	31,5	(22,2 – 40,5)	
	5 ou plus	62,3	(53,5 – 70,9)	
Quartile 4 (défavorisé)	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	23,5**	(9,1 – 38,0)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle ¹				7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique			
Indice régional de défavorisation matérielle			p=0,0185
Quartile 1 (favorisé)	0	10,7**	(5,3 – 16,6)
	1 à 4	38,7	(28,6 – 49,2)
	5 ou plus	50,6	(39,4 – 61,9)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	7,1**	(2,7 – 12,0)
	1 à 4	29,3	(21,2 – 37,6)
	5 ou plus	63,6	(55,3 – 71,4)
Quartile 4 (défavorisé)	0	3,1**	(0,3 – 6,6)
	1 à 4	25,2	(17,3 – 33,0)
	5 ou plus	71,7	(63,6 – 79,9)
Non-réponse partielle ¹			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p=0,0394
Quartile 1 (favorisé)	0	10,3**	(5,2 – 15,9)
	1 à 4	36,0	(26,4 – 46,2)
	5 ou plus	53,7	(44,2 – 63,4)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	5,0**	(1,2 – 9,4)
	1 à 4	30,5	(22,2 – 39,4)
	5 ou plus	64,5	(55,2 – 73,4)
Quartile 4 (défavorisé)	0	4,2**	(0,8 – 8,6)
	1 à 4	22,9*	(14,8 – 31,3)
	5 ou plus	72,9	(63,4 – 81,7)
Non-réponse partielle ¹			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p=0,0227
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	11,5*	(5,8 – 17,4)
	1 à 4	36,7	(29,0 – 45,1)
	5 ou plus	51,7	(42,6 – 61,4)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	6,0**	(1,4 – 11,1)
	1 à 4	24,0*	(14,1 – 34,8)
	5 ou plus	70,0	(59,2 – 80,3)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	3,3**	(1,0 – 6,2)
	1 à 4	29,9	(20,4 – 39,0)
	5 ou plus	66,8	(57,6 – 76,0)
Prestations de l'aide sociale			p=n.p.
Aucun parent	0	7,5*	(4,7 – 10,5)
	1 à 4	32,5	(26,6 – 38,1)
	5 ou plus	60,1	(54,1 – 66,2)
Au moins un parent	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	22,5**	(9,9 - 36,6)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			4,5%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Assurance dentaire privée			p=0,0027
Oui	0	10,2*	(6,1 – 14,7)
	1 à 4	36,4	(28,0 – 44,5)
	5 ou plus	53,4	(44,9 – 62,1)
Non	0	3,6**	(1,1 – 6,4)
	1 à 4	26,1	(19,6 – 33,3)
	5 ou plus	70,4	(62,8 – 77,5)
Non-réponse partielle ¹			6,7%
Revenu le plus élevé des parents			p<0,0001
Moins de 40 000 \$	0	2,6**	(0,5 - 5,1)
	1 à 4	18,4*	(12,5 - 24,8)
	5 ou plus	79,1	(72,1 - 85,4)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	10,0**	(4,5 - 16,3)
	1 à 4	34,6	(24,9 - 43,9)
	5 ou plus	55,4	(45,8 - 65,5)
75 000 \$ et plus	0	10,7**	(3,8 – 18,7)
	1 à 4	45,4*	(31,2 – 59,8)
	5 ou plus	43,9*	(29,8 – 58,1)
Non-réponse partielle ¹			13,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire			
Nombre de dents scellées			p=n.p.
0 dents	0	3,9**	(1,3 – 6,6)
	1 à 4	24,5	(18,6 – 31,0)
	5 ou plus	71,6	(64,8 – 78,1)
1 à 3 dents	0	n.p.	n.p.
	1 à 4	33,9*	(21,2 – 45,8)
	5 ou plus	n.p.	n.p.
4 dents et plus	0	16,8**	(9,2 – 25,9)
	1 à 4	38,7	(29,0 – 48,1)
	5 ou plus	44,5	(34,8 – 54,9)

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 24 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Niveau d'accumulation de débris				p=n.p.
Faible	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	35,4*	(21,7 – 50,2)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Moyen	0	7,2*	(4,3 – 10,0)	
	1 à 4	30,3	(23,6 – 37,0)	
	5 ou plus	62,5	(55,4 – 69,8)	
Élevé	0	n.p.	n.p.	
	1 à 4	25,5*	(14,7 – 36,8)	
	5 ou plus	n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle¹				0,4%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	62,6	(57,3 – 67,7)	64,3
	1 à 4	26,5	(21,9 – 31,4)	26,5
	5 ou plus	10,9*	(7,7 – 14,7)	10,9*
Variable sociodémographique				
Sexe				p=0,1822
Masculin	0	65,2	(57,4 – 72,6)	
	1 à 4	27,0	(29,9 – 33,8)	
	5 ou plus	7,8**	(3,6 – 13,2)	
Féminin	0	60,0	(53,4 – 66,8)	
	1 à 4	26,0	(19,8 – 32,4)	
	5 ou plus	14,0*	(9,0 – 20,0)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,0605
Au moins le français	0	64,3	(56,5 – 71,8)
	1 à 4	24,9	(18,5 – 31,3)
	5 ou plus	10,8*	(6,3 – 15,8)
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	69,3	(60,7 – 77,6)
	1 à 4	24,4*	(16,0 – 33,5)
	5 ou plus	6,3**	(2,2 – 10,7)
Ni le français, ni l'anglais	0	49,8	(39,0 – 60,9)
	1 à 4	34,0*	(22,7 – 44,9)
	5 ou plus	16,2**	(8,0 – 25,7)
Non-réponse partielle ¹			1,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison		p=0,6279	
1 enfant	0	66,1	(53,5 – 77,0)
	1 à 4	22,3*	(13,0 – 33,2)
	5 ou plus	11,6**	(4,1 – 20,1)
2 enfants	0	63,3	(55,0 – 71,4)
	1 à 4	28,4	(20,8 – 35,9)
	5 ou plus	8,3*	(4,6 – 12,8)
3 enfants	0	60,5	(49,1 – 70,9)
	1 à 4	29,0*	(19,9 – 38,9)
	5 ou plus	10,4**	(3,8 – 18,1)
4 enfants ou plus	0	61,4	(44,8 – 77,6)
	1 à 4	20,4**	(7,8 – 34,1)
	5 ou plus	18,2**	(3,2 – 36,2)
Non-réponse partielle ¹		2,7%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p=0,8488
Pas de diplôme d'études secondaires	0	56,9	(38,7 – 74,2)
	1 à 4	33,9*	(18,8 – 48,2)
	5 ou plus	9,2**	(1,1 – 18,7)
Diplôme d'études secondaires	0	63,6	(49,6 – 78,2)
	1 à 4	27,3**	(11,0 – 44,3)
	5 ou plus	9,1**	(1,2 – 18,0)
Diplôme d'études postsecondaires	0	64,3	(58,4 – 69,8)
	1 à 4	25,5	(20,8 – 30,5)
	5 ou plus	10,2*	(6,5 – 14,6)
Non-réponse partielle ¹			5,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents			p=0,4875
Deux parents non-immigrants	0	66,5	(58,0 – 75,1)
	1 à 4	23,8	(16,7 – 31,4)
	5 ou plus	9,8*	(4,9 – 15,1)
Deux parents immigrants récents	0	55,8	(39,4 - 71,9)
	1 à 4	25,8**	(9,4 - 45,7)
	5 ou plus	18,4**	(2,7 - 34,8)
Autres combinaisons	0	59,4	(52,2 - 66,5)
	1 à 4	29,7	(22,9 - 36,4)
	5 ou plus	10,9*	(6,8 - 15,7)
Non-réponse partielle ¹			6,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale			p=0,7907
Quartile 1 (favorisé)	0	66,7	(60,3 – 73,0)
	1 à 4	24,8	(17,9 – 31,8)
	5 ou plus	8,4**	(3,3 – 14,6)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	62,4	(54,3 – 70,4)
	1 à 4	27,3	(20,5 – 34,3)
	5 ou plus	10,3*	(6,2 – 15,1)
Quartile 4 (défavorisé)	0	58,0	(42,1 – 71,7)
	1 à 4	29,5*	(18,5 – 41,7)
	5 ou plus	12,5**	(3,6 – 23,6)
Non-réponse partielle ¹			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique			
Indice régional de défavorisation matérielle			p=0,0030
Quartile 1 (favorisé)	0	77,9	(67,9 – 86,6)
	1 à 4	16,6*	(9,0 – 24,7)
	5 ou plus	5,5**	(1,3 – 11,2)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	62,2	(54,0 – 69,6)
	1 à 4	29,8	(21,3 – 39,0)
	5 ou plus	8,0*	(3,9 – 12,3)
Quartile 4 (défavorisé)	0	53,8	(44,7 – 63,3)
	1 à 4	30,2	(22,3 – 37,9)
	5 ou plus	16,0*	(9,1 – 23,4)
Non-réponse partielle ¹			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p=0,0777
Quartile 1 (favorisé)	0	70,0	(63,2 – 76,5)	
	1 à 4	23,1	(16,9 – 29,4)	
	5 ou plus	6,9*	(2,6 – 12,3)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	64,7	(55,3 – 73,2)	
	1 à 4	26,0	(18,2 – 34,2)	
	5 ou plus	9,3*	(3,7 – 16,0)	
Quartile 4 (défavorisé)	0	53,4	(44,1 – 63,0)	
	1 à 4	32,2	(24,5 – 40,2)	
	5 ou plus	14,4*	(7,3 – 21,7)	
Non-réponse partielle ¹				7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])		p=0,1246	
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	70,7	(62,1 – 78,4)
	1 à 4	17,5*	(11,7 – 23,4)
	5 ou plus	11,9**	(4,8 – 20,2)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	56,9	(44,7 – 68,0)
	1 à 4	34,0*	(22,5 – 45,8)
	5 ou plus	9,1**	(3,4 – 15,8)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	61,0	(53,9 – 67,9)
	1 à 4	27,4	(21,2 – 33,7)
	5 ou plus	11,6*	(6,9 – 16,9)
Prestations de l'aide sociale		p=0,0043	
Aucun parent	0	66,2	(60,5 – 71,6)
	1 à 4	26,1	(21,1 – 31,1)
	5 ou plus	7,7*	(4,7 – 11,0)
Au moins un parent	0	43,5*	(28,6 - 59,1)
	1 à 4	23,7**	(10,1 - 38,1)
	5 ou plus	32,8*	(16,0 - 50,6)
Non-réponse partielle ¹		4,5%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Assurance dentaire privée				p=0,1933
Oui	0	67,1	(59,6 – 74,5)	
	1 à 4	25,4	(18,4 – 32,8)	
	5 ou plus	7,5**	(3,8 – 11,8)	
Non	0	61,1	(54,6 – 67,3)	
	1 à 4	26,3	(19,7 – 32,9)	
	5 ou plus	12,6*	(8,3 – 17,6)	
Non-réponse partielle ¹				6,7%
Revenu le plus élevé des parents				p=n.p.
Moins de 40 000 \$	0	55,4	(47,8 - 62,9)	
	1 à 4	29,2	(21,3 - 37,6)	
	5 ou plus	15,4*	(9,7 - 22,3)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	65,1	(53,0 - 76,4)	
	1 à 4	27,3*	(17,5 - 38,2)	
	5 ou plus	7,6**	(2,3 - 13,5)	
75 000 \$ et plus	0	57,3	(43,1 - 71,6)	
	1 à 4	26,0**	(12,0 – 41,4)	
	5 ou plus	16,6**	(6,0 – 28,9)	
Non-réponse partielle ¹				13,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire			
Nombre de dents scellées			p=0,0005
0 dents	0	58,5	(50,6 – 65,8)
	1 à 4	27,1	(20,3 – 34,2)
	5 ou plus	14,4*	(9,4 – 20,3)
1 à 3 dents	0	54,0	(41,1 – 66,1)
	1 à 4	38,7	(27,9 – 50,7)
	5 ou plus	7,3**	(1,7 – 14,6)
4 dents et plus	0	78,4	(70,3 – 86,2)
	1 à 4	15,1*	(8,0 – 22,5)
	5 ou plus	6,5**	(1,8 – 12,5)
Non-réponse partielle ¹			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 25 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	
Niveau d'accumulation de débris				p=0,2575
Faible	0	74,2	(60,5 – 87,9)	
	1 à 4	14,3**	(3,8 – 25,2)	
	5 ou plus	11,5**	2,2 – 22,2)	
Moyen	0	62,8	(57,4 – 67,8)	
	1 à 4	27,0	(22,2 – 32,2)	
	5 ou plus	10,2*	(6,6 – 14,3)	
Élevé	0	53,7	(36,8 – 69,1)	
	1 à 4	32,4*	(18,6 – 48,6)	
	5 ou plus	13,9**	(4,3 – 24,6)	
Non-réponse partielle ¹				0,4%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 26 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6	0	6,6*	(4,3 – 9,2)	13,2	p=0,0018
	1 à 4	28,7	(23,9 – 33,5)	29,8	
	5 ou plus	64,8	(59,6 – 69,9)	57,1	
Stade 1 à 3	0	6,6*	(4,3 – 9,2)	13,2	p=0,0022
	1 à 4	29,4	(24,3 – 34,6)	30,3	
	5 ou plus	64,0	(58,4 – 69,4)	56,5	
Stade 4 à 6	0	62,6	(57,3 – 67,7)	64,3	p=0,6974
	1 à 4	26,4	(21,7 – 31,2)	24,2	
	5 ou plus	11,0*	(7,8 – 14,9)	11,5	

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Dans le cas d'un indicateur en répartition à plus de 2 modalités, seuls les tests globaux d'indépendance du khi-deux sont effectués.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Dentitions temporaire et permanente combinées

Tableau 27 Nombre moyen de dents cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₆aod + C₁₋₆AOD						
Toutes les composantes	6,60†	(6,21 – 7,03)	5,52	6,28	(5,86 – 6,71)	5,92
Composante c+ C	4,82†	(4,42 – 5,23)	4,06	5,71	(5,26 – 6,19)	5,14
Composante a+A	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,06**	0,00**	(0,00 – 0,01)	0,02**
Composante o+O	1,69†	(1,47 – 1,92)	1,39	0,57†	(0,44 – 0,71)	0,76
c₁₋₃aod + C₁₋₃AOD						
Toutes les composantes	6,14†	(5,78 – 6,55)	5,06	6,02	(5,59 – 6,45)	5,68
Composante c+ C	4,36†	(3,99 – 4,73)	3,61	5,45	(4,99 – 5,91)	4,91
Composante a+A	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,06**	0,00**	(0,00 – 0,01)	0,02**
Composante o+O	1,69†	(1,47 – 1,92)	1,39	0,57†	(0,44 – 0,71)	0,76
c₄₋₆aod + C₄₋₆AOD						
Toutes les composantes	3,03†	(2,75 – 3,30)	2,56	1,52	(1,30 – 1,76)	1,58
Composante c+ C	0,46	(0,37 – 0,56)	0,44	0,27	(0,20 – 0,34)	0,24
Composante a+A	0,09*	(0,06 – 0,13)	0,06**	0,00**	(0,0 – 0,01)	0,02**
Composante o+O	2,48†	(2,21 – 2,74)	2,07	1,25	(1,03 – 1,48)	1,32

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 28 Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 et 140 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₆aof₈₈ + C₁₋₆AOF₁₂₈						
Toutes les composantes	13,07 [†]	(12,05 – 14,25)	10,63	10,70	(9,80 – 11,65)	10,09
Composante c+ C	7,23	(6,49 – 8,00)	6,50	8,74	(7,95 – 9,58)	7,83
Composante a+A	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,02**	(0,00 – 0,06)	0,08**
Composante o+O	5,39 [†]	(4,68 – 6,15)	3,81	1,94	(1,57 – 2,35)	2,18
c₁₋₆aof₈₈ + C₁₋₆AOF₁₄₀						
Toutes les composantes	13,22 [†]	(12,19 – 14,42)	10,74	11,01	(10,10 – 12,01)	10,35
Composante c+ C	7,36	(6,60 – 8,15)	6,60	8,96	(8,15 – 9,83)	8,00
Composante a+A	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,02**	(0,00 – 0,06)	0,10**
Composante o+O	5,42 [†]	(4,70 – 6,19)	3,83	2,03	(1,65 – 2,46)	2,26
c₁₋₃aof₈₈ + C₁₋₃AOF₁₂₈						
Toutes les composantes	12,27 [†]	(11,25 – 13,42)	9,78	10,28	(9,42 – 11,23)	9,74
Composante c+ C	6,43	(5,74 – 7,13)	5,65	8,33	(7,56 – 9,14)	7,47
Composante a+A	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,02**	(0,00 – 0,06)	0,08**
Composante o+O	5,39 [†]	(4,68 – 6,15)	3,81	1,94	(1,57 – 2,35)	2,18

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 28 Nombre moyen de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 et 140 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₃aof₈₈ + C₁₋₃AOF₁₄₀						
Toutes les composantes	12,42†	(11,39 – 13,56)	9,89	10,60	(9,71 – 11,58)	9,99
Composante C	6,55	(5,85 – 7,27)	5,75	8,55	(7,76 – 9,39)	7,64
Composante A	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,02**	(0,00 – 0,06)	0,10**
Composante O	5,42†	(4,70 – 6,19)	3,83	2,03	(1,65 – 2,46)	2,26
c₄₋₆aof₈₈ + C₄₋₆AOF₁₂₈						
Toutes les composantes	7,07†	(6,26 – 7,93)	5,54	2,74	2,31 – 3,21)	2,91
Composante C	0,80	(0,62 – 1,00)	0,80	0,41	(0,29 – 0,53)	0,38
Composante A	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,02**	(0,00 – 0,06)	0,08**
Composante O	5,82†	(5,10 – 6,62)	4,50	2,31	(1,91 – 2,76)	2,45
c₄₋₆aof₈₈ + C₄₋₆AOF₁₄₀						
Toutes les composantes	7,08†	(6,27 – 7,96)	5,55	2,78	2,34 – 3,26)	2,94
Composante C	0,81	(0,63 – 1,01)	0,80	0,41	(0,30 – 0,54)	0,39
Composante A	0,44*	(0,27 – 0,64)	0,31**	0,02**	(0,00 – 0,06)	0,10**
Composante O	5,83†	(5,11 – 6,63)	4,50	2,34	(1,93 – 2,81)	2,47

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 29 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₁₋₆aof₈₈ + C₁₋₆AOF₁₂₈							
Toutes les composantes	0	7,2 ^{†*}	(4,3 – 10,1)	12,8	5,3 [*]	(3,1 – 7,8)	8,7
	1 ou plus	92,8 [†]	(89,9 – 95,7)	87,2	94,7	(92,2 – 96,9)	91,3
Composante c + C	0	10,8 ^{†*}	(7,1 – 14,9)	17,0	6,7 ^{†*}	(4,2 – 9,3)	11,9
	1 ou plus	89,2 [†]	(85,1 – 92,9)	83,0	93,3 [†]	(90,7 – 95,8)	88,1
Composante a + A	0	94,3	(92,0 – 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 – 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	1,1 ^{**}
Composante o + O	0	50,2	(45,7 – 54,7)	51,8	60,1	(54,2 – 65,6)	57,7
	1 ou plus	49,8	(45,3 – 54,3)	48,2	39,9	(34,4 – 45,8)	42,3
c₁₋₃aof₈₈ + C₁₋₃AOF₁₂₈							
Toutes les composantes	0	7,2 ^{†*}	(4,3 – 10,1)	13,1	5,3 ^{†*}	(3,1 – 7,8)	9,0
	1 ou plus	92,8 [†]	(89,9 – 95,7)	86,9	94,7 [†]	(92,2 – 96,9)	91,0
Composante c + C	0	10,9 ^{†*}	(7,2 – 15,0)	17,8	7,0 ^{†*}	(4,5 – 9,6)	12,5
	1 ou plus	89,1 [†]	(85,0 – 92,8)	82,2	93,0 [†]	(90,4 – 95,5)	87,5
Composante a + A	0	94,3	(92,0 – 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 – 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	1,1 ^{**}
Composante o + O	0	50,2	(45,7 – 54,7)	51,8	60,1	(54,2 – 65,6)	57,7
	1 ou plus	49,8	(45,3 – 54,3)	48,2	39,9	(34,4 – 45,8)	42,3

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 29 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₄₋₆aof₈₈ + C₄₋₆AOF₁₂₈							
Toutes les composantes	0	41,0	(36,8 – 45,1)	45,3	51,2	(45,7 – 56,7)	50,2
	1 ou plus	59,0	(54,9 – 63,2)	54,7	48,8	(43,3 – 54,3)	49,8
Composante c + C	0	77,1	(73,0 – 81,2)	80,2	84,4	(80,3 – 88,1)	86,1
	1 ou plus	22,9	(18,8 – 27,0)	19,8	15,6	(11,9 – 19,7)	13,9
Composante a + A	0	94,3	(92,0 – 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 – 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o + O	0	48,2	(43,8 – 52,6)	51,1	58,0	(52,0 – 63,7)	54,9
	1 ou plus	51,8	(47,4 – 56,2)	48,9	42	(36,3 – 48,0)	45,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 30 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentitions combinées (144 faces), ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	41,7	(35,4 – 48,5)	39,7	30,1	(24,5 – 36,4)	32,1
	1 ou plus	58,3	(51,5 – 64,6)	60,3	69,9	(63,6 – 75,5)	67,9
Stade 2	0	25,0†	(19,5 – 30,6)	45,4	18,5†	(13,4 – 23,8)	31,8
	1 ou plus	75,0†	(69,4 – 80,5)	54,6	81,5†	(76,2 – 86,6)	68,2
Stade 3	0	76,8†	(72,0 – 81,2)	82,1	66,3†	(60,2 – 72,0)	84,1
	1 ou plus	23,2†	(18,8 – 28,0)	17,9	33,7†	(28,0 – 39,8)	15,9
Stade 4	0	91,9†	(89,0 – 94,7)	85,8	94,3	(91,8 – 96,4)	91,9
	1 ou plus	8,1†*	(5,3 – 11,0)	14,2	5,7*	(3,6 – 8,2)	8,1
Stade 5	0	80,2†	(76,0 – 84,1)	87,8	87,7†	(84,0 – 91,1)	92,0
	1 ou plus	19,8†	(15,9 – 24,0)	12,2	12,3†	(8,9 – 16,0)	8,0
Stade 6	0	95,1	(93,0 – 97,1)	93,5	97,2	(95,6 – 98,8)	96,8
	1 ou plus	4,9*	(2,9 – 7,0)	6,5	2,8**	(1,2 – 4,4)	3,2

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	7,2 [†]	(4,3 – 10,1)	12,8	5,3*	(3,1 – 7,8)	8,7
	1 à 4	21,7	(17,4 – 26,0)	27,4	22,3	(17,8 – 27,0)	24,9
	5 à 9	19,5	(15,2 – 23,9)	20,3	26,4	(21,9 – 31,1)	28,1
	10 ou plus	51,6 [†]	(46,7 – 56,9)	39,5	46,0	(40,6 – 51,3)	38,3
Variable sociodémographique							
Sexe			p=0,1665			p=0,3643	
Masculin	0	4,9**	(2,1 – 8,2)		3,5**	(1,1 – 6,2)	
	1 à 4	22,5	(16,6 – 28,6)		23,7	(18,1 – 29,8)	
	5 à 9	22,1	(15,8 – 28,6)		25,1	(18,8 – 31,4)	
	10 ou plus	50,5	(43,4 – 58,3)		47,6	(40,8 – 54,4)	
Féminin	0	9,6*	(5,0 – 14,2)		7,0**	(3,2 – 11,5)	
	1 à 4	20,9	(15,8 – 26,4)		20,9	(14,7 – 27,3)	
	5 à 9	16,8*	(11,5 – 22,7)		27,7	(21,3 – 34,2)	
	10 ou plus	52,7	(46,9 – 59,0)		44,3	(36,7 – 52,2)	

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison		p=0,0170		p=n.p.	
Au moins le français	0	6,0**	(2,5 – 10,2)	5,2**	(1,7 – 9,4)
	1 à 4	24,7	(18,5 – 31,3)	24,6	(18,2 – 30,9)
	5 à 9	22,1	(16,5 – 28,3)	24,8	(18,4 – 31,5)
	10 ou plus	47,2	(39,4 – 55,3)	45,4	(39,3 – 52,0)
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	9,5**	(2,8 – 18,4)	8,5**	(3,8 – 13,7)
	1 à 4	24,9*	(16,3 – 33,4)	20,6*	(13,0 – 29,2)
	5 à 9	21,2*	(12,3 – 31,1)	31,3	(22,5 – 39,7)
	10 ou plus	44,4	(35,2 – 54,7)	39,6	(28,2 – 50,8)
Ni le français, ni l'anglais	0	8,8**	(1,6 – 17,1)	n.p.	n.p.
	1 à 4	11,8**	(4,3 – 20,1)	n.p.	n.p.
	5 à 9	8,9**	(2,4 – 17,4)	24,3*	(14,7 – 34,2)
	10 ou plus	70,6	(59,7 – 81,5)	55,5	(43,4 – 67,7)
Non-réponse partielle¹		1,9%		1,3%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison		p=n.p.		p=n.p.	
1 enfant	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	19,4*	(9,8 – 29,7)	35,1*	(24,1 – 46,8)
	10 ou plus	59,6	(49,4 – 70,9)	36,8*	(25,4 – 49,6)
2 enfants	0	10,6*	(5,8 – 16,0)	4,4**	(1,8 – 7,4)
	1 à 4	23,2	(16,7 – 30,0)	22,0	(15,8 – 28,2)
	5 à 9	20,6*	(14,4 – 27,4)	29,0	(22,2 – 35,9)
	10 ou plus	45,6	(37,1 – 55,0)	44,6	(37,5 – 51,6)
3 enfants	0	7,1**	(2,0 – 12,4)	9,2**	(2,3 – 17,2)
	1 à 4	23,0*	(15,2 – 30,2)	21,8*	(12,0 – 32,4)
	5 à 9	12,4**	(5,6 – 20,0)	17,3**	(7,4 – 28,2)
	10 ou plus	57,5	(49,0 – 66,9)	51,7	(40,1 – 64,8)
4 enfants ou plus	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	21,3**	(6,5 – 37,6)	17,3**	(5,9 – 31,5)
	10 ou plus	58,0	(40,5 – 75,1)	53,9*	(36,7 – 71,8)
Non-réponse partielle ¹		3,1%		2,7%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	p=n.p.	p=n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	p=n.p.	p=n.p.
	5 à 9	n.p.	n.p.	24,0**	(11,4 – 37,9)
	10 ou plus	n.p.	n.p.	61,2	(42,1 – 78,3)
Diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	13,6**	(5,4 – 22,9)	27,4*	(18,0 – 38,1)
	10 ou plus	63,1	(49,5 – 76,5)	43,5	(30,9 – 56,3)
Diplôme d'études postsecondaires	0	8,6*	(4,9 – 12,3)	6,6*	(3,7 – 10,0)
	1 à 4	22,3	(17,1 – 27,4)	23,0	(18,1 – 28,1)
	5 à 9	20,05	(15,5 – 25,6)	27,7	(22,3 – 33,3)
	10 ou plus	48,6	(43,0 – 54,5)	42,7	(36,9 – 48,5)
Non-réponse partielle¹				4,5%	5,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	0	11,5*	(5,9 - 18,0)	8,8**	(3,9 - 14,4)
	1 à 4	26,3	(19,1 - 33,7)	24,6*	(16,6 - 32,8)
	5 à 9	23,2*	(15,9 - 31,1)	33,2	(25,9 - 41,2)
	10 ou plus	39,0	(31,3 - 47,5)	33,4	(24,4 - 42,7)
Deux parents immigrants récents	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	24,8**	(9,3 - 44,0)	19,5**	(5,2 - 34,8)
	10 ou plus	52,1*	(34,2 - 70,2)	64,2	(44,4 - 83,6)
Autres combinaisons	0	5,6**	(1,9 - 10,1)	3,7**	(1,1 - 6,7)
	1 à 4	20,4	(15,3 - 25,6)	23,0	(16,3 - 30,1)
	5 à 9	13,7*	(8,6 - 19,0)	23,1	(17,2 - 29,0)
	10 ou plus	60,3	(53,3 - 67,5)	50,2	(42,4 - 58,0)
Non-réponse partielle ¹				5,4%	6,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	0	10,2**	(4,0 – 16,9)	6,4**	(2,0 – 11,8)
	1 à 4	25,0*	(17,1 – 32,9)	20,7*	(13,2 – 28,6)
	5 à 9	20,7*	(14,1 – 27,6)	32,0	(24,0 – 41,4)
	10 ou plus	44,1	(35,7 – 52,8)	40,8	(32,0 – 49,1)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	7,8**	(3,3 – 13,1)	5,1**	(2,0 – 8,7)
	1 à 4	20,3*	(13,6 – 27,0)	25,4*	(17,9 – 33,4)
	5 à 9	17,4*	(11,0 – 24,1)	20,8	(15,5 – 26,3)
	10 ou plus	54,5	(46,9 – 62,5)	48,7	(40,8 – 57,0)
Quartile 4 (défavorisé)	0	p=n.p.	p=n.p.	p=n.p.	p=n.p.
	1 à 4	p=n.p.	p=n.p.	p=n.p.	p=n.p.
	5 à 9	19,0**	(9,3 – 31,1)	32,0*	(18,6 – 45,5)
	10 ou plus	63,6	(51,1 – 75,0)	50,1	(39,1 – 61,4)
Non-réponse partielle ¹			9,9%		7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle					
Quartile 1 (favorisé)	0	14,1*	(6,9 – 21,9)	8,3**	(3,1 – 14,7)
	1 à 4	26,7*	(16,2 – 37,9)	30,9*	(21,2 – 41,4)
	5 à 9	23,6*	(13,0 – 34,6)	27,8*	(18,6 – 38,9)
	10 ou plus	35,6	(25,4 – 46,7)	32,9*	(21,9 – 43,6)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	5,9*	(1,7 – 10,5)	5,8**	(1,8 – 10,1)
	1 à 4	18,7*	(12,1 – 26,4)	18,3*	(11,7 – 25,9)
	5 à 9	17,0*	(10,9 – 23,9)	30,2	(23,8 – 36,4)
	10 ou plus	58,4	(49,3 – 67,0)	45,7	(38,3 – 52,9)
Quartile 4 (défavorisé)	0	6,0**	(1,3 – 11,4)	n.p.	n.p.
	1 à 4	18,7*	(10,9 – 26,2)	n.p.	n.p.
	5 à 9	17,8*	(11,1 – 25,9)	20,5*	(13,6 – 27,9)
	10 ou plus	57,6	(48,4 – 66,6)	56,4	(46,3 – 66,4)
Non-réponse partielle ¹			9,9%		7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
				p=0,0236	p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	0	12,5**	(6,2 – 19,3)	8,2**	(3,4 – 13,7)
	1 à 4	25,4*	(17,8 – 33,1)	24,2*	(15,7 – 33,1)
	5 à 9	20,0*	(13,1 – 26,9)	30,8	(23,6 – 38,1)
	10 ou plus	42,2	(33,8 – 51,2)	36,8	(28,3 – 45,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	7,1**	(2,3 – 12,7)	4,3**	(0,8 – 8,5)
	1 à 4	19,8*	(12,1 – 28,9)	24,7*	(16,6 – 34,4)
	5 à 9	18,8*	(11,5 – 27,1)	23,3*	(16,0 – 30,9)
	10 ou plus	54,3	(44,4 – 64,4)	47,6	(38,3 – 56,7)
Quartile 4 (défavorisé)	0	3,3**	(0,6 – 6,6)	n.p.	n.p.
	1 à 4	16,0*	(8,9 – 23,0)	n.p.	n.p.
	5 à 9	17,5*	(10,7 – 25,1)	25,0*	(17,2 – 33,1)
	10 ou plus	63,2	(55,1 – 71,2)	55,7	(46,0 – 64,4)
Non-réponse partielle ¹				9,9%	7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
				p=0,2344	p=0,0110
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	10,5**	(4,5 – 16,3)	9,3**	(4,0 – 14,7)
	1 à 4	22,7*	(15,0 – 30,6)	26,8	(19,1 – 35,4)
	5 à 9	19,8*	(11,9 – 29,2)	32,9	(23,2 – 42,8)
	10 ou plus	47,1	(36,8 – 57,8)	31,0*	(20,5 – 42,3)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	10,0**	(2,4 – 18,6)	5,2**	(0,8 – 10,4)
	1 à 4	22,9*	(12,8 – 33,9)	17,6*	(10,0 – 24,4)
	5 à 9	22,4*	(11,9 – 34,2)	26,9*	(17,7 – 36,4)
	10 ou plus	44,7	(33,7 – 56,4)	50,4	(40,2 – 59,8)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	3,2**	(1,1 – 5,4)	2,4**	(0,4 – 4,8)
	1 à 4	20,4	(14,8 – 26,0)	22,7*	(14,4 – 31,6)
	5 à 9	17,4	(12,4 – 22,4)	21,2	(15,6 – 26,9)
	10 ou plus	59,0	(52,7 – 65,9)	53,7	(45,7 – 62,1)

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	0	8,5*	(5,0 - 11,9)	6,3*	(3,7 - 9,1)
	1 à 4	23,4	(18,4 - 28,3)	24,3	(19,1 - 29,4)
	5 à 9	19,8	(15,5 - 24,6)	28,0	(22,8 - 33,3)
	10 ou plus	48,3	(42,6 - 54,4)	41,4	(35,8 - 47,3)
Au moins un parent	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	15,1**	(0,8 - 31,8)	19,7**	(6,6 - 36,6)
	10 ou plus	71,2	(53,8 - 89,3)	64,1	(46,3 - 79,2)
Non-réponse partielle ¹				5,2%	4,5%
Assurance dentaire privée					
Oui	0	11,1*	(6,1 - 16,3)	8,9*	(5,1 - 13,0)
	1 à 4	19,4	(14,1 - 24,7)	25,0	(18,0 - 32,4)
	5 à 9	23,1	(17,3 - 29,2)	29,1	(21,5 - 37,3)
	10 ou plus	46,5	(39,6 - 53,7)	37,1	(28,6 - 45,5)
Non	0	4,1**	(1,4 - 7,4)	2,2**	(0,2 - 4,6)
	1 à 4	25,1	(18,6 - 31,4)	21,5*	(15,1 - 28,4)
	5 à 9	15,1*	(9,1 - 22,0)	25,1	(19,1 - 31,7)
	10 ou plus	55,7	(48,1 - 63,6)	51,3	(43,7 - 58,8)
Non-réponse partielle ¹				7,4%	6,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	0	4,5**	(1,5 - 8,0)	n.p.	n.p.
	1 à 4	18,6	(12,7 - 24,6)	n.p.	n.p.
	5 à 9	15,2*	(8,8 - 22,8)	21,0	(14,7 - 27,4)
	10 ou plus	61,7	(53,5 - 70,0)	61,0	(53,4 - 68,8)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	7,5**	(2,3 - 13,2)	7,0**	(1,9 - 13,0)
	1 à 4	22,2*	(14,5 - 30,1)	23,5*	(13,7 - 33,5)
	5 à 9	24,7*	(16,9 - 32,8)	31,5*	(20,5 - 44,2)
	10 ou plus	45,6	(36,7 - 55,1)	38,0	(27,9 - 47,6)
75 000 \$ et plus	0	14,3**	(5,3 - 24,7)	10,7**	(3,8 - 18,7)
	1 à 4	29,2*	(18,4 - 39,3)	31,8*	(19,2 - 44,3)
	5 à 9	18,9*	(10,9 - 27,6)	34,6*	(22,9 - 47,0)
	10 ou plus	37,6	(26,7 - 49,3)	22,9*	(13,3 - 33,9)
Non-réponse partielle¹					
			10,9%		13,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris				p=n.p.	
Faible	0	19,1**	(4,9 – 32,4)	n.p.	n.p.
	1 à 4	37,0**	(17,6 – 59,9)	n.p.	n.p.
	5 à 9	22,6**	(2,6 – 46,9)	36,8*	(20,1 – 52,9)
	10 ou plus	21,3**	(5,6 – 39,0)	33,6*	(18,5 – 49,1)
Moyen	0	7,3**	(3,8 – 11,0)	5,7*	(3,1 – 8,7)
	1 à 4	22,2	(17,1 – 27,7)	22,4	(16,4 – 28,5)
	5 à 9	21,5	(16,8 – 27,0)	27,3	(22,5 – 32,2)
	10 ou plus	48,9	(42,6 – 55,0)	44,5	(38,1 – 51,1)
Élevé	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	11,4*	(6,0 – 17,0)	15,3**	(5,9 – 25,5)
	10 ou plus	68,9	(60,3 – 78,4)	61,0	(47,5 – 74,4)
Non-réponse partielle ¹				0,2%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 31 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées					
					p=n.p.
0 dents	0	6,4*	(3,4 – 9,7)	3,4**	(1,0 – 6,0)
	1 à 4	22,9	(17,6 – 28,0)	19,4*	(13,6 – 25,4)
	5 à 9	20,2	(14,8 – 25,7)	21,7	(16,2 – 27,9)
	10 ou plus	50,5	(44,7 – 56,8)	55,5	(48,2 – 62,8)
1 à 3 dents	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	14,9**	(6,0 – 24,2)	33,9	(24,5 – 44,3)
	10 ou plus	64,8	(49,2 – 79,2)	42,9	(31,4 – 55,0)
4 dents et plus	0	13,2**	(3,1 – 24,8)	12,8**	(5,8 – 20,8)
	1 à 4	21,2*	(11,9 – 31,4)	28,7*	(19,1 – 38,7)
	5 à 9	20,0*	(10,2 – 31,3)	30,0	(21,3 – 38,1)
	10 ou plus	45,6	(33,6 – 57,0)	28,5*	(20,0 – 38,8)
Non-réponse partielle ¹					

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	7,2*†	(4,3 – 10,1)	13,1	5,3*	(3,1 – 7,8)	9,0
	1 à 4	23,4	(18,9 – 27,7)	28,5	23,3	(18,8 – 27,9)	25,6
	5 à 9	21,0	(16,9 – 25,6)	22,0	26,8	(22,3 – 31,4)	28,0
	10 ou plus	48,4†	(43,4 – 53,7)	36,4	44,7	(39,2 – 50,3)	37,4
Variable sociodémographique							
Sexe				p=0,1218			p=0,3898
Masculin	0	4,9**	(2,1 – 8,2)		3,5**	(1,1 – 6,2)	
	1 à 4	24,5	(18,8 – 30,5)		24,6	(19,0 – 30,7)	
	5 à 9	24,0	(17,7 – 30,9)		25,8	(19,7 – 32,1)	
	10 ou plus	46,6	(39,2 – 54,6)		46,1	(39,3 – 52,7)	
Féminin	0	9,6*	(5,0 – 14,2)		7,0**	(3,2 – 11,5)	
	1 à 4	22,2	(17,1 – 27,9)		21,9	(15,7 – 28,2)	
	5 à 9	17,9*	(12,7 – 23,9)		27,7	(21,3 – 34,3)	
	10 ou plus	50,3	(44,8 – 56,5)		43,3	(35,6 – 51,1)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison		p=0,0654		p=n.p.	
Au moins le français	0	6,0**	(2,5 – 10,2)	5,2**	(1,7 – 9,4)
	1 à 4	26,9	(20,7 – 33,2)	25,5	(19,1 – 31,7)
	5 à 9	21,9	(16,5 – 27,9)	25,4	(19,3 – 32,0)
	10 ou plus	45,1	(37,3 – 53,4)	43,9	(37,5 – 50,4)
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	9,5**	(2,8 – 18,4)	8,5**	(3,8 – 13,7)
	1 à 4	26,0*	(16,9 – 35,1)	21,7*	(13,7 – 30,6)
	5 à 9	21,6*	(12,3 – 31,4)	31,4	(23,0 – 39,8)
	10 ou plus	43,0	(33,7 – 53,4)	38,4	(26,9 – 49,5)
Ni le français, ni l'anglais	0	8,8**	(1,6 – 17,1)	n.p.	n.p.
	1 à 4	12,7**	(5,2 – 21,6)	n.p.	n.p.
	5 à 9	13,5**	(6,1 – 22,5)	24,4*	(14,6 – 34,3)
	10 ou plus	65,1	(53,9 – 76,3)	54,4	(42,4 – 66,5)
Non-réponse partielle ¹		1,9%		1,3%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	n.p.	n.p.	21,9**	(10,3 – 34,7)
	10 ou plus	n.p.	n.p.	61,2	(42,1 – 78,3)
Diplôme d'études secondaires	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	20,4*	(10,5 – 31,6)	25,2*	(15,8 – 34,5)
	10 ou plus	56,3	(42,8 – 69,6)	43,5	(30,9 – 56,3)
Diplôme d'études postsecondaires	0	8,6*	(4,9 – 12,3)	6,6*	(3,7 – 10,0)
	1 à 4	23,9	(18,7 – 28,9)	23,6	(18,8 – 28,5)
	5 à 9	20,6	(15,8 – 25,8)	28,9	(23,6 – 34,5)
	10 ou plus	46,8	(41,3 – 52,8)	40,8	(35,0 – 46,7)
Non-réponse partielle¹					
				4,5 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	0	11,5*	(5,9 – 18,0)	8,8**	(3,9 – 14,4)
	1 à 4	27,8	(20,8 – 35,0)	26,1	(18,6 – 34,1)
	5 à 9	23,6*	(16,5 – 31,5)	32,2	(24,5 – 40,1)
	10 ou plus	37,0	(29,5 – 45,4)	33,0	(24,0 – 42,1)
Deux parents immigrants récents	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	20,9**	(6,9 - 38,0)	22,4**	(7,1 - 39,8)
	10 ou plus	50,3*	(32,1 - 67,8)	58,4*	(37,1 - 78,0)
Autres combinaisons	0	5,6**	(1,9 - 10,1)	3,7**	(1,1 - 6,7)
	1 à 4	20,9	(15,5 - 26,4)	23,4	(16,8 - 30,3)
	5 à 9	16,5*	(10,9 - 21,8)	24,1	(18,5 - 29,7)
	10 ou plus	57,0	(49,8 - 64,6)	48,8	(41,2 - 56,5)
Non-réponse partielle ¹				5,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	0	10,2**	(4,0 – 16,9)	6,4**	(2,0 – 11,8)
	1 à 4	26,7*	(18,8 – 35,0)	22,0*	(14,4 – 30,2)
	5 à 9	20,9	(14,5 – 27,7)	33	(25,0 – 41,7)
	10 ou plus	42,2	(34,0 – 50,5)	38,6	(29,2 – 47,1)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	7,8**	(3,3 – 13,1)	5,1**	(2,0 – 8,7)
	1 à 4	22,5	(15,7 – 29,6)	26,1*	(18,4 – 34,3)
	5 à 9	18,7*	(12,6 – 25,3)	20,8	(15,6 – 26,2)
	10 ou plus	50,9	(42,9 – 59,1)	48	(40,3 – 56,0)
Quartile 4 (défavorisé)	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	20,9**	(10,7 – 32,9)	32,2*	(18,6 – 45,7)
	10 ou plus	60,7	(48,5 – 71,8)	48,4	(37,1 – 59,5)
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle					
			p=0,0619		p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	0	14,1*	(6,9 – 21,9)	8,3**	(3,1 – 14,7)
	1 à 4	28,7*	(18,1 – 39,8)	33,3	(23,3 – 43,7)
	5 à 9	23,0*	(12,8 – 34,1)	25,5*	(16,4 – 36,1)
	10 ou plus	34,2	(24,5 – 44,9)	32,9*	(21,9 – 43,6)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	5,9**	(1,7 – 10,5)	5,8**	(1,8 – 10,1)
	1 à 4	19,4*	(12,5 – 27,3)	18,8*	(12,3 – 26,4)
	5 à 9	19,4*	(12,7 – 26,7)	30,2	(23,7 – 36,4)
	10 ou plus	55,4	(45,9 – 64,5)	45,1	(37,8 – 52,4)
Quartile 4 (défavorisé)	0	6,0**	(1,3 – 11,4)	5,4*	(2,9 – 7,9)
	1 à 4	22,1*	(13,8 – 29,9)	24,1	(18,8 – 29,3)
	5 à 9	18,3*	(12,1 – 25,4)	24,9	(19,8 – 30,6)
	10 ou plus	53,6	(44,2 – 62,7)	45,6	(39,2 – 52,2)
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
Quartile 1 (favorisé)	0	12,5**	(6,2 – 19,3)	8,2**	(3,4 – 13,7)
	1 à 4	27,5	(19,8 – 35,0)	26,5*	(17,9 – 35,2)
	5 à 9	19,1*	(12,4 – 26,1)	29,2	(22,2 – 36,3)
	10 ou plus	41,0	(32,7 – 49,9)	36,1	(27,5 – 44,9)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	7,1**	(2,3 – 12,7)	4,3**	(0,8 – 8,5)
	1 à 4	19,9*	(12,2 – 29,0)	24,7*	(16,6 – 34,4)
	5 à 9	23,0*	(15,2 – 31,9)	25,0	(17,9 – 32,3)
	10 ou plus	49,9	(39,1 – 60,6)	45,9	(36,0 – 55,7)
Quartile 4 (défavorisé)	0	3,3**	(0,6 – 6,6)	n.p.	n.p.
	1 à 4	19,4*	(12,0 – 26,6)	n.p.	n.p.
	5 à 9	17,3*	(10,9 – 24,5)	26,3*	(18,3 – 35,3)
	10 ou plus	60,0	(51,6 – 68,5)	53,6	(43,6 – 62,5)
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
				p=0,1902	p=0,0082
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	10,5**	(4,5 – 16,3)	9,3**	(4,0 – 14,7)
	1 à 4	23,9*	(15,7 – 32,0)	28,6	(20,9 – 36,8)
	5 à 9	19,9*	(12,0 – 29,5)	32,4*	(22,6 – 42,4)
	10 ou plus	45,7	(35,5 – 56,6)	29,7*	(19,2 – 41,3)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	10,0**	(2,4 – 18,6)	5,2**	(0,8 – 10,4)
	1 à 4	22,9*	(12,8 – 33,9)	17,6*	(10,0 – 24,4)
	5 à 9	26,4*	(16,1 – 37,8)	28,1*	(19,8 – 36,7)
	10 ou plus	40,7	(29,5 – 52,8)	49,1	(39,1 – 58,6)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	3,2*	(1,1 – 5,4)	2,4**	(0,4 – 4,8)
	1 à 4	23,3	(17,2 – 29,4)	23,7*	(15,6 – 32,5)
	5 à 9	18,4	(13,4 – 23,8)	21,5	(15,8 – 27,6)
	10 ou plus	55,1	(48,7 – 61,6)	52,4	(44,0 – 60,6)

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	0	8,5*	(5,0 – 11,9)	6,3*	(3,7 – 9,1)
	1 à 4	24,8	(19,9 – 29,5)	25,4	(20,4 – 30,6)
	5 à 9	20,5	16,2 – 25,2)	28,3	(23,4 – 33,6)
	10 ou plus	46,3	(40,5 – 52,5)	40,1	(34,4 – 45,8)
Au moins un parent	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	23,2**	(7,7 - 39,8)	19,7**	(6,6 - 36,6)
	10 ou plus	61,4	(44,7 - 78,7)	64,1	(46,3 - 79,2)
Non-réponse partielle ¹		5,2 %		4,5 %	
Assurance dentaire privée					
Oui	0	4,1**	(1,4 – 7,4)	2,2**	(0,2 – 4,6)
	1 à 4	26,7	(20,1 – 33,4)	22,4	(16,1 – 29,1)
	5 à 9	17,0*	(11,1 – 23,7)	26,1	(20,1 – 32,4)
	10 ou plus	52,2	(44,7 – 60,2)	49,3	(42,1 – 56,5)
Non	0	11,1*	(6,1 – 16,3)	8,9*	(5,1 – 13,0)
	1 à 4	21,3	(15,9 – 26,7)	26,1	(19,2 – 33,4)
	5 à 9	23,8	(17,9 – 29,7)	28,5	(21,2 – 36,4)
	10 ou plus	43,8	(36,7 – 50,9)	36,6	(28,2 – 45,0)
Non-réponse partielle ¹		7,4 %		6,7 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	0	4,5**	(1,5 - 8,0)	n.p.	n.p.
	1 à 4	20,1	(14,0 - 26,3)	n.p.	n.p.
	5 à 9	17,6*	(10,9 - 25,3)	21,0	(14,8 - 27,4)
	10 ou plus	57,9	(49,9 - 66,6)	59,9	(51,9 - 67,8)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	7,5**	(2,3 - 13,2)	7,0**	(1,9 - 13,0)
	1 à 4	24,2*	(16,0 - 32,2)	24,8*	(14,8 - 34,7)
	5 à 9	25,1	(17,8 - 32,8)	32,4*	(21,8 - 44,9)
	10 ou plus	43,1	(34,0 - 53,2)	35,8	(25,1 - 45,7)
75 000 \$ et plus	0	14,3**	(5,3 - 24,7)	10,7**	(3,8 - 18,7)
	1 à 4	31,0*	(19,9 - 40,8)	32,8*	(20,4 - 45,3)
	5 à 9	18,5*	(9,6 - 27,8)	33,6*	(21,9 - 46,1)
	10 ou plus	36,2*	(24,8 - 48,9)	22,9*	(13,3 - 33,9)
Non-réponse partielle¹					
			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					
		p=n.p.		p=n.p.	
Faible	0	19,1**	(4,9 – 32,4)	n.p.	n.p.
	1 à 4	37,0**	(17,6 – 59,9)	n.p.	n.p.
	5 à 9	23,5**	(3,9 – 48,0)	38,5*	(22,4 – 53,7)
	10 ou plus	20,5**	(4,4 – 38,2)	29,9*	(16,0 – 43,9)
Moyen	0	7,3**	(3,8 – 11,0)	5,7*	(3,1 – 8,7)
	1 à 4	23,9	(18,8 – 29,5)	23,4	(17,5 – 29,4)
	5 à 9	23,0	(18,0 – 28,6)	27,1	(22,2 – 32,4)
	10 ou plus	45,8	(39,4 – 52,0)	43,8,	(37,1 – 50,5)
Élevé	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	13,5*	(7,4 – 20,4)	17,6**	(7,8 – 27,6)
	10 ou plus	65,0	(56,3 – 74,7)	58,7	(44,4 – 73,0)
Non-réponse partielle ¹		0,2%		0,4%	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 32 Répartition (quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées					
					p=n.p.
0 dents	0	6,4*	(3,4 - 9,7)	3,4**	(1,0 - 6,0)
	1 à 4	25,2	(19,6 - 30,5)	20,7	(14,9 - 27,0)
	5 à 9	21,2	(15,9 - 26,8)	21,9	(16,3 - 27,9)
	10 ou plus	47,2	(41,2 - 53,8)	54,0	(46,7 - 61,1)
1 à 3 dents	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1 à 4	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	5 à 9	18,7**	(8,5 - 29,1)	36,3	(26,8 - 46,0)
	10 ou plus	60,9	(45,3 - 75,7)	40,5	(28,7 - 52,4)
4 dents et plus	0	13,2**	(3,1 - 24,8)	12,8**	(5,8 - 20,8)
	1 à 4	21,2*	(11,9 - 31,4)	29,5*	(20,2 - 39,6)
	5 à 9	22,1*	(12,3 - 32,7)	29,2	(20,3 - 37,2)
	10 ou plus	43,5	(32,2 - 55,4)	28,5	(20,0 - 38,8)

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	41,0	(36,8 – 45,1)	45,3	0	51,2	(45,7 – 56,7)	50,2
	1 à 4	16,3	(12,1 – 20,8)	18,0	1 à 4	26,4	(22,2 – 30,9)	27,4
	5 à 9	14,8	(11,1 – 18,9)	13,7	5 ou plus	22,4	(18,6 – 26,4)	22,4
	10 ou plus	27,9	(23,7 – 32,4)	23,1				
Variable sociodémographique								
Sexe		p=0,1148				p=0,7115		
Masculin	0	42,3	(35,5 – 48,6)		0	52,1	(43,7 – 60,3)	
	1 à 4	15,0*	(10,0 – 20,5)		1 à 4	27,4	(20,7 – 34,3)	
	5 à 9	18,0*	(12,6 – 23,8)		5 ou plus	20,6*	(14,8 – 26,9)	
	10 ou plus	24,7	(18,8 – 30,6)					
Féminin	0	39,7	(34,0 – 45,1)		0	50,4	(43,1 – 57,2)	
	1 à 4	17,7*	(12,4 – 23,3)		1 à 4	25,4	(19,7 – 31,2)	
	5 à 9	11,4*	(7,0 – 16,4)		5 ou plus	24,2	(18,2 – 31,1)	
	10 ou plus	31,2	(25,2 – 37,4)					

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p=0,0290		p=0,1736
Au moins le français	0	45,5	(38,9 – 52,1)		0	53,8 (45,7 – 61,6)
	1 à 4	15,4*	(10,1 – 20,8)		1 à 4	25 (19,2 – 31,6)
	5 à 9	13,8*	(9,2 – 18,6)		5 ou plus	21,1 (15,3 – 27,0)
	10 ou plus	25,3	(19,3 – 31,8)			
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	40,4	(31,0 – 49,7)		0	54,2 (44,2 – 64,0)
	1 à 4	20,8*	(13,3 – 28,3)		1 à 4	28 (19,8 – 36,2)
	5 à 9	12,9*	(6,8 – 19,4)		5 ou plus	17,8* (10,9 – 26,1)
	10 ou plus	26,0*	(18,0 – 34,7)			
Ni le français, ni l'anglais	0	27,1*	(15,4 – 38,5)		0	40,8 (29,7 – 52,5)
	1 à 4	12,6**	(4,8 – 23,5)		1 à 4	27,7 (17,4 – 38,3)
	5 à 9	20,4*	(10,8 – 30,4)		5 ou plus	31,5 (22,0 – 41,6)
	10 ou plus	39,9	(30,6 – 50,3)			
Non-réponse partielle ¹				1,9%		1,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				p=0,7790			p=0,1769
1 enfant	0	37,2	(26,4 – 47,7)		0	58,4	(45,9 – 70,3)
	1 à 4	17,3*	(8,1 – 26,2)		1 à 4	20,5*	(11,4 – 31,0)
	5 à 9	16,0**	(7,9 – 24,9)		5 ou plus	21,2*	(11,7 – 31,6)
	10 ou plus	29,5*	(20,2 – 39,9)				
2 enfants	0	43,8	(35,8 – 51,3)		0	51,7	(43,3 – 60,2)
	1 à 4	15,2*	(9,5 – 21,4)		1 à 4	28,5	(21,6 – 36,2)
	5 à 9	14,8*	(9,8 – 20,2)		5 ou plus	19,8	(14,4 – 24,8)
	10 ou plus	26,3	(19,6 – 34,0)				
3 enfants	0	37,7	(29,1 – 45,7)		0	54,1	(41,4 – 65,9)
	1 à 4	16,1*	(8,3 – 24,4)		1 à 4	24,3*	(14,8 – 34,0)
	5 à 9	12,5**	(6,2 – 20,1)		5 ou plus	21,6*	(12,5 – 31,2)
	10 ou plus	33,6	(24,6 – 43,0)				
4 enfants ou plus	0	32,5*	(16,9 – 49,5)		0	30,7**	(14,9 – 47,5)
	1 à 4	16,0**	(3,6 – 30,8)		1 à 4	32,6**	(15,9 – 49,5)
	5 à 9	25,0**	(8,3 – 42,3)		5 ou plus	36,7*	(18,9 – 56,5)
	10 ou plus	26,5**	(10,8 – 43,7)				
Non-réponse partielle ¹				3,1%			2,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=n.p.	6 ^e année		p=0,7178
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	
Plus haut niveau de scolarité de la mère							
Pas de diplôme d'études secondaires	0	38,9*	(18,1 – 59,5)		0	45,9*	(27,5 – 66,3)
	1 à 4	13,3**	(1,6 – 26,8)		1 à 4	23,9**	(10,9 – 40,1)
	5 à 9	n.p.	n.p.		5 ou plus	30,2**	(12,2 – 48,3)
	10 ou plus	n.p.	n.p.				
Diplôme d'études secondaires	0	30,1*	(19,1 – 42,8)		0	49,0	(33,9 – 62,6)
	1 à 4	16,1**	(6,9 – 26,6)		1 à 4	28,3*	(14,3 – 42,9)
	5 à 9	15,1**	(5,0 – 26,0)		5 ou plus	22,7*	(13,0 – 32,6)
	10 ou plus	38,8	(26,9 – 49,9)				
Diplôme d'études postsecondaires	0	41,9	(37,0 – 46,9)		0	52,9	(47,0 – 58,6)
	1 à 4	16,6	(11,5 – 22,0)		1 à 4	27,1	(22,1 – 32,7)
	5 à 9	15,4	(11,4 – 19,8)		5 ou plus	20,0	(15,9 – 24,3)
	10 ou plus	26,0	(21,6 – 30,8)				
Non-réponse partielle ¹				4,5%			5,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=n.p.	6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents							p=0,9058
Deux parents non-immigrants	0	47,9	(39,7 – 56,6)		0	53,4 (44,4 – 63,1)	
	1 à 4	18,6*	(11,7 – 26,0)		1 à 4	25,1 (18,2 – 32,8)	
	5 à 9	9,0**	(4,2 – 14,6)		5 ou plus	21,5* (13,7 – 29,6)	
	10 ou plus	24,4	(18,5 – 30,5)				
Deux parents immigrants récents	0	45,4*	(28,3 - 60,3)		0	48,9* (32,6 - 65,1)	
	1 à 4	14,6**	(5,0 - 26,6)		1 à 4	26,3** (9,7 - 46,0)	
	5 à 9	n.p.	n.p.		5 ou plus	24,7** (7,6 - 41,3)	
	10 ou plus	n.p.	n.p.				
Autres combinaisons	0	34,1	(27,9 - 40,1)		0	48,7 (41,5 - 56,0)	
	1 à 4	14,0*	(8,9 - 19,6)		1 à 4	28,9 (22,9 - 35,0)	
	5 à 9	21,5*	(15,3 - 28,4)		5 ou plus	22,4 (16,6 - 28,5)	
	10 ou plus	30,4	(23,6 - 37,1)				
Non-réponse partielle ¹				5,4%			6,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale				p=0,9108			p=0,7640
Quartile 1 (favorisé)	0	41,9	(34,2 – 50,0)		0	53,1	(46,8 – 59,2)
	1 à 4	15,8*	(9,7 – 22,6)		1 à 4	27,7	(20,4 – 34,3)
	5 à 9	14,7*	(7,3 – 21,7)		5 ou plus	19,2*	(13,1 – 26,5)
	10 ou plus	27,6	(21,0 – 34,2)				
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	41,3	(34,8 – 48,0)		0	51,8	(42,4 – 61,2)
	1 à 4	15,0*	(9,3 – 20,9)		1 à 4	23,9	(17,5 – 30,8)
	5 à 9	16,0*	(10,0 – 22,5)		5 ou plus	24,3	(17,7 – 30,4)
	10 ou plus	27,7	(20,4 – 34,9)				
Quartile 4 (défavorisé)	0	33,0*	(22,6 – 45,4)		0	48,2	(33,7 – 61,8)
	1 à 4	17,3**	(7,8 – 28,1)		1 à 4	28,3*	(15,0 – 43,3)
	5 à 9	16,9**	(8,0 – 26,3)		5 ou plus	23,6*	(13,5 – 34,6)
	10 ou plus	32,7**	(21,9 – 44,3)				
Non-réponse partielle ¹				9,9%			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
			p=0,0383			p=0,0040
Quartile 1 (favorisé)	0	55,0	(43,4 – 66,4)	0	68,7	(58,0 – 78,5)
	1 à 4	14,7**	(7,5 – 22,3)	1 à 4	17,7*	(10,7 – 25,7)
	5 à 9	9,6**	(4,2 – 16,1)	5 ou plus	13,7**	(6,4 – 21,8)
	10 ou plus	20,8*	*12,0 – 31,2)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	36,4	(28,6 – 43,9)	0	48,9	(40,4 – 57,3)
	1 à 4	15,0*	(9,3 – 21,8)	1 à 4	28,4	(20,6 – 36,8)
	5 à 9	15,9*	(10,1 – 22,1)	5 ou plus	22,8	(17,7 – 28,2)
	10 ou plus	32,7	(25,1 – 40,4)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	33,4	(25,9 – 41,4)	0	42,8	(33,2 – 52,6)
	1 à 4	17,7*	(10,2 – 26,5)	1 à 4	28,8	(20,8 – 36,6)
	5 à 9	20,3*	(12,7 – 28,9)	5 ou plus	28,4*	19,7 – 37,2)
	10 ou plus	28,6*	(19,8 – 37,5)			
Non-réponse partielle ¹			9,9%			7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p=0,2830		p=0,1084
Quartile 1 (favorisé)	0	46,2	(37,4 – 54,6)		0	57,0 (49,5 – 63,4)
	1 à 4	14,9*	(9,3 – 21,3)		1 à 4	25,2 (19,2 – 31,7)
	5 à 9	12,2**	(5,5 – 18,7)		5 ou plus	17,8* (11,9 – 24,6)
	10 ou plus	26,6	(19,1 – 35,0)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	41,1	(33,2 – 48,6)		0	54,7 (45,3 – 63,9)
	1 à 4	14,9*	(8,1 – 22,5)		1 à 4	23,4* (15,8 – 31,4)
	5 à 9	17,8*	(10,6 – 25,2)		5 ou plus	22,0* (14,5 – 30,1)
	10 ou plus	26,1*	(18,0 – 35,0)			
Quartile 4 (défavorisé)	0	31,3	(23,6 – 39,9)		0	41,7 (32,6 – 51,2)
	1 à 4	17,5*	(10,5 – 25,5)		1 à 4	29,8 (21,7 – 37,4)
	5 à 9	17,4*	(10,5 – 24,9)		5 ou plus	28,5* (19,3 – 37,8)
	10 ou plus	33,8	(25,1 – 41,7)			
Non-réponse partielle ¹				9,9%		7,6%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		Nombre de faces	6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])		p=0,3465		p=0,2099		
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	43,1	(34,4 – 51,3)	0	59,2	(51,6 – 66,9)
	1 à 4	15,7**	(8,2 – 24,5)	1 à 4	21,4*	(14,8 – 28,5)
	5 à 9	17,0*	(9,2 – 24,1)	5 ou plus	19,4*	(12,1 – 27,2)
	10 ou plus	24,2	(18,4 – 30,5)			
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	47,2	(37,9 – 56,0)	0	45,2	(32,3 – 56,4)
	1 à 4	18,3**	(8,8 – 29,1)	1 à 4	32,0*	(22,5 – 42,6)
	5 à 9	10,1**	(2,7 – 18,6)	5 ou plus	22,8*	(15,4 – 31,1)
	10 ou plus	24,3*	(16,2 – 32,8)			
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	35,7	(30,2 – 41,2)	0	49,9	(42,2 – 58,6)
	1 à 4	15,5*	(9,9 – 21,5)	1 à 4	25,8	(19,9 – 31,7)
	5 à 9	16,2*	(10,8 – 22,0)	5 ou plus	24,3	(18,1 – 30,1)
	10 ou plus	32,6	(25,2 – 39,9)			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p	6 ^e année		p
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	
Prestations de l'aide sociale				p=0,4246			p=0,0045
Aucun parent	0	42,5	(38,1 – 46,8)		0	55,1	(49,2 – 60,9)
	1 à 4	16,2	(11,4 – 21,2)		1 à 4	27	(22,2 – 32,1)
	5 à 9	13,6	(9,9 – 17,5)		5 ou plus	17,9	(13,9 – 21,8)
	10 ou plus	27,7	(23,4 – 32,3)				
Au moins un parent	0	33,1	(15,8 - 49,3)		0	33,7*	(19,9 - 49,7)
	1 à 4	14,4**	(5,4 - 26,6)		1 à 4	16,7**	(4,9 - 31,2)
	5 à 9	22,2**	(9,2 - 37,5)		5 ou plus	49,7*	(30,7 - 66,9)
	10 ou plus	30,3*	(16,2 - 45,6)				
Non-réponse partielle ¹				5,2%			4,5%
Assurance dentaire privée				p=0,6912			p=0,7254
Oui	0	41,1	(34,3 – 47,7)		0	53,1	(45,5 – 61,2)
	1 à 4	18,4*	(12,4 – 25,2)		1 à 4	27,1	(20,2 – 34,5)
	5 à 9	14,2*	(9,5 – 19,3)		5 ou plus	19,8	(14,4 – 24,9)
	10 ou plus	26,3	(20,6 – 32,5)				
Non	0	39,3	(31,9 – 46,0)		0	51,8	(44,4 – 59,1)
	1 à 4	14,7*	(9,2 – 20,9)		1 à 4	25,2	(18,9 – 32,0)
	5 à 9	15,9*	(10,5 – 21,4)		5 ou plus	22,9	(17,3 – 29,3)
	10 ou plus	30,1*	(22,7 – 37,9)				
Non-réponse partielle ¹				7,4%			6,7%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents				p=0,0890			p=0,0263
Moins de 40 000 \$	0	37,4	(29,6 - 44,7)		0	46,2	(39,3 - 53,2)
	1 à 4	13,0*	(8,4 - 18,3)		1 à 4	25,3*	(18,1 - 33,2)
	5 à 9	16,4*	(10,6 - 23,2)		5 ou plus	28,5	(21,4 - 35,7)
	10 ou plus	33,2	(25,3 - 41,5)				
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	37,0	(27,3 - 46,1)		0	51,4	(38,1 - 64,0)
	1 à 4	19,5*	(10,6 - 28,9)		1 à 4	31,6*	(21,6 - 41,7)
	5 à 9	19,0**	(10,2 - 29,5)		5 ou plus	17,0*	(9,4 - 25,9)
	10 ou plus	24,5*	(16,4 - 33,8)				
75 000 \$ et plus	0	51,3	(38,9 - 61,8)		0	64,9	(52,9 - 75,0)
	1 à 4	19,1*	(11,1 - 28,2)		1 à 4	22,1*	(14,0 - 31,6)
	5 à 9	7,7**	(2,1 - 13,7)		5 ou plus	13,0**	(5,9 - 20,9)
	10 ou plus	21,9*	(12,6 - 34,0)				
Non-réponse partielle ¹				10,9%			13,3%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris						
				p=n.p.		p=0,2352
Faible	0	57,6*	(39,1 – 78,6)	0	65,6	(50,1 – 81,4)
	1 à 4	24,6**	(7,8 – 43,0)	1 à 4	17,9**	(5,7 – 30,6)
	5 à 9	n.p.	n.p.	5 ou plus	16,5**	(5,8 – 28,6)
	10 ou plus	n.p.	n.p.			
Moyen	0	43,6	(38,0 – 48,8)	0	50,2	(44,4 – 56,0)
	1 à 4	15,9*	(10,9 – 21,6)	1 à 4	28,5	(23,6 – 33,5)
	5 à 9	15,9	(11,7 – 20,5)	5 ou plus	21,4	(17,0 – 26,3)
	10 ou plus	24,5	(19,3 – 29,8)			
Élevé	0	28,9*	(19,8 – 37,7)	0	46,4*	(30,1 – 62,3)
	1 à 4	14,0*	(7,3 – 20,8)	1 à 4	23,5**	(12,4 – 37,8)
	5 à 9	11,4**	(5,1 – 19,5)	5 ou plus	30,0*	(16,1 – 45,1)
	10 ou plus	45,7	(36,7 – 55,5)			
Non-réponse partielle ¹				0,2%		0,4%

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 33 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) et selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		p=0,0892	6 ^e année		P=0,0014
		%	I.C. à 95 %		Nombre de faces	%	
Nombre de dents scellées en dentitions combinées							
0 dents	0	43,3	(38,2 – 42,9)		0	48,0	(40,0 – 56,1)
	1 à 4	16,0	(11,4 – 20,9)		1 à 4	24,2	(18,0 – 30,9)
	5 à 9	15,5*	(11,2 – 20,5)		5 ou plus	27,8	(21,4 – 34,3)
	10 ou plus	25,1	(19,7 – 30,7)				
1 à 3 dents	0	22,9*	(13,2 – 34,3)		0	44,8	(32,3 – 56,5)
	1 à 4	20,4**	(7,9 – 33,3)		1 à 4	40,1	(29,7 – 52,0)
	5 à 9	14,2**	(4,7 – 24,5)		5 ou plus	15,1*	(8,0 – 23,7)
	10 ou plus	42,5*	(27,8 – 57,3)				
4 dents et plus	0	45,4	(33,3 – 58,1)		0	63,2	(53,5 – 72,4)
	1 à 4	14,5**	(6,3 – 23,5)		1 à 4	19,8*	(11,7 – 28,4)
	5 à 9	11,8**	(4,1 – 21,2)		5 ou plus	17,0*	(10,3 – 24,2)
	10 ou plus	20,3*	(17,5 – 39,0)				

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 34 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces), ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année				6 ^e année				
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		
Stade 1 à 6	0	7,2*	(4,3 - 10,1)	12,8	p=0,0005		5,3*	(3,1 - 7,8)	8,7	p=0,0473
	1 à 4	21,5	(17,2 - 25,8)	27,1			21,8	(17,4 - 26,4)	24,5	
	5 à 9	19,5	(15,2 - 23,9)	20,4			26,4	(22,0 - 30,9)	28,2	
	10 ou plus	51,8	(46,8 - 57,2)	39,7			46,5	(41,0 - 52,1)	38,6	
Stade 1 à 3	0	7,2*	(4,3 - 10,1)	13,1	p=0,0003		5,3*	(3,1 - 7,8)	9,0	p=0,0505
	1 à 4	23,2	(18,7 - 27,5)	28,1			22,8	(18,4 - 27,3)	25,1	
	5 à 9	21,0	(16,9 - 25,7)	22,1			26,8	(22,6 - 31,4)	28,0	
	10 ou plus	48,6	(43,6 - 53,9)	36,6			45,1	(39,6 - 50,7)	37,8	
Stade 4 à 6	0	41,0	(36,8 - 45,1)	45,3	p=0,2137	0	51,2	(45,7 - 56,7)	50,2	p=0,8252
	1 à 4	16,2	(12,0 - 20,8)	17,9		1 à 4	25,8	(21,6 - 30,2)	27,3	
	5 à 9	14,7	(11,0 - 18,8)	13,8		5 ou plus	23,0	(18,8 - 27,7)	22,5	
	10 ou plus	28,1	(23,8 - 32,6)	23,1						

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Distribution de la carie selon le type de dents et de faces (dentition temporaire)

Tableau 35 Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec (Nombre moyen)	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec (Nombre moyen)
c₁₋₆aof_{ocm 88}						
Toutes les composantes	3,59†	(3,34 - 3,85)	2,89	1,67	(1,39 - 1,95)	1,59
Composante c	1,49†	(1,30 - 1,70)	1,16	0,78†	(0,63 - 0,92)	0,57
Composante a	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,01**	(0,00 - 0,03)	0,01**
Composante o	2,02†	(1,78 - 2,25)	1,67	0,88	(0,66 - 1,12)	1,01
c₁₋₃aof_{ocm 88}						
Toutes les composantes	3,33†	(3,09 - 3,58)	2,63	1,48	(1,21 - 1,77)	1,49
Composante c	1,24†	(1,07 - 1,41)	0,90	0,59	(0,44 - 0,74)	0,47
Composante a	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,01**	(0,00 - 0,03)	0,01**
Composante o	2,02†	(1,78 - 2,25)	1,67	0,88	(0,66 - 1,12)	1,01
c₄₋₆aof_{ocm 88}						
Toutes les composantes	2,59†	(2,34 - 2,84)	2,18	1,19	(0,93 - 1,47)	1,24
Composante c	0,26	(0,19 - 0,32)	0,25	0,19*	(0,11 - 0,27)	0,11
Composante a	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,01**	(0,00 - 0,03)	0,01**
Composante o	2,25†	(2,00 - 2,49)	1,89	1	(0,76 - 1,27)	1,12

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 36 Nombre moyen de faces lisses¹ cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face autre que occlusale temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec (Nombre moyen)	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec (Nombre moyen)
c₁₋₆aof_{L88}						
Toutes les composantes	6,37†	(5,73 - 7,06)	4,73	2,79	(2,26 - 3,33)	2,26
Composante c	2,85	(2,44 - 3,27)	2,56	1,69†	(1,36 - 2,03)	1,13
Composante a	0,36*	(0,22 - 0,53)	0,25**	0,04**	(0,00 - 0,09)	0,04**
Composante o	3,16†	(2,69 - 3,71)	1,92	1,06	(0,76 - 1,38)	1,09
c₁₋₃aof_{L88}						
Toutes les composantes	5,89†	(5,27 - 6,60)	4,19	2,48	(1,99 - 2,98)	2,06
Composante c	2,37	(2,01 - 2,76)	2,03	1,38†	(1,09 - 1,69)	0,93
Composante a	0,36*	(0,22 - 0,53)	0,25**	0,04**	(0,00 - 0,09)	0,04**
Composante o	3,16†	(2,69 - 3,71)	1,92	1,06	(0,76 - 1,38)	1,09
c₄₋₆aof_{L88}						
Toutes les composantes	4,14†	(3,58 - 4,79)	3,06	1,56	(1,19 - 1,94)	1,53
Composante c	0,48*	(0,35 - 0,63)	0,50	0,31*	(0,19 - 0,45)	0,23
Composante a	0,36*	(0,22 - 0,53)	0,25**	0,04**	(0,00 - 0,09)	0,04**
Composante o	3,31†	(2,83 - 3,87)	2,36	1,21	(0,90 - 1,55)	1,27

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

¹ Notons que dans l'ÉCSBQ 2012-2013, la face lisse des 2^{es} molaires supérieures (dents n° 55 et 65) inclut le sillon lingual et la face buccale lisse des 2^{es} molaires inférieures (dents n° 75 et 85) inclut les sillons buccaux. De plus, les faces linguales lisses des incisives supérieures (dents n° 52, 51, 61 et 62) comprennent les sillons linguaux.

Tableau 37 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₁₋₆aof_{ocm 88}							
Toutes les composantes	0	22,3 [†]	(18,2 - 26,3)	31,6	30,8	(23,6 - 38,9)	37,0
	1 ou plus	77,7 [†]	(73,7 - 81,8)	68,4	69,2	(61,1 - 76,4)	63,0
Composante c	0	44,3 [†]	(39,0 - 49,8)	53,1	53,6 [†]	(46,1 - 61,4)	66,6
	1 ou plus	55,7 [†]	(50,2 - 61,0)	46,9	46,4 [†]	(38,6 - 53,9)	33,4
Composante a	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 - 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	0,9 ^{**}
Composante o	0	52,3	(48,0 - 56,7)	55,3	59,2	(51,2 - 67,0)	56,9
	1 ou plus	47,7	(43,3 - 52,0)	44,7	40,8	(33,0 - 48,8)	43,1
c₁₋₃aof_{ocm 88}							
Toutes les composantes	0	25,0 [†]	(20,7 - 29,2)	33,3	34,5	(26,4 - 43,5)	40,6
	1 ou plus	75,0 [†]	(70,8 - 79,3)	66,7	65,5	(56,5 - 73,6)	59,4
Composante c	0	50,5	(45,4 - 56,0)	57,8	60,9 [†]	(52,6 - 69,4)	73,3
	1 ou plus	49,5	(44,0 - 54,6)	42,2	39,1 [†]	(30,6 - 47,4)	26,7
Composante a	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 - 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	0,9 ^{**}
Composante o	0	52,3	(48,0 - 56,7)	55,3	59,2	(51,2 - 67,0)	56,9
	1 ou plus	47,7	(43,3 - 52,0)	44,7	40,8	(33,0 - 48,8)	43,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 37 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₄₋₆aof_{ocm 88}							
Toutes les composantes	0	44,1 [†]	(39,5 - 48,5)	49,6	49,1	(41,2 - 57,3)	51,8
	1 ou plus	55,9 [†]	(51,5 - 60,5)	50,4	50,9	(42,7 - 58,8)	48,2
Composante c	0	84,2	(80,4 - 87,9)	87,4	87,6	(82,5 - 92,3)	91,2
	1 ou plus	15,8	(12,1 - 19,6)	12,6	12,4*	(7,7 - 17,5)	8,8
Composante a	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	0,9**
Composante o	0	50,2	(45,9 - 54,6)	53,9	54,8	(46,0 - 63,6)	55,5
	1 ou plus	49,8	(45,4 - 54,1)	46,1	45,2	(36,4 - 54,0)	44,5

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 38 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses² cariées aux stade 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₁₋₆aof_{L88}							
Toutes les composantes	0	24,7 [†]	(20,5 - 28,9)	36,4	37,6	(29,6 - 46,3)	39,0
	1 ou plus	75,3 [†]	(71,1 - 79,5)	63,6	62,4	(53,7 - 70,4)	61,0
Composante c	0	36,1 [†]	(31,1 - 41,1)	45,4	43,9	(35,3 - 52,8)	53,3
	1 ou plus	63,9 [†]	(58,9 - 68,9)	54,6	56,1	(47,2 - 64,7)	46,7
Composante a	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 - 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	0,9 ^{**}
Composante o	0	55,9	(51,4 - 60,3)	60,3	66,0	(57,8 - 74,3)	65,6
	1 ou plus	44,1	(39,7 - 48,6)	39,7	34,0	(25,7 - 42,2)	34,4
c₁₋₃aof_{L88}							
Toutes les composantes	0	25,7 [†]	(21,3 - 30,2)	37,4	40,9	(32,8 - 49,7)	41,9
	1 ou plus	74,3 [†]	(69,8 - 78,7)	62,6	59,1	(50,3 - 67,2)	58,1
Composante c	0	38,3 [†]	(33,4 - 43,4)	47,8	48,0	(39,2 - 57,2)	57,6
	1 ou plus	61,7 [†]	(56,6 - 66,6)	52,2	52,0	(42,8 - 60,8)	42,4
Composante a	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7 [*]	(3,6 - 8,0)	3,9 [*]	n.p.	n.p.	0,9 ^{**}
Composante o	0	55,9	(51,4 - 60,3)	60,3	66,0	(57,8 - 74,3)	65,6
	1 ou plus	44,1	(39,7 - 48,6)	39,7	34,0	(25,7 - 42,2)	34,4

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

² Notons que dans l'ÉCSBQ 2012-2013, la face lisse des 2^{es} molaires supérieures (dents n° 55 et 65) inclut le sillon lingual et la face buccale lisse des 2^{es} molaires inférieures (dents n° 75 et 85) inclut les sillons buccaux. De plus, les faces linguales lisses des incisives supérieures (dents n° 52, 51, 61 et 62) comprennent les sillons linguaux.

Tableau 38 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses³ cariées aux stade 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
c₄₋₆aof_L88							
Toutes les composantes	0	47,3 [†]	(42,8 - 51,6)	53,4	58,0	(50,2 - 65,8)	57,8
	1 ou plus	52,7 [†]	(48,4 - 57,2)	46,6	42,0	(34,2 - 49,8)	42,2
Composante c	0	83,1	(79,6 - 86,6)	83,7	86,1	(81,5 - 90,7)	89,0
	1 ou plus	16,9	(13,4 - 20,4)	16,3	13,9*	(9,3 - 18,5)	11,0
Composante a	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	0,9**
Composante o	0	55,3	(50,8 - 59,7)	59,4	64,4	(56,4 - 72,6)	62,6
	1 ou plus	44,7	(40,3 - 49,2)	40,6	35,6	(27,4 - 43,6)	37,4

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

³ Notons que dans l'ÉCSBQ 2012-2013, la face lisse des 2^{es} molaires supérieures (dents n° 55 et 65) inclut le sillon lingual et la face buccale lisse des 2^{es} molaires inférieures (dents n° 75 et 85) inclut les sillons buccaux. De plus, les faces linguales lisses des incisives supérieures (dents n° 52, 51, 61 et 62) comprennent les sillons linguaux.

Tableau 39 Proportion des incisives et canines, premières molaires et deuxièmes molaires cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie parmi les différents types de dents temporaires des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1 à 6						
Incisives et canines	9,0†	(7,3 - 10,8)	6,4	12,6*	(7,1 - 19,6)	6,6*
Premières molaires	43,7†	(40,4 - 47,3)	35,2	36,3*	(25,9 - 47,5)	39,6
Deuxièmes molaires	62,3†	(58,4 - 66,2)	49,8	59,7	(52,8 - 66,4)	54,2
Stade 1 à 3						
Incisives et canines	7,6	(5,9 - 9,3)	5,5	11,1**	(5,6 - 17,7)	5,4*
Premières molaires	39,3†	(36,1 - 42,8)	30,2	30,1*	(20,9 - 40,8)	35,6
Deuxièmes molaires	58,4†	(54,6 - 62,1)	45,3	53,0	(45,9 - 59,9)	49,3
Stade 4 à 6						
Incisives et canines	2,8†*	(1,9 - 3,9)	1,7	4,7**	(1,9 - 8,3)	2,7*
Premières molaires	33,4†	(29,9 - 36,8)	28,6	28,6*	(18,9 - 39,4)	30,5
Deuxièmes molaires	34,4†	(30,9 - 38,0)	28,4	33,9	(26,9 - 41,5)	32,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 40 Proportion des incisives et canines, premières molaires et deuxièmes molaires parmi les dents temporaires cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1 à 6						
Incisives et canines	10,0	(8,2 - 11,9)	9,0	6,4*	(3,7 - 9,4)	4,4*
Premières molaires	36,4	(35,0 - 37,8)	37,3	17,6	(13,2 - 21,5)	21,1
Deuxièmes molaires	53,5	(51,4 - 55,6)	53,7	76,0	(71,1 - 81,3)	74,5
Stade 1 à 3						
Incisives et canines	9,2	(7,4 - 11,1)	8,9	6,5*	(3,3 - 9,8)	4,0*
Premières molaires	35,9	(34,3 - 37,5)	36,1	16,6	(12,1 - 21,0)	21,0
Deuxièmes molaires	54,9	(52,7 - 57,1)	55,0	76,9	(71,5 - 82,6)	75,0
Stade 4 à 6						
Incisives et canines	5,2*	(3,5 - 7,0)	3,8	4,0**	(1,6 - 6,8)	2,9*
Premières molaires	46,0	(44,2 - 48,0)	47,8	23,3	(17,4 - 28,4)	27,4
Deuxièmes molaires	48,8	(46,6 - 50,9)	48,4	72,6	(66,9 - 79,0)	69,7

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 41 Répartition (trois catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année				6 ^e année				
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6	0	22,3	(18,2 - 26,3)	31,6	p=0,0001	0	30,8	(23,6 - 38,9)	37	p=0,3735
	1 à 4	39,3	(33,9 - 44,4)	40,3		1 à 2	44,7	(35,3 - 53,6)	38,9	
	5 ou plus	38,5	(34,0 - 42,9)	28		3 ou plus	24,5	(17,3 - 32,2)	24,1	
Stade 1 à 3	0	25,0	(20,7 - 29,2)	33,3	p=0,0001	0	34,5	(26,4 - 43,5)	40,6	p=0,2250
	1 à 4	39,7	(34,5 - 45,0)	42,4		1 à 2	46,0	(36,1 - 55,7)	37,2	
	5 ou plus	35,3	(30,7 - 39,8)	24,2		3 ou plus	19,5*	(12,4 - 27,1)	22,2	
Stade 4 à 6	0	44,1	(39,5 - 48,5)	49,6	p=0,0334	0	49,1	(41,2 - 57,3)	51,8	p=0,6186
	1 à 4	28,3	(23,6 - 48,5)	29,2		1 à 2	32,5	(25,4 - 39,4)	28,6	
	5 ou plus	27,5	(23,4 - 32,0)	21,2		3 ou plus	18,4*	(11,6 - 25,2)	19,6	

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 42 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses⁴ cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année					6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)			%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6	0	24,7	(20,5 - 28,9)	36,4	p=0,0001	0	37,6	(29,6 - 46,3)	39,0	p=0,0987
	1 à 4	30,8	(26,6 - 35,0)	31,0		1 à 4	39,3	(31,5 - 47,6)	45,6	
	5 à 9	20,5	(17,1 - 24,2)	15,8		5 ou plus	23,1	(16,4 - 29,8)	15,4	
	10 ou plus	24,1	(20,4 - 27,8)	16,8						
Stade 1 à 3	0	25,7	(21,3 - 30,2)	37,4	p=0,0001	0	40,9	(32,8 - 49,7)	41,9	p=0,1436
	1 à 4	32,3	(28,1 - 36,5)	32,3		1 à 4	38,4	(30,4 - 47,2)	44,2	
	5 à 9	21,4	(17,8 - 25,4)	16,3		5 ou plus	20,7*	(14,1 - 27,4)	13,9	
	10 ou plus	20,6	(17,3 - 24,2)	14,0						
Stade 4 à 6	0	47,3	(42,8 - 51,6)	53,4	p=0,0692	0	58,0	(50,2 - 65,8)	57,8	p=0,5491
	1 à 4	24,8	(20,6 - 29,1)	22,3		1 à 4	28,6	(21,3 - 35,7)	31,3	
	5 à 9	14,5	(11,7 - 17,4)	14,7		5 ou plus	13,4*	(8,3 - 18,6)	10,8	
	10 ou plus	13,3	(10,4 - 16,3)	9,6						

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Dans le cas d'un indicateur en répartition à plus de 2 modalités, seuls les tests globaux d'indépendance du khi-deux sont effectués.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

⁴ Notons que dans l'ÉCSBQ 2012-2013, la face lisse des 2^{es} molaires supérieures (dents n° 55 et 65) inclut le sillon lingual et la face buccale lisse des 2^{es} molaires inférieures (dents n° 75 et 85) inclut les sillons buccaux. De plus, les faces linguales lisses des incisives supérieures (dents n° 52, 51, 61 et 62) comprennent les sillons linguaux.

Tableau 43 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des molaires en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires temporaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	69,4	(63,3 - 75,0)	73,7	79,9	(73,0 - 86,5)	84,2
	1 ou plus	30,6	(25,0 - 36,7)	26,3	20,1*	(13,5 - 27,0)	15,8
Stade 2	0	72,4†	(67,4 - 77,2)	80,2	82,9	(75,9 - 89,9)	86,8
	1 ou plus	27,6†	(22,8 - 32,6)	19,8	17,1*	(10,1 - 24,1)	13,2
Stade 3	0	90,4†	(87,0 - 93,3)	96,5	91,5†	(86,7 - 95,9)	98,3
	1 ou plus	9,6†*	(6,7 - 13,0)	3,5	8,5†**	(4,1 - 13,3)	1,7**
Stade 4	0	95,8	(93,4 - 97,8)	92,6	97,5	(94,8 - 99,5)	96,3
	1 ou plus	4,2**	(2,2 - 6,6)	7,4	2,5**	(0,5 - 5,2)	3,7*
Stade 5	0	86,9†	(83,6 - 90,2)	93,2	90,1†	(86,0 - 94,2)	95,2
	1 ou plus	13,1†	(9,8 - 16,4)	6,8	9,9†*	(5,8 - 14,0)	4,8
Stade 6	0	98,9	(98,0 - 99,7)	98,4	n.p.	n.p.	99,0
	1 ou plus	1,1**	(0,3 - 2,0)	1,6*	n.p.	n.p.	1,0**

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Étant donné que certaines cellules ont moins de 5 répondants, cette valeur n'est pas présentée.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 44 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses⁵, cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition temporaire (88 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ- Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	78,7	(73,1 - 84,2)	71,1	86,0	(79,7 - 91,9)	86,9
	1 ou plus	21,3	(15,8 - 26,9)	28,9	14,0*	(8,1 - 20,3)	13,1
Stade 2	0	49,0†	(43,7 - 54,4)	66,2	59,0	(51,1 - 66,8)	67,0
	1 ou plus	51,0†	(45,6 - 56,3)	33,8	41,0	(33,2 - 48,9)	33,0
Stade 3	0	89,1	(85,5 - 92,2)	89,9	89,9†	(84,6 - 94,6)	95,9
	1 ou plus	10,9*	(7,8 - 14,5)	10,1	10,1†*	(5,4 - 15,4)	4,1*
Stade 4	0	95,5†	(93,1 - 97,6)	89,2	96,7	(93,9 - 99,1)	95,2
	1 ou plus	4,5†*	(2,4 - 6,9)	10,8	3,3**	(0,9 - 6,1)	4,8
Stade 5	0	86,3†	(83,1 - 89,3)	91,7	90,2†	(85,7 - 94,4)	95,1
	1 ou plus	13,7†	(10,7 - 16,9)	8,3	9,8*	(5,6 - 14,3)	4,9
Stade 6	0	95,6	(93,6 - 97,4)	93,8	95,7	(92,5 - 98,7)	95,2
	1 ou plus	4,4*	(2,6 - 6,4)	6,2	4,3**	(1,3 - 7,5)	4,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

⁵ Notons que dans l'ÉCSBQ 2012-2013, la face lisse des 2^{es} molaires supérieures (dents n° 55 et 65) inclut le sillon lingual et la face buccale lisse des 2^{es} molaires inférieures (dents n° 75 et 85) inclut les sillons buccaux. De plus, les faces linguales lisses des incisives supérieures (dents n° 52, 51, 61 et 62) comprennent les sillons linguaux.

Distribution de la carie selon le type de dents et de faces (dentition permanente)

Tableau 45 Nombre moyen de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 et 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆AOF_{P&F 140}						
Toutes les composantes	2,12	(1,75 - 2,50)	1,85	5,20	(4,67 - 5,79)	4,53
Composante C	1,90	(1,53 - 2,30)	1,62	4,31	(3,82 - 4,84)	3,62
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,02**
Composante O	0,22	(0,16 - 0,29)	0,23	0,89	(0,70 - 1,12)	0,88
C₁₋₆AOF_{P&F 144}						
Toutes les composantes	2,44	(2,01 - 2,90)	2,14	5,98	(5,38 - 6,67)	5,24
Composante C	2,16	(1,72 - 2,64)	1,85	4,80	(4,25 - 5,41)	4,06
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,03**
Composante O	0,28	(0,20 - 0,37)	0,3	1,18	(0,93 - 1,49)	1,16
C₁₋₃AOF_{P&F 140}						
Toutes les composantes	2,05	(1,70 - 2,43)	1,8	5,09	(4,57 - 5,68)	4,41
Composante C	1,84	(1,48 - 2,23)	1,57	4,2	(3,72 - 4,74)	3,51
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,02**
Composante O	0,22	(0,16 - 0,29)	0,23	0,89	(0,70 - 1,12)	0,88

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 45 Nombre moyen de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 et 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₃ AOF_{P&F 144}						
Toutes les composantes	2,38	(1,95 - 2,84)	2,09	5,87	(5,27 - 6,56)	5,12
Composante C	2,09	(1,66 - 2,57)	1,80	4,69	(4,14 - 5,30)	3,94
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,03**
Composante O	0,28	(0,20 - 0,37)	0,30	1,18	(0,93 - 1,49)	1,16
C₄₋₆ AOF_{P&F 140}						
Toutes les composantes	0,31	(0,24 - 0,39)	0,28	1,14	(0,93 - 1,39)	1,13
Composante C	0,06**	(0,03 - 0,09)	0,05*	0,11*	(0,07 - 0,16)	0,12
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,02**
Composante O	0,25	(0,18 - 0,32)	0,23	1,03	(0,83 - 1,27)	0,99
C₄₋₆ AOF_{P&F 144}						
Toutes les composantes	0,37	(0,27 - 0,46)	0,34	1,40	(1,14 - 1,71)	1,37
Composante C	0,06**	(0,03 - 0,10)	0,05*	0,11*	(0,07 - 0,16)	0,12
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,03**
Composante O	0,30	(0,22 - 0,39)	0,29	1,29	(1,02 - 1,60)	1,23

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 46 Nombre moyen de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆AOFL₁₄₀						
Toutes les composantes	1,15	(0,95 - 1,36)	1,30*	3,72	(3,11 - 4,39)	3,78
Composante C	1,13	(0,92 - 1,34)	1,29*	3,49	(2,88 - 4,13)	3,47
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,05**
Composante O	0,02**	(0,01 - 0,05)	0,02**	0,24*	(0,15 - 0,34)	0,27
C₁₋₃AOFL₁₄₀						
Toutes les composantes	1,14	(0,93 - 1,35)	1,30*	3,65	(3,05 - 4,30)	3,70
Composante C	1,11	(0,91 - 1,33)	1,28*	3,42	(2,81 - 4,04)	3,38
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,05**
Composante O	0,02**	(0,01 - 0,05)	0,02**	0,24*	(0,15 - 0,34)	0,27
C₄₋₆AOFL₁₄₀						
Toutes les composantes	0,04**	(0,02 - 0,07)	0,04*	0,36*	(0,24 - 0,50)	0,40
Composante C	0,01**	(0,00 - 0,03)	0,01**	0,07**	(0,03 - 0,12)	0,10*
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00†**	(-)	0,05**
Composante O	0,03**	(0,01 - 0,05)	0,03*	0,29*	(0,19 - 0,40)	0,25

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 47 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₁₋₆ AOF_{P&F 140}							
Toutes les composantes	0	39,8	(34,2 - 45,2)	41,6	11,9†	(8,9 - 15,1)	20,0
	1 ou plus	60,2	(54,8 - 65,8)	58,4	88,1†	(84,9 - 91,1)	80,0
Composante c	0	42,3	(36,7 - 48,1)	45,2	15,0†	(11,5 - 18,5)	26,2
	1 ou plus	57,7	(51,9 - 63,3)	54,8	85,0†	(81,5 - 88,5)	73,8
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	89,7	(86,4 - 92,6)	90,5	70,7	(65,5 - 75,5)	70,2
	1 ou plus	10,3	(7,4 - 13,6)	9,5	29,3	(24,5 - 34,5)	29,8
C₁₋₃ AOF_{P&F 140}							
Toutes les composantes	0	40,1	(34,5 - 45,5)	41,8	40,1	(34,5 - 45,5)	41,8
	1 ou plus	59,9	(54,5 - 65,5)	58,2	59,9	(54,5 - 65,5)	58,2
Composante c	0	42,6	(37,0 - 48,5)	45,6	15,4†	(11,9 - 18,9)	26,8
	1 ou plus	57,4	(51,5 - 63,0)	54,4	84,6†	(81,1 - 88,1)	73,2
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	89,7	(86,4 - 92,6)	90,5	70,7	(65,5 - 75,5)	70,2
	1 ou plus	10,3	(7,4 - 13,6)	9,5	29,3	(24,5 - 34,5)	29,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 47 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₄₋₆ AOF_{P&F 140}							
Toutes les composantes	0	85,8	(82,4 - 89,2)	88,6	85,8	(82,4 - 89,2)	88,6
	1 ou plus	14,2	(10,8 - 17,6)	11,4	14,2	(10,8 - 17,6)	11,4
Composante c	0	96,3	(94,6 - 97,9)	96,9	92,6	(89,8 - 95,2)	93,6
	1 ou plus	3,7*	(2,1 - 5,4)	3,1*	7,4*	(4,8 - 10,2)	6,4
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	88,5	(85,2 - 91,7)	91,0	68,0	(63,1 - 72,9)	68,4
	1 ou plus	11,5	(8,3 - 14,8)	9,0	32,0	(27,1 - 36,9)	31,6

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 48 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₁₋₆ AOF_{L 140}							
Toutes les composantes	0	57,6 [†]	(52,0 - 63,2)	71,1	31,8	(26,1 - 38,1)	34,4
	1 ou plus	42,4 [†]	(36,8 - 48,0)	28,9	68,2	(61,9 - 73,9)	65,6
Composante c	0	58,5 [†]	(52,8 - 64,1)	71,6	33,0	(27,3 - 39,4)	36,3
	1 ou plus	41,5 [†]	(35,9 - 47,2)	28,4	67,0	(60,6 - 72,7)	63,7
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	98,5	(97,2 - 99,6)	98,9	87,4	(83,3 - 90,9)	88,4
	1 ou plus	1,5**	(0,4 - 2,8)	1,1**	12,6*	(9,1 - 16,7)	11,6
C₁₋₃ AOF_{L 140}							
Toutes les composantes	0	57,6 [†]	(52,0 - 63,2)	71,1	32,3	(26,6 - 38,6)	34,8
	1 ou plus	42,4 [†]	(36,8 - 48,0)	28,9	67,7	(61,4 - 73,4)	65,2
Composante c	0	58,5 [†]	(52,8 - 64,1)	71,7	34,0	(28,3 - 40,5)	36,8
	1 ou plus	41,5 [†]	(35,9 - 47,2)	28,3	66,0	(59,5 - 71,7)	63,2
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	98,5	(97,2 - 99,6)	98,9	87,4	(83,3 - 90,9)	88,4
	1 ou plus	1,5**	(0,4 - 2,8)	1,1**	12,6*	(9,1 - 16,7)	11,6

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 48 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₄₋₆AOF_{L 140}							
Toutes les composantes	0	97,8	(96,3 - 99,1)	97,3	84,5	(80,4 - 88,1)	86,1
	1 ou plus	2,2**	(0,9 - 3,7)	2,7*	15,5	(11,9 - 19,6)	13,9
Composante c	0	99,1	(98,1 - 99,9)	99,0	96,7	(94,5 - 98,5)	96,0
	1 ou plus	0,9**	(0,1 - 1,9)	1,0**	3,3**	(1,5 - 5,5)	4,0
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	98,3	(97,0 - 99,5)	98,3	86,7	(82,6 - 90,4)	89,0
	1 ou plus	1,7**	(0,5 - 3,0)	1,7*	13,3	(9,6 - 17,4)	11,0

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 49 Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 et 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆AOF_{OCM 140}						
Toutes les composantes	1,09	(0,92 - 1,27)	0,99	2,66	(2,41 - 2,94)	2,43
Composante C	0,95	(0,78 - 1,14)	0,85	2,07	(1,86 - 2,29)	1,85
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,01**
Composante O	0,14*	(0,10 - 0,18)	0,14*	0,59	(0,46 - 0,74)	0,57
C₁₋₆AOF_{OCM 144}						
Toutes les composantes	1,42	(1,18 - 1,68)	1,28	3,45	(3,08 - 3,84)	3,14
Composante C	1,22	(0,97 - 1,48)	1,08	2,56	(2,28 - 2,86)	2,29
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,01**
Composante O	0,2	(0,14 - 0,27)	0,20*	0,88	(0,70 - 1,10)	0,84
C₁₋₃AOF_{OCM 140}						
Toutes les composantes	1,07	(0,90 - 1,24)	0,95	2,58	(2,34 - 2,85)	2,34
Composante C	0,93	(0,76 - 1,11)	0,82	1,99	(1,79 - 2,20)	1,76
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,01**
Composante O	0,14*	(0,10 - 0,18)	0,14*	0,59	(0,46 - 0,74)	0,57

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 49 Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 et 144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₃AOF_{OCM 144}						
Toutes les composantes	1,39	(1,15 - 1,64)	1,25	3,36	(3,01 - 3,75)	3,05
Composante C	1,19	(0,94 - 1,45)	1,04	2,48	(2,21 - 2,77)	2,2
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,01**
Composante O	0,20	(0,14 - 0,27)	0,20*	0,88	(0,70 - 1,10)	0,84
C₄₋₆AOF_{OCM 140}						
Toutes les composantes	0,20	(0,15 - 0,25)	0,17	0,80	(0,65 - 0,96)	0,74
Composante C	0,03**	(0,01 - 0,05)	0,03*	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,08
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,01**
Composante O	0,17	(0,12 - 0,22)	0,14	0,71	(0,58 - 0,87)	0,65
C₄₋₆AOF_{OCM 144}						
Toutes les composantes	0,25	(0,18 - 0,32)	0,24	1,06	(0,85 - 1,28)	0,99
Composante C	0,03**	(0,02 - 0,06)	0,04*	0,09*	(0,05 - 0,13)	0,09
Composante A	0,00**	(-)	0,00**	0,00+**	(-)	0,01**
Composante O	0,22	(0,15 - 0,28)	0,20	0,97	(0,77 - 1,19)	0,89

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 50 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₁₋₆ AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	52,4	(46,5 - 58,1)	55,0	20,7†	(16,2 - 25,7)	28,3
	1 ou plus	47,6	(41,9 - 53,5)	45,0	79,3†	(74,3 - 83,8)	71,7
Composante c	0	55,7	(49,9 - 61,4)	59,3	27,4†	(22,3 - 32,9)	37,9
	1 ou plus	44,3	(38,6 - 50,1)	40,7	72,6†	(67,1 - 77,7)	62,1
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	91,0	(88,0 - 93,8)	92,8	73,0	(67,8 - 77,6)	73,2
	1 ou plus	9,0*	(6,2 - 12,0)	7,2	27,0	(22,4 - 32,2)	26,8
C₁₋₃ AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	52,9	(47,3 - 58,7)	55,3	21,1†	(16,5 - 26,0)	28,7
	1 ou plus	47,1	(41,3 - 52,7)	44,7	78,9†	(74,0 - 83,5)	71,3
Composante c	0	56,4	(50,7 - 61,9)	59,9	28,0†	(22,9 - 33,8)	38,9
	1 ou plus	43,6	(38,1 - 49,3)	40,1	72,0†	(66,2 - 77,1)	61,1
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	91,0	(88,0 - 93,8)	92,8	73,0	(67,8 - 77,6)	73,2
	1 ou plus	9,0*	(6,2 - 12,0)	7,2	27,0	(22,4 - 32,2)	26,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 50 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
C₄₋₆AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	88,2	(85,2 - 91,2)	90,9	66,5	(61,6 - 71,1)	69,0
	1 ou plus	11,8	(8,8 - 14,8)	9,1	33,5	(28,9 - 38,4)	31,0
Composante c	0	97,6	(96,0 - 98,8)	97,6	94,0	(91,6 - 96,3)	95,0
	1 ou plus	2,4**	(1,2 - 4,0)	2,4*	6,0*	(3,7 - 8,4)	5,0
Composante a	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6**
Composante o	0	89,9	(86,9 - 92,7)	93,0	69,6	(64,9 - 74,1)	71,8
	1 ou plus	10,1	(7,3 - 13,1)	7,0	30,4	(25,9 - 35,1)	28,2

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 51 Proportion des incisives, canines et prémolaires, premières molaires et deuxièmes molaires cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie parmi les différents types de dents permanentes des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1 à 6						
Incisives et canines	2,7*	(1,6 - 3,9)	4,2**	10,6	(9,2 - 11,9)	9,7
Premières molaires	47,0†	(42,4 - 51,9)	40,3	69,5†	(65,8 - 73,2)	59,5
Deuxièmes molaires				32,7	(27,3 - 39,1)	44,1
Stade 1 à 3						
Incisives et canines	2,6*	(1,5 - 3,8)	4,2**	10,4	(9,1 - 11,8)	9,6
Premières molaires	45,6	(41,0 - 50,6)	39,3	67,2†	(63,6 - 70,7)	57,2
Deuxièmes molaires				31,1†	(25,9 - 37,2)	42,8
Stade 4 à 6						
Incisives et canines	0,1**	(0,0 - 0,2)	0,1**	0,5*	(0,3 - 0,8)	0,5
Premières molaires	6,2	(4,8 - 7,7)	5,6	19,5	(16,2 - 23,0)	19,2
Deuxièmes molaires				3,8*	(2,2 - 5,7)	3,7

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 52 Proportion des incisives, canines et prémolaires, premières molaires et deuxièmes molaires parmi les dents permanentes cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1 à 6						
Incisives et canines	8,7*	(5,2 - 12,6)	14,2*	34,9	(32,2 - 37,3)	33,9
Premières molaires	91,3	(87,4 - 94,8)	85,8	52,1	(49,3 - 55,2)	48,4
Deuxièmes molaires				12,9†	(10,8 - 15,2)	17,7
Stade 1 à 3						
Incisives et canines	8,8*	(5,2 - 12,8)	14,5*	35,5	(32,7 - 37,9)	34,5
Premières molaires	91,2	(87,2 - 94,8)	85,5	51,9	(49,0 - 55,1)	47,9
Deuxièmes molaires				12,6†	(10,6 - 14,9)	17,6
Stade 4 à 6						
Incisives et canines	2,0**	(0,0 - 5,0)	2,8**	9,7	(5,7 - 13,5)	9,5
Premières molaires	98,0	(95,0 - 100,0)	97,2	82,0	(76,9 - 86,9)	82,6
Deuxièmes molaires				8,4*	(5,0 - 12,2)	7,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 53 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6	0	11,9	(8,9 - 15,1)	20,0	p=0,0010
	1 à 2	18,5	(14,2 - 22,7)	24,5	
	3 ou plus	69,6	(64,9 - 74,6)	55,5	
Stade 1 à 3	0	12,3	(9,3 - 15,4)	20,2	p=0,0013
	1 à 2	18,4	(14,1 - 22,7)	24,6	
	3 ou plus	69,3	(64,5 - 74,4)	55,2	
Stade 4 à 6	0	63,4	(58,0 - 68,5)	65,3	p=0,7831
	1 à 2	18,7	(14,3 - 23,3)	18,0	
	3 ou plus	17,9	(13,7 - 22,3)	16,7	

Note : Dans le cas d'un indicateur en répartition à plus de 2 modalités, seuls les tests globaux d'indépendance du khi-deux sont effectués.
 Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 54 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6	0	31,8	(26,1 - 38,1)	34,4	p=0,6740
	1 à 4	41,6	(36,7 - 46,3)	40,8	
	5 ou plus	26,6	(21,7 - 31,8)	24,8	
Stade 1 à 3	0	32,3	(26,6 - 38,6)	34,8	p=0,6395
	1 à 4	41,2	(36,1 - 46,0)	41,1	
	5 ou plus	26,5	(21,5 - 31,7)	24,2	
Stade 4 à 6	0				
	1 à 4				
	5 ou plus				

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 55 Répartition (trois catégories) des élèves de 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentition permanente (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6	0	20,7	(16,2 - 25,7)	28,3	p=0,0411
	1 à 2	31,7	(26,2 - 37,0)	29,8	
	3 ou plus	47,6	(42,0 - 53,7)	41,9	
Stade 1 à 3	0	21,1	(16,5 - 26,0)	28,7	p=0,0418
	1 à 2	32,7	(27,6 - 37,8)	30,5	
	3 ou plus	46,3	(40,7 - 52,2)	40,7	
Stade 4 à 6	0	66,5	(61,6 - 71,1)	69,0	p=0,4897
	1 à 2	21,1	(17,1 - 25,3)	18,4	
	3 ou plus	12,4*	(8,9 - 16,4)	12,6	

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.
 Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 56 Répartition (trois catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	63,0	(56,3 - 69,7)	58,6	38,7	(32,3 - 45,4)	43,1
	1 ou plus	37,0	(30,3 - 43,7)	41,4	61,3	(54,6 - 67,7)	56,9
Stade 2	0	65,3†	(60,4 - 70,3)	74,8	36,3†	(30,0 - 42,6)	56,4
	1 ou plus	34,7†	(29,7 - 39,6)	25,2	63,7†	(57,4 - 70,0)	43,6
Stade 3	0	91,7	(88,8 - 94,3)	93,0	77,8†	(73,4 - 82,4)	89,7
	1 ou plus	8,3*	(5,7 - 11,2)	7,0	22,2†	(17,6 - 26,6)	10,3
Stade 4	0	99,1	(98,1 - 99,9)	98,4	97,1	(95,2 - 98,7)	95,8
	1 ou plus	0,9**	(0,1 - 1,9)	1,6**	2,9**	(1,3 - 4,8)	4,2
Stade 5	0	97,2	(95,6 - 98,7)	98,1	95,8	(93,4 - 97,9)	97,5
	1 ou plus	2,8**	(1,3 - 4,4)	1,9**	4,2**	(2,1 - 6,6)	2,5
Stade 6	0	n.p.	n.p.	99,7	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	0,3**	n.p.	n.p.	0,6**

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 57 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	90,6 [†]	(86,7 - 94,0)	83,6	78,0 [†]	(71,7 - 84,2)	67,0
	1 ou plus	9,4 ^{†*}	(6,0 - 13,3)	16,4	22,0 [†]	(15,8 - 28,3)	33,0
Stade 2	0	63,9 [†]	(58,6 - 69,3)	78,9	39,6 [†]	(33,4 - 46,6)	51,2
	1 ou plus	36,1 [†]	(30,7 - 41,4)	21,1	60,4 [†]	(53,4 - 66,6)	48,8
Stade 3	0	99,4	(98,8 - 100,0)	99,3	90,0 [†]	(85,7 - 93,8)	94,6
	1 ou plus	0,6 ^{**}	(0,0 - 1,2)	0,7 ^{**}	10,0 ^{†*}	(6,2 - 14,3)	5,4 [*]
Stade 4	0	n.p.	n.p.	99,3	n.p.	n.p.	98,1
	1 ou plus	n.p.	n.p.	0,7 ^{**}	n.p.	n.p.	1,9 [*]
Stade 5	0	n.p.	n.p.	99,7	96,9	(94,7 - 98,7)	97,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	0,3 ^{**}	3,1 ^{**}	(1,3 - 5,3)	2,6 [*]
Stade 6	0	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	99,4
	1 ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0,6 [*]

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 58 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des molaires en dentition permanente (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires permanentes présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	72,0	(65,7 - 78,2)	70,2	58,1	(51,1 - 64,9)	57,4
	1 ou plus	28,0	(21,8 - 34,3)	29,8	41,9	(35,1 - 48,9)	42,6
Stade 2	0	76,9†	(73,0 - 80,8)	82,4	49,1†	(42,8 - 55,4)	65,7
	1 ou plus	23,1†	(19,2 - 27,0)	17,6	50,9†	(44,6 - 57,2)	34,3
Stade 3	0	93,4	(91,0 - 95,7)	95,9	82,8†	(79,1 - 86,8)	92,8
	1 ou plus	6,6*	(4,3 - 9,0)	4,1*	17,2†	(13,2 - 20,9)	7,2
Stade 4	0	99,1	(98,0 - 99,9)	98,5	97,4	(95,7 - 99,0)	96,6
	1 ou plus	0,9**	(0,1 - 2,0)	1,5**	2,6**	(1,0 - 4,3)	3,4
Stade 5	0	98,6	(97,5 - 99,6)	98,7	97,3	(95,3 - 98,9)	98,4
	1 ou plus	1,4**	(0,4 - 2,5)	1,3**	2,7**	(1,1 - 4,7)	1,6
Stade 6	0	n.p.	n.p.	99,9	n.p.	n.p.	99,5
	1 ou plus	n.p.	n.p.	0,1**	n.p.	n.p.	0,5**

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Distribution de la carie selon le type de dents et de faces (dentitions temporaire et permanente combinées)

Tableau 59 Nombre moyen de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
$c_{1-6}aof_{P\&F\ 88} + C_{1-6}AOF_{P\&F\ 140}$						
Toutes les composantes	5,70 [†]	(5,20 - 6,24)	4,72	5,93	(5,42 - 6,48)	5,33
Composante c+C	3,38 [†]	(2,94 - 3,86)	2,77	4,65 [†]	(4,17 - 5,17)	3,91
Composante a+A	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,00**	(0,00 - 0,01)	0,03**
Composante o+O	2,23 [†]	(1,97 - 2,50)	1,89	1,28	(1,04 - 1,54)	1,39
$c_{1-3}aof_{P\&F\ 88} + C_{1-3}AOF_{P\&F\ 140}$						
Toutes les composantes	5,38 [†]	(4,89 - 5,92)	4,41	5,74	(5,21 - 6,30)	5,16
Composante c+C	3,07 [†]	(2,64 - 3,52)	2,46	4,46 [†]	(3,96 - 5,00)	3,74
Composante a+A	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,00**	(0,00 - 0,01)	0,03**
Composante o+O	2,23 [†]	(1,97 - 2,50)	1,89	1,28	(1,04 - 1,54)	1,39
$c_{4-6}aof_{P\&F\ 88} + C_{4-6}AOF_{P\&F\ 140}$						
Toutes les composantes	2,90 [†]	(2,63 - 3,18)	2,45	1,67	(1,41 - 1,94)	1,74
Composante c+C	0,32	(0,25 - 0,39)	0,29	0,19*	(0,14 - 0,25)	0,17
Composante a+A	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,00**	(0,00 - 0,01)	0,03**
Composante o+O	2,50 [†]	(2,23 - 2,77)	2,11	1,47	(1,22 - 1,76)	1,54

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 60 Nombre moyen de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆aof_{L 88} + C₁₋₆AOF_{L 140}						
Toutes les composantes	7,52†	(6,75 - 8,34)	6,02	5,08	(4,33 - 5,85)	5,03
Composante c+C	3,98	(3,45 - 4,54)	3,84	4,31	(3,64 - 4,99)	4,09
Composante a+A	0,36*	(0,22 - 0,53)	0,25**	0,02**	(0,00 - 0,05)	0,07**
Composante o+O	3,18†	(2,71 - 3,75)	1,93	0,75	(0,57 - 0,96)	0,87
C₁₋₃aof_{L 88} + C₁₋₃AOF_{L 140}						
Toutes les composantes	7,03†	(6,28 - 7,86)	5,48	4,86	(4,14 - 5,61)	4,83
Composante c+C	3,49	(3,00 - 4,04)	3,30	4,09	(3,44 - 4,76)	3,89
Composante a+A	0,36*	(0,22 - 0,53)	0,25**	0,02**	(0,00 - 0,05)	0,07**
Composante o+O	3,18†	(2,71 - 3,75)	1,93	0,75	(0,57 - 0,96)	0,87
C₄₋₆aof_{L 88} + C₄₋₆AOF_{L 140}						
Toutes les composantes	4,18†	(3,62 - 4,84)	3,10	1,11	(0,89 - 1,37)	1,20
Composante c+C	0,49	(0,36 - 0,65)	0,51	0,22*	(0,14 - 0,31)	0,22
Composante a+A	0,36*	(0,22 - 0,53)	0,25**	0,02**	(0,00 - 0,05)	0,07**
Composante o+O	3,33†	(2,85 - 3,91)	2,39	0,87	(0,68 - 1,10)	0,92

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 61 Nombre moyen de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆aof_{OCM 88} + C₁₋₆AOF_{OCM 140}						
Toutes les composantes	4,68†	(4,32 - 5,04)	3,86	3,40	(3,11 - 3,70)	3,23
Composante c+C	2,44†	(2,16 - 2,74)	2,00	2,41	(2,19 - 2,64)	2,13
Composante a+A	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,00**	(0,00 - 0,01)	0,02**
Composante o+O	2,15†	(1,91 - 2,40)	1,80	0,98	(0,80 - 1,19)	1,08
C₁₋₃aof_{OCM 88} + C₁₋₃AOF_{OCM 140}						
Toutes les composantes	4,39†	(4,04 - 4,75)	3,57	3,23	(2,94 - 3,54)	3,09
Composante c+C	2,16†	(1,89 - 2,43)	1,70	2,25	(2,03 - 2,48)	2,00
Composante a+A	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,00**	(0,00 - 0,01)	0,02**
Composante o+O	2,15†	(1,91 - 2,40)	1,80	0,98	(0,80 - 1,19)	1,08
C₄₋₆aof_{OCM 88} + C₄₋₆AOF_{OCM 140}						
Toutes les composantes	2,78†	(2,51 - 3,05)	2,35	1,32	(1,11 - 1,55)	1,35
Composante c+C	0,28	(0,22 - 0,36)	0,28	0,17*	(0,11 - 0,22)	0,14
Composante a+A	0,08*	(0,05 - 0,12)	0,06**	0,00**	(0,00 - 0,01)	0,02**
Composante o+O	2,42†	(2,15 - 2,68)	2,02	1,15	(0,96 - 1,38)	1,20

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 62 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
C₁₋₆aof_{OCM 88} + C₁₋₆AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	13,5	(9,8 - 17,2)	16,0	9,0†	(6,4 - 11,7)	14,6
	1 ou plus	86,5	(82,8 - 90,2)	84,0	91,0†	(88,3 - 93,6)	85,4
Composante c+C	0	22,5†	(18,0 - 26,9)	28,4	13,4†	(10,0 - 16,8)	22,6
	1 ou plus	77,5†	(73,1 - 82,0)	71,6	86,6†	(83,2 - 90,0)	77,4
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	50,9	(46,4 - 55,5)	52,2	60,8	(54,8 - 66,3)	58,8
	1 ou plus	49,1	(44,5 - 53,6)	47,8	39,2	(33,7 - 45,2)	41,2
C₁₋₃aof_{OCM 88} + C₁₋₃AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	14,3	(10,6 - 17,9)	16,8	9,1†	(6,5 - 11,9)	15,3
	1 ou plus	85,7	(82,1 - 89,4)	83,2	90,9†	(88,1 - 93,5)	84,7
Composante c+C	0	24,5	(19,9 - 29,3)	30,0	13,8†	(10,3 - 17,2)	24,1
	1 ou plus	75,5	(70,7 - 80,1)	70,0	86,2†	(82,8 - 89,7)	75,9
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	50,9	(46,4 - 55,5)	52,2	60,8	(54,8 - 66,3)	58,8
	1 ou plus	49,1	(44,5 - 53,6)	47,8	39,2	(33,7 - 45,2)	41,2

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 62 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₄₋₆aof_{OCM 88} + C₄₋₆AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	41,5†	(37,3 - 45,7)	46,6	52,6	(47,0 - 58,1)	51,5
	1 ou plus	58,5†	(54,3 - 62,7)	53,4	47,4	(41,9 - 53,0)	48,5
Composante c+C	0	81,7†	(77,9 - 85,5)	86,0	88,2	(84,7 - 91,5)	89,7
	1 ou plus	18,3†	(14,5 - 22,1)	14,0	11,8	(8,5 - 15,3)	10,3
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	48,7	(44,3 - 53,1)	51,2	58,1	(52,1 - 63,8)	55,5
	1 ou plus	51,3	(46,9 - 55,7)	48,8	41,9	(36,2 - 47,9)	44,5

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 63 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₆aof_{L88} + C₁₋₆AOFL₁₄₀							
Toutes les composantes	0	18,1†	(13,9 - 22,3)	32,0	24,7	(19,8 - 30,0)	24,4
	1 ou plus	81,9†	(77,7 - 86,1)	68,0	75,3	(70,0 - 80,2)	75,6
Composante c+C	0	25,5†	(20,6 - 30,7)	39,0	26,8	(21,7 - 32,4)	28,8
	1 ou plus	74,5†	(69,3 - 79,4)	61,0	73,2	(67,6 - 78,3)	71,2
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	55,6	(51,1 - 60,0)	60,0	73,8	(68,6 - 78,6)	74,2
	1 ou plus	44,4	(40,0 - 48,9)	40,0	26,2	(21,4 - 31,4)	25,8
c₁₋₃aof_{L88} + C₁₋₃AOFL₁₄₀							
Toutes les composantes	0	18,7†	(14,5 - 23,2)	33,0	26,1	(21,0 - 31,5)	25,5
	1 ou plus	81,3†	(76,8 - 85,5)	67,0	73,9	(68,5 - 79,0)	74,5
Composante c+C	0	26,9†	(22,0 - 32,2)	40,5	28,5	(23,3 - 34,2)	30,1
	1 ou plus	73,1†	(67,8 - 78,0)	59,5	71,5	(65,8 - 76,7)	69,9
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	55,6	(51,1 - 60,0)	60,0	73,8	(68,6 - 78,6)	74,2
	1 ou plus	44,4	(40,0 - 48,9)	40,0	26,2	(21,4 - 31,4)	25,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 63 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₄₋₆aof_{L 88} + C₄₋₆AOF_{L 140}							
Toutes les composantes	0	46,6†	(42,1 - 50,9)	53,0	68,0	(63,1 - 72,6)	68,4
	1 ou plus	53,4†	(49,1 - 57,9)	47,0	32,0	(27,4 - 36,9)	31,6
Composante c+C	0	82,5	(78,8 - 86,1)	83,4	90,1	(87,0 - 93,1)	90,8
	1 ou plus	17,5	(13,9 - 21,2)	16,6	9,9	(6,9 - 13,0)	9,2
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	55,0	(50,6 - 59,4)	58,9	72,9	(67,7 - 77,5)	72,3
	1 ou plus	45,0	(40,6 - 49,4)	41,1	27,1	(22,5 - 32,3)	27,7

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 64 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₁₋₆aof_{OCM 88} + C₁₋₆AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	17,2	(13,0 - 21,1)	20,5	14,6	(11,1 - 18,6)	20,0
	1 ou plus	82,8	(78,9 - 87,0)	79,5	85,4	(81,4 - 88,9)	80,0
Composante c+C	0	29,4	(24,3 - 34,5)	36,7	22,0†	(17,5 - 27,0)	32,5
	1 ou plus	70,6	(65,5 - 75,7)	63,3	78,0†	(73,0 - 82,5)	67,5
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	51,1	(46,7 - 55,6)	53,5	62,5	(56,5 - 67,9)	60,9
	1 ou plus	48,9	(44,4 - 53,3)	46,5	37,5	(32,1 - 43,5)	39,1
c₁₋₃aof_{OCM 88} + C₁₋₃AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	18,5	(14,3 - 22,4)	21,4	15,0	(11,4 - 18,9)	21,0
	1 ou plus	81,5	(77,6 - 85,7)	78,6	85,0	(81,1 - 88,6)	79,0
Composante c+C	0	32,6	(27,4 - 37,9)	38,9	23,2†	(18,4 - 28,2)	34,4
	1 ou plus	67,4	(62,5 - 72,5)	61,1	76,8†	(71,8 - 81,6)	65,6
Composante a+A	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	51,1	(46,7 - 55,6)	53,5	62,5	(56,5 - 67,9)	60,9
	1 ou plus	48,9	(44,4 - 53,3)	46,5	37,5	(32,1 - 43,5)	39,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 64 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Expérience de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
c₄₋₆aof_{OCM 88} + C₄₋₆AOF_{OCM 140}							
Toutes les composantes	0	42,4†	(37,9 - 46,8)	47,6	55,2	(49,7 - 60,7)	54,0
	1 ou plus	57,6†	(53,2 - 62,1)	52,4	44,8	(39,3 - 50,3)	46,0
Composante c+C	0	94,3	(92,0 - 96,4)	96,1	89,4	(86,0 - 92,6)	91,1
	1 ou plus	5,7*	(3,6 - 8,0)	3,9*	10,6*	(7,4 - 14,0)	8,9
Composante a+A	0	82,7	(78,9 - 86,5)	86,4	n.p.	n.p.	98,9
	1 ou plus	17,3	(13,5 - 21,1)	13,6	n.p.	n.p.	1,1**
Composante o+O	0	48,9	(44,5 - 53,2)	52,1	93,0	(90,4 - 96,2)	90,6
	1 ou plus	51,1	(46,8 - 55,5)	47,9	7,0*	(3,8 - 9,6)	9,40

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 65 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Stade 1 à 6								
	0	13,5	(9,8 - 17,2)	16,0	0	9,0	(6,4 - 11,7)	14,6
	1 à 4	32,7	(27,2 - 38,2)	39,3	1 à 4	35,5	(30,3 - 40,6)	37,6
	5 ou plus	53,8	(48,8 - 59,2)	44,7	5 à 9	35,4	(30,6 - 39,8)	28,9
					10 ou plus	20,1	(15,9 - 24,7)	18,8
Stade 1 à 3								
	0	14,3	(10,6 - 17,9)	16,8	0	9,1	(6,5 - 11,9)	15,3
	1 à 4	34,3	(28,7 - 39,7)	40,8	1 à 4	37,3	(31,8 - 42,7)	37,8
	5 ou plus	51,4	(46,2 - 57,0)	42,4	5 à 9	35,4	(30,6 - 40,3)	29,2
					10 ou plus	18,1	(13,6 - 22,9)	17,7
Stade 4 à 6								
	0	41,5	(37,3 - 45,7)	46,6	0	52,6	(47,0 - 58,1)	51,5
	1 à 4	27,5	(22,8 - 32,3)	29,7	1 à 2	19,7	(15,6 - 24,1)	22,2
	5 ou plus	31,0	(26,7 - 35,6)	31,0	3 ou plus	27,8	(23,0 - 32,7)	26,3

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 66 Répartition (trois ou quatre catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			p	6 ^e année			p
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	
Stade 1 à 6					p<0,0001				p=0,6549
	0	18,1	(13,9 - 22,3)	32,0		24,7	(19,8 - 30,0)	24,4	
	1 à 4	33,1	(28,6 - 37,8)	31,3		37,6	(32,1 - 43,4)	39,7	
	5 à 9	20,8	(16,8 - 25,0)	16,1		19,3	(14,5 - 24,5)	20,6	
	10 ou plus	28,0	(24,2 - 32,1)	20,6		18,4	(13,8 - 23,0)	15,2	
Stade 1 à 3					p<0,0001				p=0,6244
	0	18,7	(14,5 - 23,2)	33,0		26,1	(21,0 - 31,5)	25,5	
	1 à 4	34,5	(29,8 - 39,4)	32,0		36,5	(31,0 - 42,1)	39,7	
	5 à 9	21,8	(17,7 - 26,3)	17,0		20,0	(15,1 - 25,2)	20,4	
	10 ou plus	24,9	(21,2 - 28,9)	18,0		17,4	(13,0 - 22,1)	14,4	
Stade 4 à 6					p=0,0709				p=0,9820
	0	46,6	(42,1 - 50,9)	53,0		0	(63,1 - 72,6)	68,4	
	1 à 4	25,1	(21,1 - 29,5)	22,6		1 à 4	(19,1 - 27,6)	23,2	
	5 à 9	14,8	(12,0 - 17,8)	14,6		5 ou plus	(6,0 - 11,5)	8,4	
	10 ou plus	13,4	(10,6 - 16,4)	9,8					

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 67 Répartition (trois catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1 à 6, 1 à 3 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie des molaires en dentitions combinées (140 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			p	6 ^e année			p	
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		Reste du Québec (%)
Stade 1 à 6	0	17,2	(13,0 - 21,1)	20,5	p=0,0018				p=0,0921	
	1 à 4	34,5	(29,2 - 39,5)	41,9			14,6	(11,1 - 18,6)		20,0
	5 ou plus	48,4	(43,6 - 53,4)	37,6			55,5	(50,1 - 61,0)		49,5
Stade 1 à 3	0	18,5	(14,3 - 22,4)	21,4	p=0,0019				p=0,0465	
	1 à 4	36,6	(31,5 - 41,4)	44,2			29,8	(24,4 - 35,4)		30,4
	5 ou plus	44,9	(40,2 - 49,8)	34,5			15,0	(11,4 - 18,9)		21,0
Stade 4 à 6	0	42,4	(37,9 - 46,8)	47,6	p=0,0155	0	55,2	(49,7 - 60,7)	54,0	p=0,8599
	1 à 4	27,5	(22,9 - 32,2)	29,4		1 à 2	23,5	(19,2 - 28,0)	23,4	
	5 ou plus	30,1	(25,9 - 34,6)	23,0		3 ou plus	21,3	(16,8 - 25,8)	22,6	

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 68 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces avec puits et fissures cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5 et 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face avec puits et fissures présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	49,0	(42,1 - 56,1)	47,4	36,8	(30,0 - 43,6)	41,3
	1 ou plus	51,0	(43,9 - 57,9)	52,6	63,2	(56,4 - 70,0)	58,7
Stade 2	0	49,9†	(44,3 - 55,5)	64,4	34,2†	(28,2 - 40,3)	54,4
	1 ou plus	50,1†	(44,5 - 55,7)	35,6	65,8†	(59,7 - 71,8)	45,6
Stade 3	0	83,2†	(79,1 - 86,9)	90,5	74,7†	(69,7 - 79,9)	89,0
	1 ou plus	16,8†	(13,1 - 20,9)	9,5	25,3	(20,1 - 30,3)	11,0
Stade 4	0	95,1	(92,4 - 97,3)	91,7	96,1	(94,1 - 98,0)	94,1
	1 ou plus	4,9**	(2,7 - 7,6)	8,3	3,9**	(2,0 - 5,9)	5,9
Stade 5	0	84,7†	(81,3 - 88,1)	92,1	91,9†	(89,0 - 94,8)	95,2
	1 ou plus	15,3†	(11,9 - 18,7)	7,9	8,1†*	(5,2 - 11,0)	4,8
Stade 6	0	98,2	(97,0 - 99,3)	98,1	98,8	(97,5 - 99,9)	99,0
	1 ou plus	1,8**	(0,7 - 3,0)	1,9*	1,2**	(0,1 - 2,5)	1,0*

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 69 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces lisses cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5, et 6 en dentitions combinées (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face lisse présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	73,4†	(67,5 - 79,1)	64,8	73,5†	(66,9 - 80,1)	63,7
	1 ou plus	26,6†	(20,9 - 32,5)	35,2	26,5†	(19,9 - 33,1)	36,3
Stade 2	0	38,4†	(32,6 - 44,0)	58,6	35,9†	(29,3 - 42,5)	44,5
	1 ou plus	61,6†	(56,0 - 67,4)	41,4	64,1†	(57,5 - 70,7)	55,5
Stade 3	0	88,6	(84,9 - 91,8)	89,2	85,6†	(80,9 - 89,8)	92,5
	1 ou plus	11,4*	(8,2 - 15,1)	10,8	14,4†	(10,2 - 19,1)	7,5
Stade 4	0	95,4†	(93,1 - 97,5)	89,0	97,6†	(95,9 - 99,0)	95,8
	1 ou plus	4,6†*	(2,5 - 6,9)	11,0	2,4†**	(1,0 - 4,1)	4,2
Stade 5	0	85,6†	(82,4 - 88,7)	91,5	92,2	(89,4 - 95,1)	95,0
	1 ou plus	14,4†	(11,3 - 17,6)	8,5	7,8*	(4,9 - 10,6)	5,0
Stade 6	0	95,6	(93,6 - 97,4)	93,7	97,9	(96,3 - 99,4)	97,0
	1 ou plus	4,4*	(2,6 - 6,4)	6,3	2,1**	(0,6 - 3,7)	3,0

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 70 Répartition (deux catégories) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales cariées aux stades de carie 1, 2, 3, 4, 5, et 6 des molaires en dentitions combinées (144 faces) parmi ceux ayant au moins une face occlusale des molaires présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Stade 1	0	55,9	(49,0 - 63,1)	54,7	54,1	(47,0 - 61,2)	54,3
	1 ou plus	44,1	(36,9 - 51,0)	45,3	45,9	(38,8 - 53,0)	45,7
Stade 2	0	58,0†	(52,4 - 63,5)	69,8	45,9†	(39,8 - 52,2)	62,8
	1 ou plus	42,0†	(36,5 - 47,6)	30,2	54,1	(47,8 - 60,2)	37,2
Stade 3	0	85,0†	(81,1 - 88,5)	93,1	79,4†	(74,9 - 84,2)	92,1
	1 ou plus	15,0†	(11,5 - 18,9)	6,9	20,6†	(15,8 - 25,1)	7,9
Stade 4	0	95,1	(92,4 - 97,3)	91,8	96,5	(94,5 - 98,2)	94,9
	1 ou plus	4,9**	(2,7 - 7,6)	8,2	3,5**	(1,8 - 5,5)	5,1
Stade 5	0	85,9†	(82,5 - 89,3)	92,6	93,1†	(90,2 - 95,8)	96,1
	1 ou plus	14,1†	(10,7 - 17,5)	7,4	6,9†*	(4,2 - 9,8)	3,9
Stade 6	0	98,7	(97,8 - 99,6)	98,3	n.p.	n.p.	99,1
	1 ou plus	1,3**	(97,7 - 98,9)	1,7*	n.p.	n.p.	0,9*

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Caractéristiques associées à l'expérience de la carie

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	4,59†	(4,32 - 4,88)	3,70	1,97	(1,65 - 2,29)	1,82
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	4,71	(4,29 - 5,12)				
Féminin	4,47	(4,14 - 4,85)				
Groupe d'âge de la mère			p<0,05			
Moins de 35 ans	5,31†	(4,76 - 5,86)				
35 ans et plus	4,31	(3,98 - 4,64)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			
Au moins le français	4,39	(3,97 - 4,85)	a			
Au moins l'anglais, mais pas le français	4,20	(3,56 - 4,88)	b			
Ni le français, ni l'anglais	5,71	(4,99 - 6,44)	ab			
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	5,00	(4,40 - 5,65)		
2 enfants	4,25	(3,75 - 4,78)		
3 enfants	4,93	(4,42 - 5,49)		
4 enfants ou plus	5,24	(4,08 - 6,29)		
Non-réponse partielle ¹			3,1 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	5,18	(3,87 - 6,58)		
Diplôme d'études secondaires	5,12	(4,31 - 5,98)		
Diplôme d'études postsecondaires	4,43	(4,12 - 4,75)		
Non-réponse partielle ¹			4,5 %	
Plus haut niveau de scolarité entre les parents				
Pas de diplôme d'études secondaires	5,44*	(3,75 - 7,38)		
Diplôme d'études secondaires	5,56	(4,44 - 6,67)		
Diplôme d'études postsecondaires	4,45	(4,16 - 4,77)		
Non-réponse partielle ¹			3,5 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	3,83	(3,31 - 4,33) a		
Deux parents immigrants récents	4,74	(3,78 - 5,77)		
Autres combinaisons	5,11	(4,68 - 5,55) a		
Non-réponse partielle ¹				5,4 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	4,18	(3,65 - 4,71) a		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,66	(4,14 - 5,18) b		
Quartile 4 (défavorisé)	5,61	(5,00 - 6,22) ab		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	3,48	(2,82 - 4,16)	ab	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	5,03	(4,53 - 5,53)	a	
Quartile 4 (défavorisé)	5,09	(4,47 - 5,68)	b	
Non-réponse partielle ¹				9,9 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	3,87	(3,33 - 4,40)	ab	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,75	(4,13 - 5,38)	ac	
Quartile 4 (défavorisé)	5,53	(5,06 - 6,02)	bc	
Non-réponse partielle ¹				9,9 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p<0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	4,14	(3,60 - 4,67)	a	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	4,08	(3,63 - 4,54)	b	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	5,23	(4,80 - 5,69)	ab	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	4,39	(4,08 - 4,73) a		
Au moins un parent	5,68	(4,84 - 6,59) a		
Non-réponse partielle ¹				5,2 %
Assurance dentaire privée				
Oui	4,23	(3,82 - 4,68)		
Non	4,86	(4,41 - 5,31)		
Non-réponse partielle ¹				7,4 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	5,27	(4,80 - 5,77) ab		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	4,27	(3,71 - 4,90) a		
75 000 \$ et plus	3,60	(2,92 - 4,40) b		
Non-réponse partielle ¹				10,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation des débris				
Faible	2,27*	(1,42 - 3,07) ab		
Moyen	4,41	(4,07 - 4,74) ac		
Élevé	5,84	(5,31 - 6,41) bc		
Non-réponse partielle ¹				0,2 %
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	5,11	(4,45 - 5,78)		
Une fois par jour et moins	4,38	(4,05 - 4,70)		
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	4,85	(4,19 - 5,50)		
Non	4,46	(4,11 - 4,81)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 71 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins	4,34	(3,99 - 4,70)		
Plus d'une fois par jour	5,42	(4,29 - 5,56)		
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui	5,58	(4,19 - 6,97)		
Non	4,98	(4,48 - 5,48)		
Visite chez le dentiste				p>0,05
Un an et moins	4,65	(4,29 - 5,01)		
Plus d'un an	4,17	(3,31 - 5,03)		

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	4,19 [†]	(3,93 - 4,47)	3,28	1,72	(1,43 - 2,04)	1,65
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	4,28	(3,88 - 4,66)				
Féminin	4,11	(3,75 - 4,49)				
Groupe d'âge de la mère			p<0,05			
Moins de 35 ans	4,72 [†]	(4,17 - 5,27)				
35 ans et plus	3,96	(3,66 - 4,27)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			
Au moins le français	4,03	(3,64 - 4,44)	a			
Au moins l'anglais, mais pas le français	3,95	(3,33 - 4,62)	b			
Ni le français, ni l'anglais	5,06	(4,44 - 5,73)	ab			
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	4,62	(4,08 - 5,21)		
2 enfants	3,98	(3,52 - 4,49)		
3 enfants	4,44	(3,91 - 4,99)		
4 enfants ou plus	4,27	(3,29 - 5,26)		
Non-réponse partielle ¹			3,1 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	4,24	(3,13 - 5,51)		
Diplôme d'études secondaires	4,54	(3,80 - 5,32)		
Diplôme d'études postsecondaires	4,11	(3,82 - 4,42)		
Non-réponse partielle ¹			4,5 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents			p<0,05		
Deux parents non-immigrants	3,61	(3,11 - 4,08)	a		
Deux parents immigrants récents	3,99	(3,15 - 4,87)			
Autres combinaisons	4,69	(4,30 - 5,09)	a		
Non-réponse partielle ¹				5,4 %	
Indice régional de défavorisation sociale			p<0,05		
Quartile 1 (favorisé)	3,84	(3,36 - 4,32)	a		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,26	(3,76 - 4,76)	b		
Quartile 4 (défavorisé)	5,02	(4,49 - 5,63)	ab		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,05		
Quartile 1 (favorisé)	3,32	(2,70 - 3,97)	ab		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,60	(4,10 - 5,10)	a		
Quartile 4 (défavorisé)	4,51	(3,97 - 5,04)	b		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
Quartile 1 (favorisé)	3,63	(3,12 - 4,14)	a		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,38	(3,81 - 4,97)			
Quartile 4 (défavorisé)	4,88	(4,40 - 5,38)	a		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	3,80	(3,31 - 4,33)	a		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	3,94	(3,46 - 4,40)	b		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	4,62	(4,21 - 5,04)	ab		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	4,06	(3,76 - 4,38)		
Au moins un parent	4,80	(4,08 - 5,65)		
Non-réponse partielle ¹				5,2 %
Assurance dentaire privée				
Oui	3,93	(3,55 - 4,36)		
Non	4,34	(3,94 - 4,75)		
Non-réponse partielle ¹				7,4 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	4,63	(4,23 - 5,06) a		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	4,07	(3,53 - 4,67)		
75 000 \$ et plus	3,39	(2,74 - 4,13) a		
Non-réponse partielle ¹				10,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				
Faible	2,11*	(1,33 - 2,83)	ab	
Moyen	4,04	(3,72 - 4,35)	ac	
Élevé	5,29	(4,83 - 5,84)	bc	
Non-réponse partielle ¹				0,2 %
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	4,04	(3,75 - 4,33)		
Une fois par jour et moins	4,58	(3,96 - 5,19)		
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	4,63	(3,98 - 5,29)		
Non	4,04	(3,72 - 4,36)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 72 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	4,04	(3,70 - 4,38)		
Plus d'une fois par jour	4,80	(3,77 - 5,83)		
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	4,72	(3,40 - 6,04)		
Non	4,63	(4,14 - 5,11)		
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	4,32	(3,99 - 4,66)		
Plus d'un an	3,45	(2,76 - 4,14)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	2,78 [†]	(2,52 - 3,05)	2,34	1,17	(0,89 - 1,45)	1,24
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	2,70	(2,33 - 3,08)				
Féminin	2,86	(2,51 - 3,22)				
Groupe d'âge de la mère			p>0,05			
Moins de 35 ans	3,23	(2,65 - 3,80)				
35 ans et plus	2,63	(2,33 - 2,93)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			
Au moins le français	2,44	(2,08 - 2,83)	a			
Au moins l'anglais, mais pas le français	2,65	(2,09 - 3,26)	b			
Ni le français, ni l'anglais	4,03	(3,34 - 4,75)	ab			
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	2,85	(2,22 - 3,52)		
2 enfants	2,66	(2,22 - 3,15)		
3 enfants	3,14	(2,62 - 3,71)		
4 enfants ou plus	3,12*	(2,06 - 4,16)		
Non-réponse partielle ¹				3,1 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	3,50*	(2,32 - 4,88)		
Diplôme d'études secondaires	3,65	(2,87 - 4,38)	a	
Diplôme d'études postsecondaires	2,61	(2,32 - 2,91)	a	
Non-réponse partielle ¹				4,5 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	2,32	(1,88 - 2,76)	a	
Deux parents immigrants récents	2,67*	(1,82 - 3,59)		
Autres combinaisons	3,24	(2,82 - 3,67)	a	
Non-réponse partielle ¹				5,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	3,84	(3,36 - 4,32) a		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,26	(3,76 - 4,76) b		
Quartile 4 (défavorisé)	5,02	(4,49 - 5,63) ab		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	1,94*	(1,36 - 2,58) ab		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	3,09	(2,61 - 3,56) a		
Quartile 4 (défavorisé)	3,27	(2,70 - 3,83) b		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	2,48	(1,97 - 3,02)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	2,76	(2,30 - 3,25)		
Quartile 4 (défavorisé)	3,44	(2,90 - 3,96)		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	2,56	(2,13 - 2,97)	a	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	2,34	(1,86 - 2,79)	b	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	3,21	(2,77 - 3,65)	ab	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale			p>0,05		
Aucun parent	2,71	(2,44 - 3,00)			
Au moins un parent	3,25*	(2,28 - 4,33)			
Non-réponse partielle ¹			5,2 %		
Assurance dentaire privée			p>0,05		
Oui	2,66	(2,28 - 3,08)			
Non	2,98	(2,50 - 3,46)			
Non-réponse partielle ¹			7,4 %		
Revenu le plus élevé des parents			p>0,05		
Moins de 40 000 \$	3,20	(2,66 - 3,77)			
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	2,67	(2,14 - 3,24)			
75 000 \$ et plus	2,15*	(1,52 - 2,99)			
Non-réponse partielle ¹			10,9 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				p<0,05
Faible	0,95**	(0,31 - 1,52)	ab	
Moyen	2,54	(2,21 - 2,87)	ac	
Élevé	4,08	(3,44 - 4,79)	bc	
Non-réponse partielle ¹				0,2 %
Brossage des dents la veille de l'examen				p<0,05
Deux fois par jour	2,50	(2,20 - 2,81)		
Une fois par jour et moins	3,43†	(2,83 - 4,03)		
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				p<0,05
Oui	3,29	(2,73 - 3,86)		
Non	2,58	(2,23 - 2,93)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 73 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	2,62	(2,27 - 2,98)		
Plus d'une fois par jour	3,75*	(2,60 - 4,91)		
			p>0,05	
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	3,72*	(2,53 - 4,90)		
Non	3,09	(2,54 - 3,64)		
			p>0,05	
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	3,01	(2,66 - 3,35)		
Plus d'un an	1,59*	(0,93 - 2,25)		
			p<0,05	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	9,96†	(9,16 - 10,85)	7,62	4,30	(3,52 - 5,11)	3,72
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	9,90	(8,70 - 11,24)				
Féminin	10,02	(8,98 - 11,14)				
Groupe d'âge de la mère			p<0,05			
Moins de 35 ans	11,85	(9,95 - 13,74)				
35 ans et plus	9,17	(8,28 - 10,05)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			
Au moins le français	8,96	(7,82 - 10,27)	a			
Au moins l'anglais, mais pas le français	8,74	(7,04 - 10,58)	b			
Ni le français, ni l'anglais	14,30	(12,18 - 16,76)	ab			
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	11,05	(9,17 - 13,16)		
2 enfants	9,18	(7,69 - 10,74)		
3 enfants	10,98	(9,40 - 12,81)		
4 enfants ou plus	11,24	(8,07 - 14,51)		
Non-réponse partielle ¹				
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	11,88**	(7,92 - 16,70)		
Diplôme d'études secondaires	11,70	(9,37 - 13,99)		
Diplôme d'études postsecondaires	9,46	(8,56 - 10,42)		
Non-réponse partielle ¹				

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Statut d'immigration des parents			p<0,05			
Deux parents non-immigrants	7,60	(6,40 - 8,82)	ab			
Deux parents immigrants récents	11,15	(8,20 - 14,20)	a			
Autres combinaisons	11,36	(10,22 - 12,57)	b			
Non-réponse partielle ¹			5,4 %			
Indice régional de défavorisation sociale			p<0,05			
Quartile 1 (favorisé)	8,82	(7,47 - 10,24)	a			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	10,30	(8,88 - 11,77)				
Quartile 4 (défavorisé)	12,27	(10,12 - 14,67)	a			
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,05		
Quartile 1 (favorisé)	6,88	(5,29 - 8,57)	ab		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	11,26	(9,82 - 12,78)	a		
Quartile 4 (défavorisé)	11,14	(9,43 - 12,99)	b		
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p<0,05		
Quartile 1 (favorisé)	8,13	(6,73 - 9,62)	a		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	10,23	(8,64 - 12,01)	b		
Quartile 4 (défavorisé)	12,50	(10,80 - 14,21)	ab		
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p<0,05		
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	8,40	(7,12 - 9,73)	a		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	8,34	(7,13 - 9,48)	b		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	12,03	(10,56 - 13,65)	ab		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	9,55	(8,62 - 10,55)		
Au moins un parent	11,98	(9,31 - 14,88)		
Non-réponse partielle ¹				5,2 %
Assurance dentaire privée				
Oui	9,03	(7,90 - 10,28) a		
Non	10,89	(9,57 - 12,33) a		
Non-réponse partielle ¹				7,4 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	12,01	(10,44 - 13,78) ab		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	8,46	(7,10 - 10,02) a		
75 000 \$ et plus	7,79	(5,95 - 10,17) b		
Non-réponse partielle ¹				10,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					
Faible	3,50*	(2,03 - 4,93)	ab		
Moyen	9,31	(8,38 - 10,26)	ac		
Élevé	13,90	(12,17 - 15,90)	bc		
Non-réponse partielle ¹				0,2 %	
Brossage des dents la veille de l'examen					
Deux fois par jour	9,23	(8,30 - 10,15)			
Une fois par jour et moins	11,50	(9,67 - 13,33)			
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen					
Oui	11,59	(9,66 - 13,53)			
Non	9,20	(8,22 - 10,17)			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 74 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins	9,28	(8,23 - 10,33)		
Plus d'une fois par jour	12,50	(8,90 - 16,10)		
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui	13,12*	(8,68 - 17,56)		
Non	11,51	(9,93 - 13,09)		
Visite chez le dentiste				p>0,05
Un an et moins	10,27	(9,24 - 11,30)		
Plus d'un an	8,09	(5,75 - 10,44)		

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 75 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	9,23†	(8,45 - 10,10)	6,82	3,82	(3,11 - 4,56)	3,41
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	9,16	(8,01 - 10,42)				
Féminin	9,29	(8,20 - 10,47)				
Groupe d'âge de la mère			p<0,05			
Moins de 35 ans	10,68	(8,85 - 12,50)				
35 ans et plus	8,56	(7,71 - 9,42)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			
Au moins le français	8,30	(7,21 - 9,52)	a			
Au moins l'anglais, mais pas le français	8,29	(6,63 - 10,07)	b			
Ni le français, ni l'anglais	13,09	(11,02 - 15,46)	ab			
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 75 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison			p>0,05		
1 enfant	10,28	(8,49 - 12,25)			
2 enfants	8,72	(7,30 - 10,22)			
3 enfants	10,07	(8,50 - 11,94)			
4 enfants ou plus	9,40*	(6,63 - 12,25)			
Non-réponse partielle ¹			3,1 %		
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p>0,05		
Pas de diplôme d'études secondaires	10,15*	(6,51 - 14,61)			
Diplôme d'études secondaires	10,75	(8,55 - 13,05)			
Diplôme d'études postsecondaires	8,86	(8,01 - 9,79)			
Non-réponse partielle ¹			4,5 %		
Statut d'immigration des parents			p<0,05		
Deux parents non-immigrants	7,25	(6,10 - 8,41)	a		
Deux parents immigrants récents	9,41	(6,84 - 12,03)			
Autres combinaisons	10,63	(9,55 - 11,75)	a		
Non-réponse partielle ¹			5,4 %		
Indice régional de défavorisation sociale			p>0,05		
Quartile 1 (favorisé)	8,22	(6,92 - 9,58)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	9,56	(8,22 - 10,99)			
Quartile 4 (défavorisé)	11,20	(9,24 - 13,69)			
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 75 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,05		
Quartile 1 (favorisé)	6,62	(5,07 - 8,22)	ab		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	10,42	(8,93 - 11,99)	a		
Quartile 4 (défavorisé)	10,11	(8,54 - 11,80)	b		
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p<0,05		
Quartile 1 (favorisé)	7,69	(6,33 - 9,15)	a		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	9,57	(8,01 - 11,33)			
Quartile 4 (défavorisé)	11,25	(9,64 - 12,92)	a		
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p<0,05		
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	7,79	(6,59 - 9,18)	a		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	8,10	(6,93 - 9,25)	b		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	10,91	(9,54 - 12,41)	ab		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 75 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	8,94	(8,05 - 9,92)		
Au moins un parent	10,37	(7,99 - 13,02)		
Non-réponse partielle ¹				5,2 %
Assurance dentaire privée				
Oui	8,50	(7,41 - 9,69)		
Non	9,92	(8,71 - 11,28)		
Non-réponse partielle ¹				7,4 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	10,83	(9,36 - 12,58) ab		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	8,09	(6,77 - 9,59) a		
75 000 \$ et plus	7,42	(5,63 - 9,80) b		
Non-réponse partielle ¹				10,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 75 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris						
Faible	3,24*	(1,91 - 4,49)	ab			p<0,05
Moyen	8,62	(7,70 - 9,59)	ac			
Élevé	12,88	(11,22 - 14,83)	bc			
Non-réponse partielle ¹						0,2 %
Brossage des dents la veille de l'examen						p>0,05
Deux fois par jour	8,58	(7,72 - 9,43)				
Une fois par jour et moins	10,54	(8,79 - 12,29)				
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen						p<0,05
Oui	11,16	(9,25 - 13,07)				
Non	8,44	(7,50 - 9,39)				

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 75 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	8,74	(7,71 - 9,77)		
Plus d'une fois par jour	11,56*	(8,11 - 15,01)		
			p>0,05	
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	11,27*	(7,01 - 15,54)		
Non	10,77	(9,25 - 12,30)		
			p>0,05	
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	9,66	(8,67 - 10,65)		
Plus d'un an	6,88*	(4,78 - 8,98)		
			p<0,05	

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 76 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	6,73†	(5,95 - 7,56)	5,23	2,64	(2,02 - 3,28)	2,69
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	6,53	(5,37 - 7,85)				
Féminin	6,94	(5,85 - 8,06)				
Groupe d'âge de la mère			p>0,05			
Moins de 35 ans	7,69	(5,91 - 9,48)				
35 ans et plus	6,33	(5,49 - 7,17)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			
Au moins le français	5,79	(4,73 - 6,99)	a			
Au moins l'anglais, mais pas le français	5,95	(4,49 - 7,59)	b			
Ni le français, ni l'anglais	10,65	(8,47 - 13,06)	ab			
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 76 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	7,18	(5,29 - 9,23)		
2 enfants	6,43	(5,23 - 7,88)		
3 enfants	7,57	(6,00 - 9,40)		
4 enfants ou plus	7,47*	(4,37 - 10,80)		
Non-réponse partielle ¹			3,1 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	7,99*	(4,94 - 11,90)		
Diplôme d'études secondaires	8,46	(6,40 - 10,55)		
Diplôme d'études postsecondaires	6,38	(5,55 - 7,29)		
Non-réponse partielle ¹			4,5 %	
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	5,07	(4,08 - 6,13) a		
Deux parents immigrants récents	6,92*	(4,39 - 9,59)		
Autres combinaisons	7,98	(6,87 - 9,20) a		
Non-réponse partielle ¹			5,4 %	
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	6,37	(5,12 - 7,76)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	6,89	(5,58 - 8,32)		
Quartile 4 (défavorisé)	8,16*	(5,88 - 10,76)		
Non-réponse partielle ¹			9,9 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 76 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle					
Quartile 1 (favorisé)	4,52*	(3,07 - 6,20)	ab		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	7,70	(6,26 - 9,27)	a		
Quartile 4 (défavorisé)	7,75	(6,12 - 9,53)	b		
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
Quartile 1 (favorisé)	5,76	(4,45 - 7,20)			
Quartiles 2 et 3 (moyen)	6,77	(5,37 - 8,35)			
Quartile 4 (défavorisé)	8,55	(6,77 - 10,30)			
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	5,77	(4,68 - 7,00)	a		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	5,35	(4,06 - 6,66)	b		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	8,25	(6,81 - 9,78)	ab		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 76 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		p>0,05	6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	6,59	(5,76 - 7,53)			
Au moins un parent	7,32*	(4,93 - 9,83)			
Non-réponse partielle ¹			5,2 %		
Assurance dentaire privée					
Oui	6,39	(5,40 - 7,57)			
Non	7,33	(5,96 - 8,79)			
Non-réponse partielle ¹			7,4 %		
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	8,22	(6,57 - 10,06)			
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	5,64	(4,46 - 6,92)			
75 000 \$ et plus	5,28*	(3,61 - 7,63)			
Non-réponse partielle ¹			10,9 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 76 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation des débris				p<0,05
Faible	1,71**	(0,57 - 2,78)	ab	
Moyen	6,09	(5,22 - 7,02)	ac	
Élevé	10,19	(8,31 - 12,19)	bc	
Non-réponse partielle ¹				0,2 %
Brossage des dents la veille de l'examen				p<0,05
Deux fois par jour	5,98	(5,07 - 6,89)		
Une fois par jour et moins	8,29	(6,56 - 10,02)		
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				p<0,05
Oui	8,73	(6,91 - 10,55)		
Non	5,93	(5,03 - 6,82)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 76 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	6,28	(5,24 - 7,32)	p>0,05	
Plus d'une fois par jour	8,64*	(5,45 - 11,84)		
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	9,83*	(5,81 - 13,86)	p>0,05	
Non	7,89	(6,24 - 9,54)		
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	7,30	(6,32 - 8,29)	p<0,05	
Plus d'un an	3,63*	(1,91 - 5,35)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 77 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	2,01	(1,81 - 2,22)	1,83	5,33	(4,88 - 5,79)	4,91
Variable sociodémographique						
Sexe				p>0,05		
Masculin				5,26	(4,75 - 5,82)	
Féminin				5,40	(4,75 - 6,10)	
Groupe d'âge de la mère				p>0,05		
Moins de 35 ans				5,78	(4,29 - 7,27)	
35 ans et plus				5,16	(4,69 - 5,64)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p<0,05		
Au moins le français				5,30	(4,63 - 6,05)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				4,74	(4,10 - 5,36)	a
Ni le français, ni l'anglais				6,20	(5,28 - 7,18)	a
Non-réponse partielle ¹				1,3 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 77 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			5,65	(4,85 - 6,57)	
2 enfants			5,24	(4,68 - 5,83)	
3 enfants			5,42	(4,52 - 6,45)	
4 enfants ou plus			4,69	(3,72 - 5,74)	
Non-réponse partielle ¹					2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			6,20	(5,11 - 7,67)	
Diplôme d'études secondaires			5,41	(4,30 - 6,46)	
Diplôme d'études postsecondaires			5,08	(4,61 - 5,59)	
Non-réponse partielle ¹					5,6 %
Statut d'immigration des parents					p<0,05
Deux parents non-immigrants			4,28	(3,75 - 4,87)	ab
Deux parents immigrants récents			7,55	(5,67 - 9,29)	ac
Autres combinaisons			5,59	(5,02 - 6,18)	bc
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			5,18	(4,43 - 5,92)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			5,20	(4,61 - 5,80)	
Quartile 4 (défavorisé)			6,05	(4,99 - 7,28)	
Non-réponse partielle ¹					7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 77 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			4,33	(3,63 - 4,94) ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)			5,46	(4,69 - 6,20) a
Quartile 4 (défavorisé)			5,87	(5,16 - 6,64) b
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			4,71	(4,05 - 5,46)
Quartiles 2 et 3 (moyen)			5,48	(4,67 - 6,33)
Quartile 4 (défavorisé)			5,88	(5,14 - 6,69)
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)			4,61	(3,82 - 5,47)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			5,54	(4,64 - 6,32)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			5,70	(5,04 - 6,45)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 77 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p>0,05
Aucun parent			5,11	(4,66 - 5,60)	
Au moins un parent			6,15	(4,99 - 7,58)	
Non-réponse partielle ¹					4,5 %
Assurance dentaire privée					p<0,05
Oui			4,56	(3,97 - 5,19)	a
Non			5,91	(5,32 - 6,48)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					p<0,05
Moins de 40 000 \$			6,94	(6,20 - 7,72)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			4,42	(3,70 - 5,16)	a
75 000 \$ et plus			3,53	(2,92 - 4,14)	b
Non-réponse partielle ¹					13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 77 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				p>0,05
Faible			5,02	(3,86 - 6,18)
Moyen			5,10	(4,60 - 5,67)
Élevé			6,57	(5,41 - 7,83)
Non-réponse partielle ¹				0,4 %
Nombre de dents scellées				p<0,05
0 dent			6,15	(5,52 - 6,61) ab
1 à 3 dents			5,00	(4,37 - 5,73) ac
4 dents ou plus			3,88	(3,28 - 4,57) bc
Brossage des dents la veille de l'examen				p>0,05
Deux fois par jour			5,09	(4,57 - 5,60)
Une fois par jour et moins			5,84	(5,04 - 6,64)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				p<0,05
Oui			4,48	(3,69 - 5,27)
Non			5,60	(5,05 - 6,14)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 77 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins			4,99	(4,49 - 5,49)
Plus d'une fois par jour			4,76	(3,79 - 5,73)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui			5,00	(3,75 - 6,25)
Non			5,35	(4,50 - 6,21)
Visite chez le dentiste				p<0,05
Un an et moins			4,88	(4,41 - 5,34)
Plus d'un an			7,31	(6,26 - 8,36)

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 78 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	1,95	(1,76 - 2,16)	1,78	5,18	(4,74 - 5,62)	4,78
Variable sociodémographique						
Sexe				p>0,05		
Masculin				5,09	(4,59 - 5,63)	
Féminin				5,28	(4,64 - 5,95)	
Groupe d'âge de la mère				p>0,05		
Moins de 35 ans				5,60	(4,24 - 6,96)	
35 ans et plus				5,02	(4,55 - 5,48)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p<0,05		
Au moins le français				5,18	(4,52 - 5,91)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				4,60	(3,95 - 5,21) a	
Ni le français, ni l'anglais				6,01	(5,10 - 6,91) a	
Non-réponse partielle ¹						1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 78 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			5,57	(4,75 - 6,48)	
2 enfants			5,06	(4,51 - 5,63)	
3 enfants			5,29	(4,40 - 6,30)	
4 enfants ou plus			4,59	(3,61 - 5,64)	
Non-réponse partielle ¹					2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			6,08	(5,05 - 7,52)	
Diplôme d'études secondaires			5,22	(4,14 - 6,23)	
Diplôme d'études postsecondaires			4,95	(4,47 - 5,44)	
Non-réponse partielle ¹					5,6 %
Statut d'immigration des parents					p<0,05
Deux parents non-immigrants			4,17	(3,67 - 4,73) ab	
Deux parents immigrants récents			7,25	(5,40 - 8,91) a	
Autres combinaisons			5,43	(4,88 - 6,02) b	
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			5,07	(4,32 - 5,80)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			5,06	(4,48 - 5,67)	
Quartile 4 (défavorisé)			5,82	(4,82 - 7,00)	
Non-réponse partielle ¹					7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 78 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			4,29	(3,65 - 4,91) ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)			5,31	(4,55 - 6,06) a
Quartile 4 (défavorisé)			5,66	(5,00 - 6,37) b
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			4,64	(3,96 - 5,38)
Quartiles 2 et 3 (moyen)			5,34	(4,52 - 6,19)
Quartile 4 (défavorisé)			5,65	(4,96 - 6,39)
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)			4,43	(3,70 - 5,21)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			5,42	(4,53 - 6,21)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			5,57	(4,93 - 6,29)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 78 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p>0,05
Aucun parent			4,96	(4,51 - 5,43)	
Au moins un parent			6,07	(4,94 - 7,50)	
Non-réponse partielle ¹					4,5 %
Assurance dentaire privée					p<0,05
Oui			4,46	(3,88 - 5,06) a	
Non			5,71	(5,15 - 6,26) a	
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					p<0,05
Moins de 40 000 \$			6,69	(5,97 - 7,45) ab	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			4,35	(3,62 - 5,08) a	
75 000 \$ et plus			3,45	(2,86 - 4,06) b	
Non-réponse partielle ¹					13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 78 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					p>0,05
Faible			4,84	(3,75 - 5,93)	
Moyen			5,00	(4,50 - 5,55)	
Élevé			6,25	(5,14 - 7,42)	
Non-réponse partielle ¹					0,4 %
Nombre de dents scellées					p<0,05
0 dent			5,94	(5,32 - 6,55)	a
1 à 3 dents			4,91	(4,29 - 5,60)	b
4 dents ou plus			3,83	(3,22 - 4,53)	ab
Brossage des dents la veille de l'examen					p>0,05
Deux fois par jour			4,97	(4,47 - 5,48)	
Une fois par jour et moins			5,67	(4,88 - 6,45)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen					p<0,05
Oui			4,37	(3,62 - 5,12)	
Non			5,45	(4,93 - 5,97)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 78 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins			4,88	(4,40 - 5,37)
Plus d'une fois par jour			4,65	(3,67 - 5,64)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui			4,90	(3,64 - 6,16)
Non			5,24	(4,40 - 6,08)
Visite chez le dentiste				p<0,05
Un an et moins			4,79	(4,32 - 5,25)
Plus d'un an			6,95	(6,00 - 7,91)

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 79 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	0,25	(0,19 - 0,31)	0,22	0,95	(0,79 - 1,12)	0,93
Variable sociodémographique						
Sexe				p>0,05		
Masculin				0,80	(0,59 - 1,02)	
Féminin				1,10	(0,87 - 1,38)	
Groupe d'âge de la mère				p>0,05		
Moins de 35 ans				1,00	(0,54 - 1,46)	
35 ans et plus				0,91	(0,74 - 1,08)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p<0,05		
Au moins le français				0,98	(0,74 - 1,25)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				0,64*	(0,43 - 0,87)	a
Ni le français, ni l'anglais				1,25	(0,94 - 1,59)	a
Non-réponse partielle ¹						1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 79 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			1,03*	(0,61 - 1,54)	
2 enfants			0,82	(0,62 - 1,07)	
3 enfants			0,90*	(0,59 - 1,24)	
4 enfants ou plus			1,27**	(0,58 - 2,10)	
Non-réponse partielle ¹					2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			1,06**	(0,55 - 1,64)	
Diplôme d'études secondaires			0,97*	(0,54 - 1,38)	
Diplôme d'études postsecondaires			0,87	(0,69 - 1,07)	
Non-réponse partielle ¹					5,6 %
Statut d'immigration des parents					p>0,05
Deux parents non-immigrants			0,84*	(0,58 - 1,11)	
Deux parents immigrants récents			1,33**	(0,63 - 2,07)	
Autres combinaisons			1,01	(0,81 - 1,22)	
Non-réponse partielle ¹					6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 79 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)	0,88	(0,65 - 1,15)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0,92	(0,68 - 1,17)		
Quartile 4 (défavorisé)	1,01*	(0,58 - 1,56)		
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	0,53*	(0,32 - 0,77) ab		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0,84	(0,65 - 1,04) ac		
Quartile 4 (défavorisé)	1,31	(0,96 - 1,66) bc		
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation mat. et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)	0,76*	(0,53 - 1,03)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0,78*	(0,53 - 1,07)		
Quartile 4 (défavorisé)	1,27	(0,90 - 1,64)		
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0,87*	(0,56 - 1,25)		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0,91*	(0,64 - 1,23)		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	1,04	(0,81 - 1,29)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 79 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p>0,05
Aucun parent			0,78	(0,63 - 0,95)	a
Au moins un parent			2,04*	(1,32 - 2,87)	b
Non-réponse partielle ¹					4,5 %
Assurance dentaire privée					p>0,05
Oui			0,77	(0,58 - 0,99)	
Non			1,03	(0,81 - 1,26)	
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					p<0,05
Moins de 40 000 \$			1,30	(1,03 - 1,62)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			0,73*	(0,47 - 1,03)	a
75 000 \$ et plus			0,44**	(0,19 - 0,80)	b
Non-réponse partielle ¹					13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 79 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				p>0,05
Faible			0,69** (0,32 - 1,10)	
Moyen			0,93 (0,76 - 1,13)	
Élevé			1,23* (0,73 - 1,77)	
Non-réponse partielle ¹				0,4 %
Nombre de dents scellées				p<0,05
0 dent			1,19 (0,95 - 1,47) a	
1 à 3 dents			0,94* (0,65 - 1,28) b	
4 dents ou plus			0,44** (0,26 - 0,70) ab	
Brossage des dents la veille de l'examen				p>0,05
Deux fois par jour			0,83 (0,63 - 1,02)	
Une fois par jour et moins			1,07 (0,77 - 1,36)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				p>0,05
Oui			0,78 (0,51 - 1,04)	
Non			0,96 (0,76 - 1,16)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 79 Nombre moyen de dents cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins			0,82	(0,63 - 1,01)
Plus d'une fois par jour			0,94	(0,48 - 1,41)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui			1,31	(0,68 - 1,93)
Non			0,95	(0,66 - 1,24)
Visite chez le dentiste				p>0,05
Un an et moins			0,91	(0,72 - 1,10)
Plus d'un an			1,04	(0,70 - 1,37)

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 80 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	3,11	(2,74 - 3,53)	3,03	8,60	(7,81 - 9,48)	8,05
Variable sociodémographique						
Sexe				p>0,05		
Masculin				8,46	(7,53 - 9,51)	
Féminin				8,75	(7,58 - 9,99)	
Groupe d'âge de la mère				p>0,05		
Moins de 35 ans				9,53*	(6,31 - 12,74)	
35 ans et plus				8,27	(7,42 - 9,12)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p<0,05		
Au moins le français				8,38	(7,28 - 9,66)	a
Au moins l'anglais, mais pas le français				7,43	(6,19 - 8,64)	b
Ni le français, ni l'anglais				10,60	(8,81 - 12,64)	ab
Non-réponse partielle ¹				1,3 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 80 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			8,91	(7,38 - 10,61)	
2 enfants			8,39	(7,29 - 9,57)	
3 enfants			8,70	(7,09 - 10,54)	
4 enfants ou plus			8,06	(6,08 - 10,30)	
Non-réponse partielle ¹					2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			10,13	(8,56 - 11,93)	
Diplôme d'études secondaires			8,28	(6,51 - 9,91)	
Diplôme d'études postsecondaires			8,11	(7,23 - 9,07)	
Non-réponse partielle ¹					5,6 %
Statut d'immigration des parents					p<0,05
Deux parents non-immigrants			6,62	(5,63 - 7,80)	ab
Deux parents immigrants récents			12,58	(9,31 - 16,41)	ac
Autres combinaisons			9,11	(8,04 - 10,29)	bc
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			8,02	(6,76 - 9,38)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			8,56	(7,46 - 9,65)	
Quartile 4 (défavorisé)			9,94	(7,89 - 12,53)	
Non-réponse partielle ¹					7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 80 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			6,36 (5,25 - 7,62)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)			8,82 (7,53 - 10,17)	a
Quartile 4 (défavorisé)			9,87 (8,44 - 11,47)	b
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			7,25 (6,14 - 8,52)	a
Quartiles 2 et 3 (moyen)			8,74 (7,34 - 10,26)	
Quartile 4 (défavorisé)			9,98 (8,54 - 11,58)	a
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)			7,30 (5,63 - 9,25)	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			8,71 (7,30 - 10,20)	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			9,50 (8,29 - 10,85)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 80 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p>0,05
Aucun parent			8,16	(7,32 - 9,09)	
Au moins un parent			10,38	(8,26 - 12,64)	
Non-réponse partielle ¹					4,5 %
Assurance dentaire privée					p<0,05
Oui			7,28	(6,20 - 8,49)	a
Non			9,50	(8,51 - 10,50)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					p<0,05
Moins de 40 000 \$			11,54	(10,20 - 12,98)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			6,96	(5,77 - 8,35)	ac
75 000 \$ et plus			4,94	(4,05 - 5,94)	bc
Non-réponse partielle ¹					13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 80 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					p<0,05
Faible			7,34	(5,45 - 9,16)	a
Moyen			8,12	(7,22 - 9,12)	b
Élevé			11,65	(9,20 - 14,19)	ab
Non-réponse partielle ¹					0,4 %
Nombre de dents scellées					p<0,05
0 dent			10,36	(9,21 - 11,62)	ab
1 à 3 dents			7,83	(6,63 - 9,21)	ac
4 dents ou plus			5,57	(4,56 - 6,83)	bc
Brossage des dents la veille de l'examen					p>0,05
Deux fois par jour			7,96	(6,99 - 8,94)	
Une fois par jour et moins			9,81	(8,20 - 11,42)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen					p<0,05
Oui			7,03	(5,42 - 8,64)	
Non			9,10	(8,03 - 10,16)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 80 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins			7,87	(6,88 - 8,86)
Plus d'une fois par jour			8,38*	(5,61 - 11,14)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui			9,61*	(6,29 - 12,93)
Non			8,48	(7,04 - 9,92)
Visite chez le dentiste				p<0,05
Un an et moins			7,79	(6,90 - 8,67)
Plus d'un an			12,05	(10,12 - 13,98)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 81 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	3,04	(2,67 - 3,46)	2,97	8,43	(7,65 - 9,27)	7,86
Variable sociodémographique						
Sexe				p>0,05		
Masculin				8,25	(7,33 - 9,29)	
Féminin				8,60	(7,46 - 9,79)	
Groupe d'âge de la mère				p>0,05		
Moins de 35 ans				9,35*	(6,28 - 12,41)	
35 ans et plus				8,09	(7,26 - 8,91)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p<0,05		
Au moins le français				8,25	(7,16 - 9,52)	a
Au moins l'anglais, mais pas le français				7,26	(6,03 - 8,46)	b
Ni le français, ni l'anglais				10,33	(8,60 - 12,25)	ab
Non-réponse partielle ¹				1,3 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 81 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			8,82	(7,28 - 10,52)	
2 enfants			8,18	(7,11 - 9,31)	
3 enfants			8,51	(6,94 - 10,29)	
4 enfants ou plus			7,94	(5,97 - 10,13)	
Non-réponse partielle ¹					2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			10,00	(8,46 - 11,71)	
Diplôme d'études secondaires			8,09	(6,41 - 9,64)	
Diplôme d'études postsecondaires			7,95	(7,08 - 8,90)	
Non-réponse partielle ¹					5,6 %
Statut d'immigration des parents					p<0,05
Deux parents non-immigrants			6,48	(5,49 - 7,64)	ab
Deux parents immigrants récents			12,25	(9,08 - 15,89)	a
Autres combinaisons			8,92	(7,87 - 10,05)	b
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			7,87	(6,61 - 9,18)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			8,41	(7,34 - 9,50)	
Quartile 4 (défavorisé)			9,72	(7,75 - 12,18)	
Non-réponse partielle ¹					7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 81 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			6,33 (5,20 - 7,60)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)			8,65 (7,36 - 9,98)	a
Quartile 4 (défavorisé)			9,63 (8,23 - 11,19)	b
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			7,15 (6,05 - 8,42)	a
Quartiles 2 et 3 (moyen)			8,57 (7,17 - 10,09)	
Quartile 4 (défavorisé)			9,75 (8,36 - 11,28)	a
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)			7,05 (5,48 - 8,87)	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			8,58 (7,18 - 10,01)	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			9,34 (8,14 - 10,68)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 81 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p<0,05
Aucun parent			7,97	(7,15 - 8,86)	a
Au moins un parent			10,28	(8,18 - 12,55)	a
Non-réponse partielle ¹					4,5 %
Assurance dentaire privée					p<0,05
Oui			7,17	(6,12 - 8,36)	a
Non			9,24	(8,30 - 12,20)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					p<0,05
Moins de 40 000 \$			11,24	(9,95 - 12,60)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			6,86	(5,68- 8,25)	ac
75 000 \$ et plus			4,86	(3,97 - 5,87)	bc
Non-réponse partielle ¹					13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 81 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					p>0,05
Faible			7,16	(5,32 - 8,89)	
Moyen			7,99	(7,10 - 8,99)	
Élevé			11,26	(8,90 - 13,69)	
Non-réponse partielle ¹					0,4 %
Nombre de dents scellées					p<0,05
0 dent			10,11	(9,00 - 11,30)	ab
1 à 3 dents			7,70	(6,56 - 9,01)	ac
4 dents ou plus			5,52	(4,50 - 6,79)	bc
Brossage des dents la veille de l'examen					p>0,05
Deux fois par jour			7,83	(6,87 - 8,80)	
Une fois par jour et moins			9,59	(8,03 - 11,15)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen					p<0,05
Oui			6,90	(5,33 - 7,46)	
Non			8,92	(7,88 - 9,96)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 81 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins			7,74	(6,78 - 8,70)
Plus d'une fois par jour			8,27*	(5,51 - 11,04)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui			9,51*	(6,18 - 12,83)
Non			8,29	(6,90 - 9,69)
Visite chez le dentiste				p<0,05
Un an et moins			7,68	(6,81 - 8,55)
Plus d'un an			11,61	(9,81 - 13,41)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 82 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	0,34	(0,25 - 0,42)	0,31	1,46	(1,19 - 1,79)	1,49
Variable sociodémographique						
Sexe						p<0,05
Masculin				1,16*	(0,84 - 1,55)	a
Féminin				1,76	(1,33 - 2,29)	a
Groupe d'âge de la mère						p>0,05
Moins de 35 ans				1,34**	(2,00 - 25,37)	
35 ans et plus				1,41	(1,71 - 11,35)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison						p<0,05
Au moins le français				1,45*	(1,07 - 1,89)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				1,01*	(0,64 - 1,46)	a
Ni le français, ni l'anglais				2,05*	(1,47 - 2,77)	a
Non-réponse partielle ¹						1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 82 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			1,44*	(0,86 - 2,15)	
2 enfants			1,29*	(0,93 - 1,74)	
3 enfants			1,41*	(0,89 - 2,05)	
4 enfants ou plus			2,07**	(0,87 - 3,55)	
Non-réponse partielle ¹					2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			1,77**	(0,81 - 2,89)	
Diplôme d'études secondaires			1,27*	(0,71 - 1,81)	
Diplôme d'études postsecondaires			1,35	(1,03 - 1,71)	
Non-réponse partielle ¹					5,6 %
Statut d'immigration des parents					p>0,05
Deux parents non-immigrants			1,27*	(0,85 - 1,74)	
Deux parents immigrants récents			1,94**	(0,88 - 3,09)	
Autres combinaisons			1,61	(1,25 - 2,01)	
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			1,38*	(0,97 - 1,93)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			1,40	(1,00 - 1,83)	
Quartile 4 (défavorisé)			1,56**	(0,83 - 2,54)	
Non-réponse partielle ¹					7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 82 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p<0,05
Quartile 1 (favorisé)			0,77*	(0,45 - 1,19) ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)			1,33	(0,98 - 1,78) a
Quartile 4 (défavorisé)			2,02*	(1,42 - 2,68) b
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			1,17*	(0,79 - 1,66)
Quartiles 2 et 3 (moyen)			1,29*	(0,79 - 1,89)
Quartile 4 (défavorisé)			1,88*	(1,27 - 2,52)
Non-réponse partielle ¹				7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)			1,35*	(0,81 - 2,02)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			1,38*	(0,96 - 1,97)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			1,60	(1,20 - 2,07)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 82 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p<0,05
Aucun parent			1,19	(0,92 - 1,49)	a
Au moins un parent			3,23*	(2,02 - 4,60)	a
Non-réponse partielle ¹					4,5 %
Assurance dentaire privée					p<0,05
Oui			1,13*	(0,82 - 1,50)	a
Non			1,63	(1,28 - 2,04)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					p<0,05
Moins de 40 000 \$			2,01	(1,55 - 2,56)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			1,12*	(0,68 - 1,62)	a
75 000 \$ et plus			0,68**	(0,28 - 1,22)	b
Non-réponse partielle ¹					13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 82 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					p>0,05
Faible			1,26**	(0,53 - 2,17)	
Moyen			1,37	(1,09 - 1,70)	
Élevé			2,01*	(1,13 - 3,02)	
Non-réponse partielle ¹					0,4 %
Nombre de dents scellées					p<0,05
0 dent			1,82	(1,39 - 2,29)	a
1 à 3 dents			1,43*	(0,98 - 1,99)	b
4 dents ou plus			0,75**	(0,41 - 1,21)	ab
Brossage des dents la veille de l'examen					p>0,05
Deux fois par jour			1,30	(1,64 - 13,08)	
Une fois par jour et moins			1,51*	(1,99 - 16,56)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen					p>0,05
Oui			1,12*	(1,51 - 17,86)	
Non			1,54	(1,93 - 12,99)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 82 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				p>0,05
Une fois par jour et moins			1,28	(1,61 - 13,28)
Plus d'une fois par jour			1,40**	(2,13 - 26,43)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				p>0,05
Oui			1,98**	(3,01 - 26,77)
Non			1,52*	(2,04 - 17,76)
Visite chez le dentiste				p>0,05
Un an et moins			1,41	(1,74 - 12,06)
Plus d'un an			1,62*	(2,31 - 21,60)

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 83 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	13,07 [†]	(12,05 - 14,25)	10,63	10,70	(9,80 - 11,65)	10,09
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	13,09	(11,53 - 14,78)		10,97	(9,83 - 12,20)	
Féminin	13,05	(11,78 - 14,41)		10,43	(9,17 - 11,71)	
Groupe d'âge de la mère			p<0,05			p>0,05
Moins de 35 ans	15,90	(13,42 - 18,38)		11,27	(7,73 - 14,81)	
35 ans et plus	11,98	(10,91 - 13,06)		10,38	(9,47 - 11,29)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			p>0,05
Au moins le français	11,83	(10,33 - 13,58)	a	10,42	(9,40 - 11,57)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	11,55	(9,55 - 13,60)	b	9,57	(7,97 - 11,17)	
Ni le français, ni l'anglais	18,25	(15,66 - 21,22)	ab	12,87	(10,64 - 15,31)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 83 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison			p>0,05			p>0,05
1 enfant	14,62	(12,81 - 16,76)		10,47	(8,62 - 12,44)	
2 enfants	12,10	(10,20 - 14,15)		10,40	(9,14 - 11,67)	
3 enfants	14,00	(12,10 - 16,20)		10,80	(9,05 - 12,77)	
4 enfants ou plus	14,91	(11,49 - 18,57)		11,88	(8,87 - 15,27)	
Non-réponse partielle ¹			3,1 %			2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p>0,05			p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires	15,48*	(11,02 - 20,40)		12,48	(9,93 - 14,91)	
Diplôme d'études secondaires	15,38	(12,56 - 18,43)		10,16	(8,37 - 11,99)	
Diplôme d'études postsecondaires	12,34	(11,21 - 13,56)		10,23	(9,32 - 11,17)	
Non-réponse partielle ¹			4,5 %			5,6 %
Statut d'immigration des parents			p<0,05			p<0,05
Deux parents non-immigrants	10,00	(8,55 - 11,41)	ab	8,86	(7,46 - 10,26)	ab
Deux parents immigrants récents	14,79	(11,17 - 18,62)	a	13,89	(10,65 - 17,70)	a
Autres combinaisons	14,70	(13,26 - 16,21)	b	11,22	(10,05 - 12,47)	b
Non-réponse partielle ¹			5,4 %			6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 83 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Indice régional de défavorisation sociale			p<0,05			p>0,05
Quartile 1 (favorisé)	11,21	(9,48 - 12,92)	ab	9,91	(8,62 - 11,26)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	13,72	(12,03 - 15,45)	a	11,15	(9,71 - 12,63)	
Quartile 4 (défavorisé)	16,33	(13,59 - 19,45)	b	11,61	(9,71 - 13,97)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,05			p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	9,07	(7,30 - 10,92)	ab	8,00	(6,49 - 9,64)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	14,60	(12,74 - 16,44)	a	11,18	(9,69 - 12,60)	a
Quartile 4 (défavorisé)	14,91	(12,69 - 17,24)	b	12,28	(10,62 - 13,96)	b
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p<0,05			p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	10,31	(8,67 - 12,11)	ab	9,34	(8,00 - 10,75)	a
Quartiles 2 et 3 (moyen)	13,45	(11,47 - 15,49)	ac	10,66	(8,96 - 12,49)	
Quartile 4 (défavorisé)	16,83	(14,60 - 19,10)	bc	12,66	(11,05 - 14,29)	a
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p<0,05			p<0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	11,27	(9,67 - 13,01)	a	8,61	(6,77 - 10,68)	ab
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	10,94	(9,30 - 12,68)	b	11,37	(10,11 - 12,79)	a
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	15,63	(13,83 - 17,59)	ab	11,72	(10,35 - 13,20)	b

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 83 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestataire de l'aide sociale			p<0,05			p<0,05
Aucun parent	12,54	(11,34 - 13,84)	a	9,98	(9,10 - 10,93)	a
Au moins un parent	16,03	(12,94 - 19,31)	a	14,08	(11,27 - 16,44)	a
Non-réponse partielle ¹			5,2 %			4,5 %
Assurance dentaire privée			p<0,05			p<0,05
Oui	11,74	(10,35 - 13,30)	a	9,43	(8,20 - 10,67)	a
Non	14,32	(12,77 - 16,00)	a	11,49	(10,33 - 12,74)	a
Non-réponse partielle ¹			7,4 %			6,7 %
Revenu le plus élevé des parents			p<0,05			p<0,05
Moins de 40 000 \$	15,88	(14,00 - 17,98)	ab	13,59	(12,14 - 15,12)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	11,15	(9,44 - 13,06)	a	8,94	(7,53 - 10,42)	ac
75 000 \$ et plus	9,85	(7,79 - 12,35)	b	6,94	(5,75 - 8,32)	bc
Non-réponse partielle ¹			10,9 %			13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 83 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris			p<0,05			p<0,05
Faible	5,72*	(3,83 - 7,53)	ab	8,27	(6,39 - 10,03)	a
Moyen	12,46	(11,26 - 13,72)	ac	10,25	(9,25 - 11,33)	b
Élevé	17,10	(15,00 - 19,52)	bc	14,30	(11,21 - 17,33)	ab
Non-réponse partielle ¹			0,2 %			0,4 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées			p>0,05			p<0,05
0 dents	12,86	(11,66 - 14,21)		12,68	(11,40 - 14,00)	ab
1 à 3 dents	16,68	(13,31 - 20,21)		9,72	(8,40 - 11,26)	ac
4 dents et plus	11,08	(8,73 - 13,50)		7,35	(6,21 - 8,74)	bc
Brossage des dents la veille de l'examen			p<0,05			p<0,05
Deux fois par jour	12,19	(11,05 - 13,33)		9,90	(8,87 - 10,93)	
Une fois par jour et moins	14,92	(12,58 - 17,26)		12,34	(10,58 - 14,10)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen			p>0,05			p<0,05
Oui	14,71	(12,29 - 17,13)		8,86	(7,12 - 10,60)	
Non	12,17	(10,95 - 13,40)		11,38	(10,24 - 12,51)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 83 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	12,20	(10,87 - 13,53)	10,05	(8,92 - 11,18)
Plus d'une fois par jour	16,08	(12,07 - 20,10)	11,01	(7,96 - 14,07)
		p>0,05		p>0,05
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	17,41	(12,27 - 22,55)	11,68*	(7,80 - 15,56)
Non	12,81	(11,74 - 13,88)	10,01	(9,05 - 10,96)
		p>0,05		p>0,05
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	13,25	(11,94 - 14,55)	10,21	(9,22 - 11,19)
Plus d'un an	11,82	(8,81 - 14,82)	12,73	(10,77 - 14,68)
		p>0,05		p<0,05

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 84 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	12,27 [†]	(11,25 - 13,42)	9,78	10,28	(9,42 - 11,23)	9,74
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	12,28	(10,77 - 13,94)		10,49	(9,44 - 11,67)	
Féminin	12,25	(10,94 - 13,69)		10,09	(8,55 - 11,34)	
Groupe d'âge de la mère			p<0,05			p>0,05
Moins de 35 ans	14,64	(12,22 - 17,06)		10,96*	(7,61 - 14,31)	
35 ans et plus	11,32	(10,28 - 12,36)		9,96	(9,07 - 10,85)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			p>0,05
Au moins le français	11,11	(9,68 - 12,79)	a	9,97	(8,97 - 11,08)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	11,05	(9,13 - 13,09)	b	9,28	(7,68 - 10,89)	
Ni le français, ni l'anglais	16,96	(14,48 - 19,76)	ab	12,40	(10,36 - 14,65)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 84 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison			p>0,05			p>0,05
1 enfant	13,75	(12,07 - 15,65)		10,26	(8,42 - 12,21)	
2 enfants	11,61	(9,79 - 13,57)		9,94	(8,76 - 11,12)	
3 enfants	12,99	(11,06 - 15,26)		10,49	(8,74 - 12,37)	
4 enfants ou plus	12,96	(10,00 - 16,07)		11,14	(8,37 - 14,32)	
Non-réponse partielle ¹			3,1 %			2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p<0,05			p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires	13,71*	(9,71 - 18,61)		12,15	(9,63 - 14,55)	
Diplôme d'études secondaires	14,40	(11,69 - 17,36)		9,64	(7,94 - 11,29)	
Diplôme d'études postsecondaires	11,68	(10,60 - 12,89)		9,83	(8,93 - 10,74)	
Non-réponse partielle ¹			4,5 %			5,6 %
Statut d'immigration des parents			p<0,05			p<0,05
Deux parents non-immigrants	9,63	(8,23 - 11,01)	a	8,56	(7,23 - 9,96)	ab
Deux parents immigrants récents	12,98	(9,64 - 16,51)		13,42	(10,32 - 17,03)	a
Autres combinaisons	13,87	(12,47 - 15,31)	a	10,77	(9,64 - 12,00)	b
Non-réponse partielle ¹			5,4 %			6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale			p<0,05			p>0,05
Quartile 1 (favorisé)	10,55	(8,91 - 12,23)	ab	9,66	(8,38 - 10,99)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	12,93	(11,34 - 14,58)	a	10,59	(9,23 - 12,02)	
Quartile 4 (défavorisé)	15,14	(12,56 - 18,33)	b	11,28	(9,47 - 13,52)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 84 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,05			p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	8,74	(7,04 - 10,57)	ab	7,87	(6,36 - 9,52)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	13,71	(11,83 - 15,56)	a	10,65	(9,24 - 12,03)	a
Quartile 4 (défavorisé)	13,79	(11,68 - 16,00)	b	11,80	(10,22 - 13,45)	b
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p<0,05			p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	9,83	(8,26 - 11,56)	ab	9,14	(7,80 - 10,54)	a
Quartiles 2 et 3 (moyen)	12,73	(10,82 - 14,74)	ac	10,07	(8,44 - 11,74)	b
Quartile 4 (défavorisé)	15,48	(13,36 - 17,67)	bc	12,18	(10,62 - 13,77)	ab
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p<0,05			p<0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	10,59	(9,08 - 12,36)	a	8,26	(6,49 - 10,21)	ab
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	10,65	(9,04 - 12,45)	b	10,92	(9,68 - 12,35)	a
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	14,42	(12,69 - 16,26)	ab	11,30	(9,95 - 12,77)	b

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 84 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p>0,05			p<0,05
Aucun parent	11,88	(10,72 - 13,15)		9,56	(8,71 - 10,48)	a
Au moins un parent	14,32	(11,49 - 17,39)		13,79	(11,04 - 16,16)	a
Non-réponse partielle ¹			5,2 %			4,5 %
Assurance dentaire privée			p<0,05			p<0,05
Oui	11,15	(9,82 - 12,66)	a	9,10	(7,91 - 10,28)	a
Non	13,27	(11,81 - 14,86)	a	10,98	(9,91 - 12,11)	a
Non-réponse partielle ¹			7,4 %			6,7 %
Revenu le plus élevé des parents			p<0,05			p<0,05
Moins de 40 000 \$	14,60	(12,81 - 16,67)	ab	12,95	(11,59 - 14,37)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	10,71	(9,04 - 12,53)	a	8,73	(7,35 - 10,19)	ac
75 000 \$ et plus	9,48	(7,42 - 11,97)	b	6,65	(5,53 - 7,92)	bc
Non-réponse partielle ¹			10,9 %			13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 84 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris			p<0,05			p<0,05
Faible	5,43*	(3,71 - 7,15)	ab	8,03	(6,25 - 9,72)	a
Moyen	11,71	(10,51 - 12,97)	ac	9,92	(8,92 - 11,03)	b
Élevé	16,02	(14,05 - 18,32)	bc	13,43	(10,68 - 16,27)	ab
Non-réponse partielle ¹			0,2 %			0,4 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées			p>0,05			p<0,05
0 dents	11,89	(10,71 - 13,19)		12,06	(10,84 - 13,32)	ab
1 à 3 dents	16,11	(12,82 - 19,58)		9,51	(8,24 - 10,99)	ac
4 dents et plus	10,83	(8,49 - 13,26)		7,20	(6,06 - 8,61)	bc
Brossage des dents la veille de l'examen			p>0,05			p<0,05
Deux fois par jour	11,47	(10,42 - 12,52)		9,60	(8,57 - 10,63)	
Une fois par jour et moins	13,92	(11,64 - 16,20)		11,69	(10,05 - 13,32)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen			p<0,05			p<0,05
Oui	14,24	(11,84 - 16,64)		8,62	(6,94 - 10,31)	
Non	11,35	(10,16 - 12,54)		10,87	(9,79 - 11,95)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 84 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 1 à 3, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	11,59	(10,30 - 12,89)	9,67	(8,58 - 10,76)
Plus d'une fois par jour	14,97	(11,20 - 18,74)	10,82	(7,82 - 13,82)
		p>0,05		p>0,05
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	15,46	(10,46 - 20,45)	11,51*	(7,62 - 15,40)
Non	12,10	(11,07 - 13,14)	9,62	(8,68 - 10,55)
		p>0,05		p>0,05
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	12,57	(11,33 - 13,82)	9,83	(8,86 - 10,81)
Plus d'un an	10,52	(7,75 - 13,29)	12,17	(10,35 - 13,98)
		p>0,05		p<0,05

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 85 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	7,07 [†]	(6,26 - 7,93)	5,54	2,74	(2,31 - 3,21)	2,91
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	6,76	(5,59 - 8,09)		2,62	(1,97 - 3,35)	
Féminin	7,38	(6,23 - 8,56)		2,87	(2,31 - 3,48)	
Groupe d'âge de la mère			p>0,05			p>0,05
Moins de 35 ans	8,02	(6,23 - 9,82)		2,61	(1,19 - 4,02)	
35 ans et plus	6,66	(5,79 - 7,54)		2,69	(2,21 - 3,18)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p<0,05			p>0,05
Au moins le français	6,03	(4,96 - 7,21)	a	2,74	(2,12 - 3,41)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	6,28	(4,81 - 7,94)	b	2,19*	(1,54 - 2,97)	
Ni le français, ni l'anglais	11,26	(8,97 - 13,78)	ab	3,56	(2,66 - 4,71)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 85 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	7,52	(5,66 - 9,57)	2,52*	(1,63 - 3,50)
2 enfants	6,71	(5,46 - 8,19)	2,47	(1,94 - 3,05)
3 enfants	8,03	(6,37 - 9,94)	2,56*	(1,68 - 3,47)
4 enfants ou plus	7,83*	(4,57 - 11,24)	4,82*	(2,71 - 7,21)
Non-réponse partielle ¹		3,1 %		2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	8,52*	(5,21 - 12,57)	3,70*	(1,96 - 5,34)
Diplôme d'études secondaires	8,86	(6,67 - 11,03)	2,41*	(1,70 - 3,22)
Diplôme d'études postsecondaires	6,68	(5,82 - 7,62)	2,59	(2,11 - 3,14)
Non-réponse partielle ¹		4,5 %		5,6 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	5,27	(4,28 - 6,33) a	2,67*	(1,85 - 3,56)
Deux parents immigrants récents	7,13*	(4,55 - 9,81)	2,68**	(1,39 - 4,08)
Autres combinaisons	8,42	(7,25 - 9,72) a	2,91	(2,30 - 3,52)
Non-réponse partielle ¹		5,4 %		6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	6,57	(5,30 - 8,03)	2,39	(1,92 - 2,95)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	7,32	(5,97 - 8,79)	3,12	(2,32 - 3,95)
Quartile 4 (défavorisé)	8,57*	(6,17 - 11,35)	2,67*	(1,78 - 3,78)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 85 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,05			p<0,05
Quartile 1 (favorisé)	4,83*	(3,30 - 6,59)	ab	1,65*	(0,99 - 2,44)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	8,02	(6,56 - 9,62)	a	2,79	(2,22 - 3,47)	a
Quartile 4 (défavorisé)	8,18	(6,52 - 10,04)	b	3,63	(2,72 - 4,56)	b
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p<0,05			p>0,05
Quartile 1 (favorisé)	5,99	(4,64 - 7,51)	a	2,34	(1,80 - 2,97)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	7,14	(5,67 - 8,76)		2,52*	(1,75 - 3,38)	
Quartile 4 (défavorisé)	9,01	(7,20 - 10,83)	a	3,65	(2,71 - 4,61)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p<0,05			p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	6,11	(5,05 - 7,36)	a	2,14*	(1,45 - 3,02)	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	5,51	(4,28 - 6,80)	b	2,90*	(2,06 - 3,92)	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	8,70	(7,20 - 10,27)	ab	3,07	(2,43 - 3,73)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 85 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	6,90	(6,07 - 7,85)	2,27	(1,86 - 2,74) a
Au moins un parent	7,85*	(5,24 - 10,69)	5,84	(3,94 - 7,39) a
Non-réponse partielle ¹		5,2 %		4,5 %
Assurance dentaire privée				
Oui	6,65	(5,65 - 7,85)	2,41	(1,92 - 2,92)
Non	7,72	(6,34 - 9,18)	2,87	(2,23 - 3,63)
Non-réponse partielle ¹		7,4 %		6,7 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	8,64	(6,97 - 10,49)	3,41	(2,74 - 4,15) ab
Entre 540 000 et 74 999\$	6,03	(4,79 - 7,37)	2,26*	(1,52 - 3,11) a
75 000 \$ et plus	5,41*	(3,72 - 7,74)	1,74**	(0,98 - 2,73) b
Non-réponse partielle ¹		10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 85 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		Nombre moyen	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris			p<0,05			p>0,05
Faible	2,05**	(0,86 - 3,19)	ab	1,73**	(0,90 - 2,74)	
Moyen	6,37	(5,47 - 7,33)	ac	2,62	(2,22 - 3,04)	
Élevé	10,68	(8,73 - 12,77)	bc	3,93*	(2,25 - 5,87)	
Non-réponse partielle ¹			0,2 %			0,4 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées			p<0,05			p<0,05
0 dents	6,55	(5,55 - 7,66)	a	3,31	(2,60 - 4,05)	a
1 à 3 dents	10,81	(8,02 - 13,91)	ab	2,45	(1,80 - 3,20)	
4 dents et plus	6,34	(4,61 - 8,09)	b	1,80*	(1,27 - 2,39)	a
Brossage des dents la veille de l'examen			p<0,05			p>0,05
Deux fois par jour	6,31	(5,35 - 7,27)		2,48	(2,01 - 2,95)	
Une fois par jour et moins	8,64	(6,86 - 10,42)		3,02	(2,12 - 3,93)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen			p<0,05			p>0,05
Oui	9,11	(7,27 - 10,96)		2,30	(1,61 - 2,98)	
Non	6,23	(5,30 - 7,16)		2,86	(2,26 - 3,46)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 85 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	6,58	(5,50 - 7,66)	2,61	(2,07 - 3,14)
Plus d'une fois par jour	9,13*	(5,83 - 12,44)	3,06	(1,19 - 4,93)
		p>0,05		p>0,05
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	10,35*	(5,97 - 14,73)	2,71	(1,32 - 4,11)
Non	6,89	(6,06 - 7,73)	2,53	(2,08 - 2,97)
		p>0,05		p>0,05
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	7,66	(6,64 - 8,69)	2,94	(2,40 - 3,48)
Plus d'un an	3,77*	(2,00 - 5,55)	1,92	(1,19 - 2,64)
		p<0,05		p<0,05

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Caractéristiques des élèves ayant une expérience élevée de carie

Tableau 86 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₈₈ ≥10			6 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₁₂₈ ≥5		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	27,3 [†]	(23,1 - 31,6)	22,1	10,9*	(7,7 - 14,7)	11,4
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	24,7	(18,8 - 30,6)		7,8**	(3,6 - 13,2)	
Féminin	30,0	(23,9 - 36,1)		14,0*	(9,0 - 20,0)	
Groupe d'âge de la mère			p=0,242			p=0,749
Moins de 35 ans	30,9	(23,4 - 39,6)		11,7**	(4,9 - 25,5)	
35 ans et plus	26,1	(21,7 - 30,9)		10,1*	(7,2 - 14,0)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,0076			p=0,0911
Au moins le français	24,8	(18,9 - 31,2)	a	10,8*	(6,3 - 15,8)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	24,4*	(16,5 - 32,7)	b	6,3**	(2,2 - 10,7)	
Ni le français, ni l'anglais	39,9	(30,6 - 50,3)	ab	16,2**	(8,0 - 25,7)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 86 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % c ₄₋₆ aof ₈₈ ≥10		6 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₁₂₈ ≥5	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
				p=0,4661
1 enfant	28,9*	(19,6 - 39,5)	11,6**	(4,1 - 20,1)
2 enfants	25,4	(18,8 - 33,1)	8,3*	(4,6 - 12,8)
3 enfants	33,6	(24,6 - 43,0)	10,4**	(3,8 - 18,1)
4 enfants ou plus	24,9**	(9,6 - 41,9)	18,2**	(3,2 - 36,2)
Non-réponse partielle ¹		3,1 %		2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				p=0,9426
Pas de diplôme d'études secondaires	34,9*	(17,5 - 53,6)	9,2**	(1,1 - 18,7)
Diplôme d'études secondaires	38,0	(26,0 - 49,1)	9,1**	(1,2 - 18,0)
Diplôme d'études postsecondaires	25,3	(21,0 - 30,1)	10,2*	(6,5 - 14,6)
Non-réponse partielle ¹		4,5 %		5,6 %
Statut d'immigration des parents				p=0,4429
Deux parents non-immigrants	23,3	(17,4 - 29,1)	9,8*	(4,9 - 15,1)
Deux parents immigrants récents	33,8*	(20,1 - 48,9)	18,4**	(2,7 - 34,8)
Autres combinaisons	29,9	(23,1 - 36,6)	10,9*	(6,8 - 15,7)
Non-réponse partielle ¹		5,4 %		6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				p=0,7024
Quartile 1 (favorisé)	26,6	(20,2 - 33,1)	8,4**	(3,3 - 14,6)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	27,2	(19,5 - 34,2)	10,3*	(6,2 - 15,1)
Quartile 4 (défavorisé)	32,1*	(21,4 - 43,9)	12,5**	(3,6 - 23,6)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 86 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % C ₄₋₆ aof ₈₈ ≥10		6 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₁₂₈ ≥5	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	19,0*	(10,5 - 28,9)	5,5**	(1,3 - 11,2) a
Quartiles 2 et 3 (moyen)	32,5	(24,9 - 40,1)	8,0*	(3,9 - 12,3)
Quartile 4 (défavorisé)	28,1*	(19,3 - 37,0)	16,0*	(9,1 - 23,4) a
Non-réponse partielle ¹	9,9 %		7,6 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	25,8	(18,5 - 33,9)	6,9**	(2,6 - 12,3)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	25,5*	(17,4 - 33,9)	9,3**	(3,7 - 16,0)
Quartile 4 (défavorisé)	33,2	(24,7 - 41,1)	14,4*	(7,3 - 21,7)
Non-réponse partielle ¹	9,9 %		7,6 %	
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	22,4	(16,7 - 28,3)	11,9**	(4,8 - 20,2)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	24,3*	(16,2 - 32,8)	9,1**	(3,4 - 15,8)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	32,4	(25,0 - 39,7)	11,6*	(6,9 - 16,9)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 86 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₈₈ ≥ 10		6 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₁₂₈ ≥ 5	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	27,1	(22,8 - 31,7)	7,7*	(4,7 - 11,0) a
Au moins un parent	30,3*	(16,2 - 45,6)	32,8*	(16,0 - 50,6) a
Non-réponse partielle ¹		5,2 %		4,5 %
Assurance dentaire privée				
Oui	26,0	(20,4 - 32,3)	7,5**	(3,8 - 11,8)
Non	29,2	(21,9 - 37,1)	12,6*	(8,3 - 17,6)
Non-réponse partielle ¹		7,4 %		6,7 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	32,9	(25,1 - 41,1)	15,4*	(10,3 - 22,5)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	24,0*	(15,7 - 32,9)	7,6**	(3,8 - 14,8)
75 000 \$ et plus	21,3*	(12,2 - 33,0)	4,8**	(1,7 - 13,2)
Non-réponse partielle ¹		10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 86 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₈₈ ≥10		6 ^e année % C ₄₋₆ AOF ₁₂₈ ≥5	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				
Faible	n.p.	n.p.	11,5**	(2,2 - 22,2)
Moyen	24,0	(18,8 - 29,2)	10,2*	(6,6 - 14,3)
Élevé	45,1	(35,9 - 55,0)	13,9**	(4,3 - 24,6)
Non-réponse partielle ¹			0,2 %	0,4 %
Nombre de dents scellées en dentition permanente				
0 dents			14,5*	(9,9 - 20,6)
Au moins une dent			6,8**	(3,9 - 11,7)
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour et plus	24,1	(20,0 - 28,7)	11,1*	(7,9 - 15,3)
Une fois par jour et moins	34,8	(26,2 - 44,5)	6,9**	(3,2 - 14,2)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	39,6	(30,3 - 49,6)	6,3**	(3,0 - 12,8)
Non	22,5	(18,3 - 27,3)	11,6*	(7,7 - 17,0)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 86 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant une expérience élevée de la carie au stade de carie 4 à 6 en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces), parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	24,7	(20,0 - 30,1)	9,5*	(6,4 - 13,8)
Plus d'une fois par jour	37,5*	(23,7 - 53,6)	7,1**	(1,8 - 24,5)
		p=0,095		p=0,675
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	43,4*	26,6 - 61,8)	16,2**	(6,2 - 36,4)
Non	26,5	(22,2 - 31,2)	9,4*	(6,5 - 13,4)
		p=0,037		p=0,297
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	30,4	(25,5 - 35,9)	10,6*	(7,4 - 15,1)
Plus d'un an	11,9**	(6,3 - 21,4)	11,4**	(6,2 - 20,0)
		p=0,001		p=0,846

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 87 Proportion des faces cariées, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves ayant une expérience élevée de la carie parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e année du primaire ayant au moins une face temporaire présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année		
%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
78,9	(73,5 - 83,6)	74,3

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 88 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e année du primaire ayant un c₄₋₆aof₈₈ entre 1 et 4 faces, 5 et 9 faces et 10 faces ou plus, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Nombre de faces au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie	2 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
1 à 4 faces	2,56	(2,29 - 2,82)	2,49
5 à 9 faces	7,15	(6,83 - 7,44)	6,88
10 faces ou plus	19,46 [†]	(17,97 - 21,06)	17,59

[†] Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 89 Nombre moyen de dents cariées au stade 1 à 6 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire du tiers des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire les plus sévèrement atteints par la carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Stade 1 à 6	7,87	(7,67 - 8,09)	8,05	4,31	(3,95 - 4,65)	4,36
Stade 4 à 6	6,29	(6,00 - 6,61)	6,28	3,12	(2,70 - 3,53)	3,29

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 90 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année % c ₁₋₃ f ₈₈ >0			6 ^e année % C ₁₋₃ F ₁₂₈ >0		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	74,6†	(69,4 - 79,5)	66,8	91,6†	(88,9 - 94,2)	84,5
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	77,7	(70,0 - 84,4)		92,4	(88,8 - 95,9)	
Féminin	71,5	(65,2 - 77,7)		90,7	(85,8 - 95,0)	
Groupe d'âge de la mère			p=0,397			p=0,968
Moins de 35 ans	77,0	(68,4 - 83,9)		91,6	(77,2 - 97,3)	
35 ans et plus	72,9	(66,4 - 78,5)		91,4	(88,1 - 93,9)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,7407			p=0,4616
Au moins le français	73,9	(67,5 - 80,0)		91,0	(86,0 - 95,5)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	71,4	(60,2 - 82,7)		89,9	(84,7 - 94,9)	
Ni le français, ni l'anglais	76,4	(66,5 - 86,2)		94,8	(89,0 - 99,5)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 90 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % c ₁₋₃ f ₈₈ >0			6 ^e année % C ₁₋₃ F ₁₂₈ >0		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison			p=0,0488			p=0,2647
1 enfant	81,4	(72,4 - 89,2)	a	94,0	(86,5 - 99,5)	
2 enfants	67,6	(59,4 - 76,0)	a	93,0	(89,6 - 96,2)	
3 enfants	79,6	(69,5 - 88,2)		86,6	(78,9 - 94,6)	
4 enfants ou plus	74,6	(59,3 - 88,6)		88,6	(78,0 - 98,8)	
Non-réponse partielle ¹			3,1 %			2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p=0,0943			p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	85,0	(69,7 - 98,2)		n.p.	n.p.	
Diplôme d'études secondaires	77,6	(67,2 - 87,3)		n.p.	n.p.	
Diplôme d'études postsecondaires	71,6	(65,4 - 77,6)		89,7	(86,4 - 92,9)	
Non-réponse partielle ¹			4,5 %			5,6 %
Statut d'immigration des parents			p=0,0176			p=n.p.
Deux parents non-immigrants	66,1	(58,6 - 73,5)	a	88,4	(82,3 - 93,7)	
Deux parents immigrants récents	78,6	(65,2 - 91,0)		n.p.	n.p.	
Autres combinaisons	77,4	(70,2 - 84,1)	a	92,0	(88,5 - 95,6)	
Non-réponse partielle ¹			5,4 %			6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale			p=0,3734			p=0,9783
Quartile 1 (favorisé)	71,3	61,1 - 80,8)		91,8	(86,0 - 96,7)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	73,7	(65,3 - 81,2)		91,5	(87,3 - 95,4)	
Quartile 4 (défavorisé)	81,0	(71,3 - 89,7)		92,4	(84,0 - 99,3)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 90 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % c ₁₋₃ f ₈₈ >0			6 ^e année % C ₁₋₃ F ₁₂₈ >0		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
Quartile 1 (favorisé)	69,6	(60,0 - 78,7)		89,3	(83,4 - 94,7)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	72,5	(64,4 - 80,5)		91,3	(86,0 - 96,1)	
Quartile 4 (défavorisé)	80,8	(71,0 - 89,6)		94,1	(89,4 - 98,3)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale						
Quartile 1 (favorisé)	67,9	(58,2 - 76,7)	a	89,2	(83,5 - 94,6)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	72,1	(63,3 - 80,3)	b	94,4	(89,9 - 98,4)	
Quartile 4 (défavorisé)	84,2	(76,8 - 91,0)	ab	91,5	(86,0 - 96,7)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])						
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	67,9	(57,9 - 78,0)		85,6	(80,2 - 91,0)	ab
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	73,1	(61,8 - 83,4)		94,0	(88,9 - 98,6)	a
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	80,2	(73,6 - 86,3)		94,1	(90,5 - 97,5)	b

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 90 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % c ₁₋₃ f ₈₈ >0			6 ^e année % C ₁₋₃ F ₁₂₈ >0		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p<0,05			p>0,05
Aucun parent	71,0	(65,1 - 76,8) a		90,9	(87,9 - 93,9)	
Au moins un parent	93,8	(85,4 - 100,0) a		n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle ¹			5,2 %			4,5 %
Assurance dentaire privée			p<0,05			p<0,05
Oui	67,6	(60,1 - 75,0) a		87,3	(82,7 - 91,7) a	
Non	78,6	(71,8 - 84,9) a		95,7	(92,3 - 98,5) a	
Non-réponse partielle ¹			7,4 %			6,7 %
Revenu le plus élevé des parents			p=0,0010			p=0,0358
Moins de 40 000 \$	80,4	(74,4 - 85,9) a		95,4	(92,0 - 98,4) a	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	75,4	(65,8 - 84,0) b		89,1	(82,7 - 94,8)	
75 000 \$ et plus	59,7	(48,1 - 70,7) ab		85,5	(77,3 - 93,0) a	
Non-réponse partielle ¹			10,9 %			13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 90 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % c ₁₋₃ f ₈₈ >0			6 ^e année % C ₁₋₃ F ₁₂₈ >0		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris						
Faible	55,5*	(35,4 - 75,2)	a	93,2	(84,2 - 99,3)	
Moyen	74,3	(67,9 - 80,2)		91,5	(88,4 - 94,6)	
Élevé	80,9	(73,2 - 88,6)	a	91,6	(83,3 - 99,1)	
Non-réponse partielle [†]			0,2 %			0,4 %
Nombre de dents scellées en dentition permanentes						p=n.p
0 dents				94,4	(91,4 - 97,2)	
1 à 3 dents				n.p	n.p	
4 dents et plus				83,2	(74,1 - 90,8)	
Brossage des dents la veille de l'examen						p=0,052
Deux fois par jour et plus	73,8	(68,5 - 78,4)		90,1	(85,9 - 93,2)	
Une fois par jour et moins	75,4	(63,5 - 84,4)		96,5	(91,1 - 98,7)	
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen						p=0,549
Oui	77,9	(66,5 - 86,2)		91,8	(88,4 - 94,3)	
Non	71,7	(65,5 - 77,2)		89,7	(81,2 - 94,6)	

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 90 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face de dents cariée au stade de la carie non évidente en dentition temporaire (88 faces) ou en dentition permanente (128 faces) parmi ceux ayant au moins une face temporaire ou permanente présente ou absente pour cause de carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année % $c_{1-3}f_{88} > 0$		6 ^e année % $C_{1-3}F_{128} > 0$	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	69,4	(62,2 - 75,8)	90,0	(86,2 - 92,8)
Plus d'une fois par jour	76,4	(59,8 - 87,5)	93,9	(77,8 - 98,6)
		p=0,395		p=0,485
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	73,1	(53,1 - 86,6)	94,5	(76,3 - 98,9)
Non	73,4	(68,1 - 78,1)	91,4	(87,9 - 94,0)
		p=0,970		p=0,579
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	70,7	(64,7 - 76,0)	89,8	(86,3 - 92,5)
Plus d'un an	89,6	(80,8 - 94,6)	97,7	(91,5 - 99,4)
		p=0,001		p=0,015

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 91 Proportion des faces cariées, absentes ou obturées pour cause de carie des élèves ayant une expérience élevée de la carie parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 6^e année du primaire ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

6 ^e année		
%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
60,5	(49,9 - 69,3)	64,0

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 92 Nombre moyen de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 6^e année du primaire ayant un C₄₋₆AOF₁₂₈ entre 1 et 4 faces ainsi que de 5 faces ou plus, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Nombre de faces au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie	6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
1 à 4 faces	2,18	(1,99 - 2,38)	2,21
5 faces ou plus	8,10	(7,25 - 9,03)	8,35

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 93 Nombre moyen de dents cariées au stade 1 à 6 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentition permanente du tiers des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente les plus sévèrement atteints par la carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95%	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95%	Reste du Québec
Stade 1 à 6	3,90	(3,74 - 4,08)	4,28	9,44	(8,95 - 9,97)	9,66
Stade 4 à 6	0,70	(0,55 - 0,85)	0,68	2,70	(2,37 - 3,06)	2,72

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 94 Nombre moyen de dents cariées au stade 1 à 6 et 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées du tiers des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire et/ou permanente les plus sévèrement atteints par la carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Stade de carie	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Stade 1 à 6	10,69	(10,33 - 11,04)	11,15	10,62	(10,22 - 11,06)	11,18
Stade 4 à 6	6,79	(6,46 - 7,14)	6,78	4,01	(3,67 - 4,36)	4,17

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Besoin de soins préventifs de la carie

Tableau 95 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	52,0	(48,0 - 55,8)	55,7	76,7	(73,0 - 80,1)	73,6
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	54,6	(49,5 - 59,9)		77,9	(72,3 - 82,9)	
Féminin	49,4	(44,6 - 54,0)		75,6	(71,6 - 79,7)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			p>0,05
Au moins le français	54,8	(50,0 - 59,6)		75,8	(70,3 - 81,1)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	52,1	(44,4 - 59,9)		80,0	(74,8 - 85,0)	
Ni le français, ni l'anglais	44,7	(37,3 - 52,4)		75,3	(68,0 - 81,1)	
Non-réponse partielle ¹			2,1 %			1,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 95 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	53,7	(45,2 - 62,7)	79,8	(74,6 - 85,4) a
2 enfants	50,5	(45,4 - 55,1)	78,3	(73,1 - 82,7) b
3 enfants	49,0	(42,4 - 56,2)	78,6	(72,9 - 84,8) c
4 enfants ou plus	55,9	(44,0 - 69,6)	61,7	(51,8 - 73,6) abc
Non-réponse partielle ¹		3,3 %		2,8 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	51,0	(39,1 - 63,1)	73,1	(63,9 - 84,6)
Diplôme d'études secondaires	48,8	(42,0 - 56,7)	80,3	(74,4 - 85,6)
Diplôme d'études postsecondaires	52,0	(47,5 - 56,3)	76,8	(72,4 - 80,8)
Non-réponse partielle ¹		4,6 %		5,7 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	52,4	(46,8 - 57,9)	71,4	(64,6 - 78,2)
Deux parents immigrants récents	60,8	(51,0 - 70,8)	83,1	(75,7 - 90,0)
Un parent immigrant et un parent non immigrant	48,8	(44,0 - 53,8)	77,1	(73,0 - 81,2)
Non-réponse partielle ¹		5,8 %		6,6 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	47,3	(40,3 - 54,2)	78,8	(74,4 - 83,0)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	52,4	(46,5 - 58,3)	74,7	(68,7 - 80,3)
Quartile 4 (défavorisé)	53,9	(46,2 - 62,9)	78,7	(71,1 - 85,7)
Non-réponse partielle ¹		10,4 %		7,8 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 95 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	52,1	(42,5 - 62,3)	82,1	(75,4 - 87,9)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	51,1	(45,0 - 57,0)	77,6	(72,3 - 81,8)
Quartile 4 (défavorisé)	51,3	(45,6 - 56,8)	73,0	(67,1 - 79,2)
Non-réponse partielle ¹		10,4 %		7,8 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	48,2	(41,1 - 56,0)	78,5	(73,8 - 82,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	51,4	(44,3 - 58,0)	78,1	(71,7 - 83,6)
Quartile 4 (défavorisé)	53,4	(48,1 - 59,2)	73,7	(67,4 - 80,1)
Non-réponse partielle ¹		10,4 %		7,8 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	51,0	(44,3 - 57,1)	76,8	(70,4 - 83,3)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	56,5	(47,1 - 65,1)	76,4	(68,2 - 83,2)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	50,5	(45,0 - 56,3)	77,0	(72,5 - 81,3)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 95 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	51,1	(46,8 - 55,2)	79,4	(75,4 - 83,0) a
Au moins un parent	55,7	(47,7 - 65,2)	61,8	(55,4 - 70,7) a
Non-réponse partielle ¹		5,6 %		4,7 %
Assurance dentaire privée				
Oui	48,9	(43,7 - 53,5)	76,6	(71,8 - 80,9)
Non	52,3	(46,6 - 58,1)	77,9	(73,1 - 82,3)
Non-réponse partielle ¹		7,9 %		7,1 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	51,3	(45,5 - 57,3)	77,6	(73,3 - 81,8)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	52,8	(46,6 - 58,8)	76,1	(69,1 - 82,8)
75 000 \$ et plus	49,5	(40,1 - 58,7)	76,4	(65,6 - 85,8)
Non-réponse partielle ¹		10,9 %		13,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 95 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris						
Faible	65,5	(55,5 - 80,2)	ab	80,0	(68,6 - 89,1)	
Moyen	54,9	(50,5 - 59,2)	ac	77,2	(74,2 - 80,2)	
Élevé	44,0	(37,6 - 51,0)	bc	74,3	(64,6 - 83,9)	
Non-réponse partielle ¹			0,2 %			0,5 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées						
0 dents	54,4	(49,5 - 59,0)	a	76,6	(71,9 - 81,1)	
1 à 3 dents	42,2	(34,6 - 49,9)	a	76,6	(70,9 - 81,6)	
4 dents et plus	50,2	(42,5 - 58,3)		77,5	(71,7 - 83,2)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 96 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	37,9	(33,6 - 42,4)	40,0	45,0 [†]	(38,8 - 52,1)	37,0
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	39,6	(33,8 - 45,6)				
Féminin	36,2	(30,3 - 42,3)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			
Au moins le français	40,7	(35,0 - 46,9)				
Au moins l'anglais, mais pas le français	38,0	(30,4 - 45,7)				
Ni le français, ni l'anglais	30,8	(23,3 - 39,9)				
Non-réponse partielle ¹			2,3 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 96 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	39,5	(31,5 - 48,2)		
2 enfants	35,2	(29,2 - 41,2)		
3 enfants	37,2	(29,6 - 45,4)		
4 enfants ou plus	41,0*	(28,3 - 56,3)		
Non-réponse partielle ¹			3,7 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	38,8	(27,3 - 50,0)		
Diplôme d'études secondaires	33,0	(25,2 - 42,8)		
Diplôme d'études postsecondaires	38,2	(33,3 - 43,2)		
Non-réponse partielle ¹			5,0 %	
Plus haut niveau de scolarité entre les parents				
Pas de diplôme d'études secondaires	35,6**	(19,7 - 57,4)		
Diplôme d'études secondaires	35,5	(25,8 - 46,5)		
Diplôme d'études postsecondaires	38,1	(33,3 - 42,8)		
Non-réponse partielle ¹			3,9 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 96 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	38,6	(32,7 - 44,8)		
Deux parents immigrants récents	46,9	(34,9 - 60,2)		
Autres combinaisons	34,9	(29,8 - 40,4)		
Non-réponse partielle ¹			6,4 %	
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	33,2	(26,4 - 40,2)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	38,4	(32,0 - 44,8)		
Quartile 4 (défavorisé)	39,2	(30,1 - 50,5)		
Non-réponse partielle ¹			9,6 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 96 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	40,2	(30,9 - 50,5)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	36,9	(30,5 - 43,8)		
Quartile 4 (défavorisé)	35,6	(29,0 - 42,7)		
Non-réponse partielle ¹			9,6 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	35,2	(28,3 - 42,6)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	37,6	(30,3 - 44,8)		
Quartile 4 (défavorisé)	37,8	(31,5 - 45,2)		
Non-réponse partielle ¹			9,6 %	
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	36,3	(30,8 - 42,0)		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	42,6	(32,1 - 53,1)		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	36,6	(30,6 - 43,3)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 96 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	36,4	(31,7 - 41,1)		
Au moins un parent	43,6	(35,4 - 53,4)		
Non-réponse partielle ¹			6,2 %	
Assurance dentaire privée				
Oui	34,3	(29,0 - 39,4)		
Non	38,3	(31,8 - 45,3)		
Non-réponse partielle ¹			8,7 %	
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	36,4	(30,1 - 43,3)		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	39,9	(33,1 - 46,8)		
75 000 \$ et plus	36,3	(26,3 - 46,7)		
Non-réponse partielle ¹			11,0 %	
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				
Faible	52,7*	(38,8 - 75,5)		
Moyen	39,9	(35,0 - 44,9)		
Élevé	32,6	(25,8 - 40,2)		
Non-réponse partielle ¹			0,2 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 97 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	89,3	(85,9 - 92,4)	89,3	83,5	(80,3 - 86,4)	81,8
Variable sociodémographique						
Sexe						p>0,05
Masculin				85,9	(81,4 - 89,9)	
Féminin				81,3	(76,9 - 85,2)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison						p>0,05
Au moins le français				83,0	(78,7 - 87,2)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				87,1	(82,3 - 91,3)	
Ni le français, ni l'anglais				81,6	(74,8 - 87,0)	
Non-réponse partielle ¹						1,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 97 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			85,8	(81,1 - 90,4)	
2 enfants			84,8	(79,4 - 89,0)	
3 enfants			84,3	(79,2 - 89,4)	
4 enfants ou plus			73,4	(61,6 - 87,0)	
Non-réponse partielle ¹					2,9 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			83,3	(74,0 - 91,8)	
Diplôme d'études secondaires			87,0	(82,3 - 92,0)	
Diplôme d'études postsecondaires			83,5	(79,5 - 87,2)	
Non-réponse partielle ¹					5,8 %
Statut d'immigration des parents					p>0,05
Deux parents non-immigrants			80,3	(74,6 - 85,7)	a
Deux parents immigrants récents			86,2	(79,5 - 92,7)	
Autres combinaisons			83,4	(79,7 - 86,8)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			83,8	(79,0 - 88,1)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			84,0	(79,1 - 88,6)	
Quartile 4 (défavorisé)			84,4	(76,6 - 90,7)	
Non-réponse partielle ¹					8,0 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 97 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			87,0	(81,9 - 91,8)
Quartiles 2 et 3 (moyen)			85,5	(80,7 - 89,0)
Quartile 4 (défavorisé)			80,7	(75,2 - 86,1)
Non-réponse partielle ¹				8,0 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			84,8	(79,8 - 89,2)
Quartiles 2 et 3 (moyen)			85,1	(79,2 - 90,4)
Quartile 4 (défavorisé)			82,2	(75,9 - 87,7)
Non-réponse partielle ¹				8,0 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)			81,4	(75,1 - 88,1)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			84,1	(77,5 - 88,9)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			84,3	(80,0 - 88,2)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 97 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p<0,05
Aucun parent			85,8	(82,2 - 88,8)	a
Au moins un parent			70,3	(62,2 - 79,2)	a
Non-réponse partielle ¹					4,6 %
Assurance dentaire privée					p>0,05
Oui			84,6	(79,5 - 88,8)	
Non			83,9	(80,5 - 86,9)	
Non-réponse partielle ¹					7,2 %
Revenu le plus élevé des parents					p>0,05
Moins de 40 000 \$			83,7	(79,8 - 87,4)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			82,7	(76,4 - 88,7)	
75 000 \$ et plus			85,3	(74,1 - 94,1)	
Non-réponse partielle ¹					13,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 97 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade 1 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (144 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					p>0,05
Faible			82,3	(70,4 - 91,9)	
Moyen			83,8	(80,8 - 86,6)	
Élevé			83,0	(75,4 - 89,8)	
Non-réponse partielle ¹					0,2 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées					p>0,05
0 dents			83,4	(79,6 - 86,9)	
1 à 3 dents			81,7	(76,0 - 86,7)	
4 dents et plus			86,1	(79,5 - 91,8)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 98 Proportion des faces cariées au stade de carie 1 à 3 parmi les faces cariées au stade de carie 1 à 6 ou obturées pour cause de carie des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de face et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Type de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Combinées (144 faces)	Lisses	48,7	(43,5 - 53,9)	57,1	80,8	(76,5 - 84,4)	78,5
	Avec puits et fissures	56,0	(51,4 - 59,9)	54,1	73,7	(69,3 - 77,9)	69,5
	Occlusales des molaires	49,1	(44,7 - 52,9)	47,1	65,6	(60,9 - 70,2)	61,9
Temporaire (88 faces)	Lisses	39,5	(34,2 - 44,8)	45,3	50,1	(43,1 - 57,6)	41,9
	Occlusales des molaires	35,2	(30,9 - 39,7)	31,8	35,6	(27,9 - 44,4)	29,4
Permanente (144 faces)	Lisses	96,7	(93,9 - 98,9)	98,2	91,8	(88,3 - 94,6)	90,5
	Avec puits et fissures	85,8	(80,9 - 89,8)	83,9	78,4	(74,3 - 82,2)	75,5
	Occlusales des molaires	83,4	(77,8 - 88,2)	81,4	71,9	(67,5 - 76,4)	70,1

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Besoin de traitement de la carie

Tableau 99 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	12,1	(9,4 - 15,2)	15,1	15,2	(11,2 - 19,5)	13,6
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	12,8*	(9,2 - 16,7)		18,8*	(12,5 - 26,0)	
Féminin	11,4*	(7,7 - 16,2)		11,9*	(7,1 - 17,5)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			p>0,05
Au moins le français	12,8*	(8,8 - 17,5)		16,6*	(11,5 - 21,6)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	8,5*	(5,1 - 12,4)		13,5**	(6,1 - 23,8)	
Ni le français, ni l'anglais	12,5*	(6,9 - 18,7)		13,9**	(5,5 - 24,2)	
Non-réponse partielle ¹			1,3 %			1,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 99 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	12,3**	(4,5 - 23,5)	9,3**	(4,5 - 16,5)
2 enfants	7,6*	(4,7 - 10,9)	18,9*	(11,6 - 27,3)
3 enfants	13,4*	(8,6 - 20,1)	12,4**	(4,8 - 22,4)
4 enfants ou plus	29,2**	(12,6 - 48,9)	15,3**	(5,8 - 26,6)
Non-réponse partielle ¹		2,3 %		2,8 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	21,8**	(8,1 - 42,7)	9,2**	(2,7 - 22,3)
Diplôme d'études secondaires	12,0**	(5,8 - 20,0)	22,4**	(9,7 - 35,8)
Diplôme d'études postsecondaires	10,6*	(7,4 - 14,0)	15,5*	(10,5 - 20,6)
Non-réponse partielle ¹		3,6 %		6,0 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	7,2*	(4,5 - 10,2)	11,4**	(5,4 - 17,7)
Deux parents immigrants récents	29,9**	(12,5 - 50,8)	18,7**	(6,9 - 45,0)
Autres combinaisons	10,4	(7,6 - 13,5)	15,5*	(9,8 - 21,6)
Non-réponse partielle ¹		5,6 %		5,1 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	10,6*	(6,1 - 16,0)	10,9**	(5,7 - 17,5)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	11,3*	(7,7 - 15,7)	18,1*	(11,5 - 26,2)
Quartile 4 (défavorisé)	15,6**	(7,2 - 26,0)	12,3**	(5,5 - 23,0)
Non-réponse partielle ¹		9,2 %		7,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 99 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	7,1**	(2,8 - 13,1)	8,2**	(3,2 - 15,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	11,9*	(7,3 - 17,6)	19,2*	(11,3 - 27,1)
Quartile 4 (défavorisé)	14,5*	(10,1 - 19,5)	13,2*	(7,5 - 20,5)
Non-réponse partielle ¹				
			9,2 %	7,9 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	8,3**	(4,3 - 13,6)	8,7**	(4,1 - 14,4) a
Quartiles 2 et 3 (moyen)	10,4*	(6,3 - 15,3)	23,6*	(13,7 - 34,5) a
Quartile 4 (défavorisé)	16,5*	(10,5 - 23,4)	13,1*	(7,4 - 20,7)
Non-réponse partielle ¹				
			9,2 %	7,9 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	11,4**	(5,1 - 18,1)	17,1**	(9,2 - 28,1)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	5,6**	(1,8 - 11,1) a	15,7**	(8,0 - 24,7)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	15,1	(11,6 - 19,3) a	13,9*	(8,4 - 20,0)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 99 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale						
Aucun parent	10,2*	(7,2 - 13,7)	a	19,0	(13,9 - 24,5)	a
Au moins un parent	23,1**	(13,7 - 36,6)	a	4,9**	(1,1 - 11,6)	a
Non-réponse partielle ¹			6,6 %			6,9 %
Assurance dentaire privée						
Oui	9,3*	(6,2 - 12,8)		13,9*	(8,0 - 20,4)	
Non	14,6*	(9,9 - 19,9)		18,0*	(11,5 - 24,7)	
Non-réponse partielle ¹			7,2 %			8,8 %
Revenu le plus élevé des parents			p>0,05			p>0,05
Moins de 40 000 \$	15,9*	(11,3 - 21,3)		19,0*	(12,1 - 26,8)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	7,7**	(4,1 - 12,2)		9,6**	(4,1 - 16,9)	
75 000 \$ et plus	7,4**	(3,7 - 12,6)		16,7**	(3,5 - 29,5)	
Non-réponse partielle ¹			10,2 %			14,8 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 99 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation des débris						
Faible	14,2**	(4,6 - 31,0)		14,8**	(0,9 - 34,2)	
Moyen	12,5*	(8,8 - 16,9)		12,6*	(8,5 - 16,9)	
Élevé	11,0*	(6,6 - 15,7)		22,6**	(13,3 - 35,8)	
Non-réponse partielle ¹			0,3 %			0,5 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées						
0 dents	15,3	(11,3 - 20,1)	ab	18,7*	(13,2 - 25,0)	
1 à 3 dents	6,3**	(2,8 - 11,1)		9,5**	(3,6 - 16,8)	
4 dents et plus	4,2**	(1,2 - 8,2)		8,1**	(2,2 - 15,7)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 100 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	11,7	(8,9 - 14,8)	14,9	18,6*	(12,2 - 25,6)	12,6
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	12,2*	(8,9 - 16,0)				
Féminin	11,1*	(7,3 - 16,2)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			
Au moins le français	12,2*	(8,4 - 16,7)				
Au moins l'anglais, mais pas le français	7,9*	(4,4 - 11,8)				
Ni le français, ni l'anglais	12,5**	(6,5 - 19,1)				
Non-réponse partielle ¹			1,4 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 100 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	11,5**	(3,7 - 23,2)		
2 enfants	7,5*	(4,6 - 10,7)		
3 enfants	13,0*	(8,1 - 20,0)		
4 enfants ou plus	29,0**	(12,3 - 49,0)		
Non-réponse partielle ¹			2,4 %	
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	22,6**	(8,2 - 43,7)		
Diplôme d'études secondaires	12,2**	(5,8 - 20,5)		
Diplôme d'études postsecondaires	10,1*	(7,0 - 13,6)		
Non-réponse partielle ¹			3,7 %	
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	7,2*	(4,4 - 10,3)		
Deux parents immigrants récents	29,7**	(11,4 - 51,4)		
Autres combinaisons	9,8*	(7,1 - 12,8)		
Non-réponse partielle ¹			5,4 %	
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	9,9**	(5,8 - 15,2)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	11,3*	(7,6 - 15,8)		
Quartile 4 (défavorisé)	14,9**	(6,2 - 25,7)		
Non-réponse partielle ¹			9,2 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 100 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	6,1**	(2,4 - 11,1)	p>0,05	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	11,7*	(7,1 - 17,7)		
Quartile 4 (défavorisé)	14,1*	(9,6 - 19,3)		
Non-réponse partielle ¹				
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	7,9**	(4,0 - 13,1)	p>0,05	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	10,0*	(5,9 - 15,0)		
Quartile 4 (défavorisé)	16,2*	(9,8 - 23,3)		
Non-réponse partielle ¹				
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	11,0**	(4,5 - 17,9)	p<0,05	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	4,9**	(1,2 - 10,1) a		
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	14,8	(11,1 - 19,2) a		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 100 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale			p<0,05		
Aucun parent	9,8*	(6,7 - 13,3)	a		
Au moins un parent	23,4**	(13,5 - 36,5)	a		
Non-réponse partielle ¹			6,8 %		
Assurance dentaire privée			p>0,05		
Oui	8,9*	(5,8 - 12,3)			
Non	14,2*	(9,5 - 19,6)			
Non-réponse partielle ¹			7,5 %		
Revenu le plus élevé des parents			p<0,05		
Moins de 40 000 \$	15,5**	(10,8 - 21,1)	a		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	6,8**	(3,4 - 11,3)	ab		
75 000 \$ et plus	7,4**	(3,5 - 12,6)	b		
Non-réponse partielle ¹			10,5 %		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 100 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				
Faible	15,4**	(3,8 - 35,3)		
Moyen	12,0*	(8,2 - 16,4)		
Élevé	10,9*	(6,3 - 15,8)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 101 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	20,1*	(12,1 - 29,4)	18,6*	12,2*	(8,1 - 16,9)	14,5
Variable sociodémographique						
Sexe						p<0,05
Masculin				18,0*	(10,9 - 27,3)	a
Féminin				8,5**	(3,9 - 14,4)	a
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison						p>0,05
Au moins le français				9,4**	(5,4 - 14,8)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				16,5**	(6,2 - 29,4)	
Ni le français, ni l'anglais				14,0**	(4,9 - 25,5)	
Non-réponse partielle ¹						1,8 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 101 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison					p>0,05
1 enfant			7,2**	(1,7 - 16,4)	
2 enfants			16,0**	(8,5 - 25,2)	
3 enfants			13,4**	(5,7 - 23,8)	
4 enfants ou plus			5,8**	(1,2 - 14,6)	
Non-réponse partielle ¹					3,6 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires			7,8**	(0,0 - 24,3)	
Diplôme d'études secondaires			15,3**	(3,2 - 35,0)	
Diplôme d'études postsecondaires			12,0*	(7,7 - 17,5)	
Non-réponse partielle ¹					7,3 %
Statut d'immigration des parents					p>0,05
Deux parents non-immigrants			10,9**	(4,9 - 18,2)	
Deux parents immigrants récents			18,4**	(5,2 - 53,4)	
Autres combinaisons			11,9**	(6,1 - 19,0)	
Non-réponse partielle ¹					4,8 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			11,0**	(4,7 - 18,5)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			10,9**	(5,7 - 18,0)	
Quartile 4 (défavorisé)			14,3**	(3,8 - 31,8)	
Non-réponse partielle ¹					8,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 101 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			4,6** (0,0 - 13,3)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			13,6** (6,6 - 22,2)	
Quartile 4 (défavorisé)			11,6** (6,3 - 19,5)	
Non-réponse partielle ¹				8,5 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			8,3** (1,9 - 16,5)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			13,2** (6,4 - 23,9)	
Quartile 4 (défavorisé)			12,6** (6,1 - 22,2)	
Non-réponse partielle ¹				8,5 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)			18,6** (9,4 - 30,7)	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			10,1** (4,1 - 19,2)	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			9,6** (4,8 - 16,4)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 101 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p<0,05
Aucun parent			16,2*	(10,5 - 22,9)	a
Au moins un parent			2,9**	(0,3 - 6,4)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Assurance dentaire privée					p>0,05
Oui			9,8**	(4,6 - 16,4)	
Non			15,7*	(8,9 - 23,7)	
Non-réponse partielle ¹					10,3 %
Revenu le plus élevé des parents					p>0,05
Moins de 40 000 \$			15,4*	(8,8 - 23,2)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			8,9**	(2,8 - 18,4)	
75 000 \$ et plus			12,1**	(2,6 - 33,3)	
Non-réponse partielle ¹					16,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 101 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				p>0,05
Faible			14,2** (1,2 - 33,0)	
Moyen			9,2** (5,1 - 14,4)	
Élevé			20,4** (10,5 - 34,2)	
Nombre de dents scellées en dentitions combinées				p>0,05
0 dents			14,1* (8,6 - 20,5)	
1 à 3 dents			9,8** (1,9 - 18,8)	
4 dents et plus			6,7** (0,9 - 17,0)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 102 Proportion des faces cariées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de faces et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Type de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Combinées (144 faces)	Tous les types	12,1	(9,4 - 15,2)	15,1	13,9	(10,2 - 18,0)	12,8
	Lisses	12,8	(9,4 - 16,9)	17,7	20,3*	(14,4 - 26,7)	19,2
	Avec puits et fissures	11,1	(8,5 - 14,1)	12,0	10,3*	(7,0 - 14,1)	9,0
	Occlusales des molaires	10,5	(7,8 - 13,4)	11,9	10,8*	(7,3 - 14,8)	8,9
Temporaire (88 faces)	Lisses	12,6*	(9,2 - 16,7)	17,5	20,6*	(13,4 - 28,1)	15,3
	Occlusales des molaires	10,2	(7,6 - 13,1)	11,5	15,8*†	(9,6 - 22,8)	8,9
Permanente (144 faces)	Tous les types	19,1*	(11,4 - 28,3)	17,4*	10,5*	(6,9 - 14,7)	12,9
	Lisses	33,0**	(9,3 - 62,4)	35,1**	19,8**	(9,7 - 30,7)	27,9
	Avec puits et fissures	17,6*	(10,2 - 26,5)	15,3*	8,2*	(5,0 - 12,1)	9,0
	Occlusales des molaires	13,2**	(6,6 - 21,6)	16,0*	8,3*	(4,9 - 12,4)	8,9

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Niveau de traitement de la carie

Tableau 103 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	87,9	(84,8 - 90,6)	84,9	84,8	(80,5 - 88,8)	86,4
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	87,2	(83,3 - 90,8)		81,2	(74,0 - 87,5)	
Féminin	88,6	(83,8 - 92,3)		88,1	(82,5 - 92,9)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			p>0,05
Au moins le français	87,2	(82,5 - 91,2)		83,4	(78,4 - 88,5)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	91,5	(87,6 - 94,9)		86,5	(76,2 - 93,9)	
Ni le français, ni l'anglais	87,5	(81,3 - 93,1)		86,1	(75,8 - 94,5)	
Non-réponse partielle ¹			1,3 %			1,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 103 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	87,7	(76,5 - 95,5)	90,7	(83,5 - 95,5)
2 enfants	92,4	(89,1 - 95,3)	81,1	(72,7 - 88,4)
3 enfants	86,6	(79,9 - 91,4)	87,6	(77,6 - 95,2)
4 enfants ou plus	70,8	(51,1 - 87,4)	84,7	(73,4 - 94,2)
Non-réponse partielle ¹		2,3 %		2,8 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	78,2	(57,3 - 91,9)	90,8	(77,7 - 97,3)
Diplôme d'études secondaires	88,0	(80,0 - 94,2)	77,6	(64,2 - 90,3)
Diplôme d'études postsecondaires	89,4	(86,0 - 92,6)	84,5	(79,4 - 89,5)
Non-réponse partielle ¹		3,6 %		6,0 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	92,8	(89,8 - 95,5)	88,6	(82,3 - 94,6)
Deux parents immigrants récents	70,1	(49,2 - 87,5)	81,3	(55,0 - 93,1)
Autres combinaisons	89,6	(86,5 - 92,4)	84,5	(78,4 - 90,2)
Non-réponse partielle ¹		5,6 %		5,1 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	89,4	(84,0 - 93,9)	89,1	(82,5 - 94,3)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	88,7	(84,3 - 92,3)	81,9	(73,8 - 88,5)
Quartile 4 (défavorisé)	84,4	(74,0 - 92,8)	87,7	(77,0 - 94,5)
Non-réponse partielle ¹		9,2 %		7,9 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 103 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	92,9	(86,9 - 97,2)	91,8	(84,3 - 96,8)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	88,1	(82,4 - 92,7)	80,8	(72,9 - 88,7)
Quartile 4 (défavorisé)	85,5	(80,5 - 89,9)	86,8	(79,5 - 92,5)
Non-réponse partielle ¹		9,2 %		7,9 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	91,7	(86,4 - 95,7)	91,3	(85,6 - 95,9) a
Quartiles 2 et 3 (moyen)	89,6	(84,7 - 93,7)	76,4	(66,5 - 86,3) a
Quartile 4 (défavorisé)	83,5	(76,6 - 89,5)	86,9	(79,3 - 92,6)
Non-réponse partielle ¹		9,2 %		7,9 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	88,6	(81,9 - 94,9)	82,9	(71,9 - 90,8)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	94,4	(88,9 - 98,2) a	84,3	(75,3 - 92,0)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	84,9	(80,7 - 88,4) a	86,1	(80,0 - 91,6)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 103 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p<0,05			p<0,05
Aucun parent	89,8	(86,3 - 92,8)	a	81,0	(75,5 - 86,1)	a
Au moins un parent	76,9	(63,4 - 86,3)	a	95,1	(88,4 - 98,9)	a
Non-réponse partielle ¹			6,6 %			6,9 %
Assurance dentaire privée			p>0,05			p>0,05
Oui	90,7	(87,2 - 93,8)		86,1	(79,6 - 92,0)	
Non	85,4	(80,1 - 90,1)		82,0	(75,3 - 88,5)	
Non-réponse partielle ¹			7,2 %			8,8 %
Revenu le plus élevé des parents			p>0,05			p>0,05
Moins de 40 000 \$	84,1	(78,7 - 88,7)		81,0	(73,2 - 87,9)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	92,3	(87,8 - 95,9)		90,4	(83,1 - 95,9)	
75 000 \$ et plus	92,6	(87,4 - 96,3)		83,3	(70,5 - 96,5)	
Non-réponse partielle ¹			10,2 %			14,8 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 103 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentitions combinées (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire						
Niveau d'accumulation de débris						
Faible	85,8	(69,0 - 95,4)		85,2	(65,8 - 99,1)	
Moyen	87,5	(83,1 - 91,2)		87,4	(83,1 - 91,5)	
Élevé	89,0	(84,3 - 93,4)		77,4	(64,2 - 86,7)	
Non-réponse partielle ¹			0,3 %			0,5 %
Nombre de dents scellées en dentitions combinées						
0 dents	84,7	(79,9 - 88,7) ab		81,3	(75,0 - 86,8)	
1 à 3 dents	93,7	(88,9 - 97,2) a		90,5	(83,2 - 96,4)	
4 dents et plus	95,8	(91,8 - 98,8) b		91,9	(84,3 - 97,8)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 104 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	88,3	(85,2 - 91,1)	85,1	81,4	(74,4 - 87,8)	87,4
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			
Masculin	87,8	(84,0 - 91,1)				
Féminin	88,9	(83,8 - 92,7)				
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			
Au moins le français	87,8	(83,3 - 91,6)				
Au moins l'anglais, mais pas le français	92,1	(88,2 - 95,6)				
Ni le français, ni l'anglais	87,5	(80,9 - 93,5)				
Non-réponse partielle ¹			1,4 %			
Nombre d'enfants dans la maison			p>0,05			
1 enfant	88,5	(76,8 - 96,3)				
2 enfants	92,5	(89,3 - 95,4)				
3 enfants	87,0	(80,0 - 91,9)				
4 enfants ou plus	71,0	(51,0 - 87,7)				
Non-réponse partielle ¹			2,4 %			
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p>0,05			
Pas de diplôme d'études secondaires	77,4	(56,3 - 91,8)				
Diplôme d'études secondaires	87,8	(79,5 - 94,2)				
Diplôme d'études postsecondaires	89,9	(86,4 - 93,0)				
Non-réponse partielle ¹			3,7 %			

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 104 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	92,8	(89,7 - 95,6)		
Deux parents immigrants récents	70,3	(48,6 - 88,6)		
Autres combinaisons	90,2	(87,2 - 92,9)		
Non-réponse partielle ¹			5,4 %	
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	90,1	(84,8 - 94,2)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	88,7	(84,2 - 92,4)		
Quartile 4 (défavorisé)	85,1	(74,3 - 93,8)		
Non-réponse partielle ¹			9,2 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 104 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	93,9	(88,9 - 97,6)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	88,3	(82,3 - 92,9)		
Quartile 4 (défavorisé)	85,9	(80,7 - 90,4)		
Non-réponse partielle ¹			9,2 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	92,1	(86,9 - 96,0)		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	90,0	(85,0 - 94,1)		
Quartile 4 (défavorisé)	83,8	(76,7 - 90,2)		
Non-réponse partielle ¹			9,2 %	
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	89,0	(82,1 - 95,5)		
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	95,1	(89,9 - 98,8)	a	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	85,2	(80,8 - 88,9)	a	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 104 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	90,2	(86,7 - 93,3) a		
Au moins un parent	76,6	(63,5 - 86,5) a		
Non-réponse partielle ¹			6,8 %	
Assurance dentaire privée				
Oui	91,1	(87,7 - 94,2)		
Non	85,8	(80,4 - 90,5)		
Non-réponse partielle ¹			7,5 %	
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	84,5	(78,9 - 89,2) ab		
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	93,2	(88,7 - 96,6) a		
75 000 \$ et plus	92,6	(87,4 - 96,5) b		
Non-réponse partielle ¹			10,5 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 104 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie en dentition temporaire (88 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Niveau d'accumulation de débris				
Faible	84,6	(64,7 - 96,2)		
Moyen	88,0	(83,6 - 91,8)		
Élevé	89,1	(84,2 - 93,7)		

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 105 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	79,9	(70,6 - 87,9)	81,4	87,8	(83,1 - 91,9)	85,5
Variable sociodémographique						
Sexe						p<0,05
Masculin				82,0	(72,7 - 89,1)	a
Féminin				91,5	(85,6 - 96,1)	a
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison						p>0,05
Au moins le français				90,6	(85,2 - 94,6)	
Au moins l'anglais, mais pas le français				83,5	(70,6 - 93,8)	
Ni le français, ni l'anglais				86,0	(74,5 - 95,1)	
Non-réponse partielle ¹						1,8 %
Nombre d'enfants dans la maison						p>0,05
1 enfant				92,8	(83,6 - 98,3)	
2 enfants				84,0	(74,8 - 91,5)	
3 enfants				86,6	(76,2 - 94,3)	
4 enfants ou plus				94,2	(85,4 - 98,8)	
Non-réponse partielle ¹						3,6 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère						p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires				92,2	(75,7 - 100,0)	
Diplôme d'études secondaires				84,7	(65,0 - 96,8)	
Diplôme d'études postsecondaires				88,0	(82,5 - 92,3)	
Non-réponse partielle ¹						7,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 105 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Statut d'immigration des parents					p>0,05
Deux parents non-immigrants			89,1	(81,8 - 95,1)	
Deux parents immigrants récents			81,6	(46,6 - 94,8)	
Autres combinaisons			88,1	(81,0 - 93,9)	
Non-réponse partielle ¹					4,8 %
Indice régional de défavorisation sociale					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			89,0	(81,5 - 95,3)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			89,1	(82,0 - 94,3)	
Quartile 4 (défavorisé)			85,7	(68,2 - 96,2)	
Non-réponse partielle ¹					8,5 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle					p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			95,4	(86,7 - 100,0)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)			86,4	(77,8 - 93,4)	
Quartile 4 (défavorisé)			88,4	(80,5 - 93,7)	
Non-réponse partielle ¹					8,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 105 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p>0,05
Quartile 1 (favorisé)			91,7	(83,5 - 98,1)
Quartiles 2 et 3 (moyen)			86,8	(76,1 - 93,6)
Quartile 4 (défavorisé)			87,4	(77,8 - 93,9)
Non-réponse partielle ¹				8,5 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p>0,05
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)			81,4	(69,3 - 90,6)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)			89,9	(80,8 - 95,9)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)			90,4	(83,6 - 95,2)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 105 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale					p<0,05
Aucun parent			83,8	(77,1 - 89,5)	a
Au moins un parent			97,1	(93,6 - 99,7)	a
Non-réponse partielle ¹					6,7 %
Assurance dentaire privée					p>0,05
Oui			90,2	(83,6 - 95,4)	
Non			84,3	(76,3 - 91,1)	
Non-réponse partielle ¹					10,3 %
Revenu le plus élevé des parents					p>0,05
Moins de 40 000 \$			84,6	(76,8 - 91,2)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$			91,1	(81,6 - 97,2)	
75 000 \$ et plus			87,9	(66,7 - 97,4)	
Non-réponse partielle ¹					16,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 105 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces) des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris					p>0,05
Faible			85,8	(67,0 - 98,8)	
Moyen			90,8	(85,6 - 94,9)	
Élevé			79,6	(65,8 - 89,5)	
Non-réponse partielle ¹					
Nombre de dents scellées en dentitions combinées					p>0,05
0 dents			85,9	(79,5 - 91,4)	
1 à 3 dents			90,2	(81,2 - 98,1)	
4 dents et plus			93,3	(83,0 - 99,1)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 106 Proportion des faces obturées parmi les faces cariées au stade de carie 4 à 6 ou obturées pour cause de carie des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le type de faces et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Type de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Combinées (144 faces)	Tous les types	87,9	(84,8 - 90,6)	84,9	86,1	(82,0 - 89,8)	87,2
	Lisses	87,2	(83,1 - 90,6)	82,3	79,7	(73,3 - 85,6)	80,8
	Avec puits et fissures	88,9	(85,9 - 91,5)	88,0	89,7	(85,9 - 93,0)	91,0
	Occlusales des molaires	89,5	(86,6 - 92,2)	88,1	89,2	(85,2 - 92,7)	91,1
Temporaire (88 faces)	Tous les types	88,3	(85,2 - 91,1)	85,1	81,4	(74,4 - 87,8)	87,4
	Lisses	87,4	(83,3 - 90,8)	82,5	79,4	(71,9 - 86,6)	84,7
	Occlusales des molaires	89,8	(86,9 - 92,4)	88,5	84,2	(77,2 - 90,4)	91,1
Permanente (144 faces)	Tous les types	80,9	(71,7 - 88,6)	82,6	89,5	(85,3 - 93,1)	87,1
	Lisses	67,0*	(37,6 - 90,7)	64,9	80,2	(69,3 - 90,3)	72,1
	Avec puits et fissures	82,4	(73,5 - 89,8)	84,7	91,8	(87,9 - 95,0)	91,0
	Occlusales des molaires	86,8	(78,4 - 93,4)	84,0	91,7	(87,6-95,1)	91,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Nombre moyen de faces obturées, avec présence simultanée ou non de lésion carieuse

Tableau 107 Nombre moyen de faces obturées pour cause de carie, cariées ou non, des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une face présente ou absente pour cause de carie selon le type de faces et la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Type de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Combinées (128 faces)	Tous les types	5,95†	(5,21 - 6,74)	4,60	2,40	(2,00 - 2,86)	2,51
Combinées (140 faces)	Tous les types	5,96†	(5,22 - 6,76)	4,60	2,44	(2,02 - 2,90)	2,53
	Lisses	3,39†	(2,90 - 3,97)	2,43	0,91	(0,72 - 1,13)	0,95
	Avec puits et fissures	2,57†	(2,30 - 2,84)	2,17	1,53	(1,27 - 1,81)	1,58
	Occlusales des molaires	2,48†	(2,22 - 2,74)	2,07	1,21	(1,01 - 1,44)	1,24
Temporaire (88 faces)	Tous les types	5,67†	(4,98 - 6,44)	4,34	2,26	(1,70 - 2,86)	2,40
	Lisses	3,36†	(2,88 - 3,94)	2,41	1,28	(0,96 - 1,62)	1,31
	Occlusales des molaires	2,31†	(2,06 - 2,56)	1,93	1,08	(0,82 - 1,36)	1,17
Permanente (128 faces)	Tous les types	0,28	(0,20 - 0,36)	0,26	1,31	(1,04 - 1,61)	1,24
Permanente (140 faces)	Tous les types	0,29	(0,21 - 0,37)	0,26	1,34	(1,07 - 1,65)	1,26
	Lisses	0,03**	(0,01 - 0,05)	0,03*	0,29*	(0,19 - 0,40)	0,26
	Avec puits et fissures	0,26	(0,19 - 0,33)	0,24	1,05	(0,84 - 1,29)	1,00
	Occlusales des molaires	0,17	(0,12 - 0,22)	0,14	0,73	(0,59 - 0,89)	0,66
Permanente (144 faces)	Tous les types	0,33	(0,24 - 0,43)	0,32	1,59	(1,27 - 1,97)	1,49
	Lisses	0,03**	(0,01 - 0,05)	0,03*	0,29*	(0,19 - 0,40)	0,26
	Avec puits et fissures	0,31	(0,22 - 0,39)	0,29	1,30	(1,04 - 1,61)	1,23
	Occlusales des molaires	0,22	(0,15 - 0,28)	0,20	0,99	(0,79 - 1,20)	0,89

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Obturations en amalgame et obturations en matériaux esthétiques

Tableau 108 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie parmi ceux ayant au moins une dent présente ou absente pour cause de carie et selon la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Nombre de faces	2 ^e année			p	6 ^e année				
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	
Combinées (140 faces)	0	55,9	(51,4 - 60,4)	59,0	p=0,2856	0	69,8	(63,9 - 75,3)	68,1	p=0,5035
	1 à 4	14,5	(11,2 - 18,2)	15,5		1 à 4	16,1	(12,4 - 20,2)	18,7	
	5 ou plus	29,6	(25,1 - 33,9)	25,6		5 ou plus	14,1	(10,3 - 18,2)	13,1	
Temporaire (88 faces)	0	56,4	(52,0 - 60,9)	60,2	p=0,2757	0	65,1	(56,3 - 73,2)	63,4	
	1 à 4	14,7	(11,3 - 18,3)	14,9		1 ou plus	34,9	(26,8 - 43,7)	36,6	
	5 ou plus	29,0	(24,5 - 33,2)	24,9						
Permanente (140 faces)	0	92,0 [†]	(89,2 - 94,8)	95,2		0	80,1	(75,1 - 84,8)	82,1	
	1 ou plus	8,0 ^{†*}	(5,2 - 10,8)	4,8		1 ou plus	19,9	(15,2 - 24,9)	17,9	

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	55,9	(51,4 - 60,4)	59,0	69,8	(63,9 - 75,3)	68,1
	1 ou plus	44,1	(39,6 - 48,6)	41,0	30,2	(24,7 - 36,1)	31,9
Variable sociodémographique							
Sexe				p>0,05			p>0,05
Masculin	0	56,5	(49,7 - 63,2)		72,0	(63,3 - 79,7)	
	1 ou plus	43,5	(36,8 - 50,3)		28,0*	(20,3 - 36,7)	
Féminin	0	55,2	(48,8 - 61,3)		67,6	(59,9 - 75,1)	
	1 ou plus	44,8	(38,7 - 51,2)		32,4	(24,9 - 40,1)	
Variable de croisement	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p=0,0054			p=0,3856
Au moins le français	0	60,5	(54,3 - 66,7)	a	71,6	(64,2 - 78,1)	
	1 ou plus	39,5	(33,3 - 45,7)	c	28,4	(21,9 - 35,8)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	57,5	(47,4 - 67,1)	b	72,5	(62,0 - 81,7)	
	1 ou plus	42,5	(32,9 - 52,6)	d	27,5*	(18,3 - 38,0)	
Ni le français, ni l'anglais	0	40,0	(28,4 - 52,3)	ab	63,2	(50,8 - 74,4)	
	1 ou plus	60,0	(47,7 - 71,6)	cd	36,8*	(25,6 - 49,2)	
Non-réponse partielle ¹				1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Nombre d'enfants dans la maison				p=0,8672			p=0,0248
1 enfant	0	55,6	(44,2 - 67,1)		74,8	(63,9 - 84,8)	a
	1 ou plus	44,4	(32,9 - 55,8)		25,2*	(15,2 - 36,1)	c
2 enfants	0	55,0	(47,8 - 61,7)		74,6	(67,3 - 81,5)	b
	1 ou plus	45,0	(38,3 - 52,2)		25,4	(18,5 - 32,7)	d
3 enfants	0	53,2	(44,4 - 62,0)		65,2	(53,5 - 76,4)	
	1 ou plus	46,8	(38,0 - 55,6)		34,8*	(23,6 - 46,5)	
4 enfants ou plus	0	61,5	(42,3 - 79,7)		50,5*	(31,3 - 68,3)	ab
	1 ou plus	38,5*	(20,3 - 57,7)		49,5*	(31,7 - 68,7)	cd
Non-réponse partielle ¹				3,1 %			2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				p=0,0284			p=0,2007
Pas de diplôme d'études secondaires	0	53,5*	(32,7 - 73,7)		57,2*	(37,9 - 78,1)	
	1 ou plus	46,5*	(26,3 - 67,3)		42,8*	(21,9 - 62,1)	
Diplôme d'études secondaires	0	38,6*	(26,6 - 52,3)	a	72,8	(60,8 - 84,7)	
	1 ou plus	61,4	(47,7 - 73,4)	b	27,2*	(15,3 - 39,2)	
Diplôme d'études postsecondaires	0	57,9	(53,2 - 62,6)	a	72,5	(66,6 - 78,0)	
	1 ou plus	42,1	(37,4 - 46,8)	b	27,5	(22,0 - 33,4)	
Non-réponse partielle ¹				4,5 %			5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents		p=0,1108		p=0,0354	
Deux parents non-immigrants	0	58,0	(50,4 - 65,7)	76,1	(68,4 - 83,2) a
	1 ou plus	42,0	(34,3 - 49,6)	23,9*	(16,8 - 31,6) b
Deux parents immigrants récents	0	65,5	(47,8 - 81,2)	76,7	(58,9 - 93,3)
	1 ou plus	34,5*	(18,8 - 52,2)	23,3**	(6,7 - 41,1)
Autres combinaisons	0	49,7	(43,4 - 56,1)	63,5	(55,2 - 71,4) a
	1 ou plus	50,3	(43,9 - 56,6)	36,5	(28,6 - 44,8) b
Non-réponse partielle ¹		5,4 %		6,7 %	
Indice régional de défavorisation sociale		p=0,8961		p=0,8070	
Quartile 1 (favorisé)	0	53,9	(45,5 - 62,3)	72,4	(64,9 - 79,6)
	1 ou plus	46,1	(37,7 - 54,5)	27,6	(20,4 - 35,1)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	56,4	(49,7 - 63,4)	69,2	(60,4 - 77,6)
	1 ou plus	43,6	(36,6 - 50,3)	30,8	(22,4 - 39,6)
Quartile 4 (défavorisé)	0	54,8	(42,2 - 68,6)	70,1	(57,4 - 81,2)
	1 ou plus	45,2	(31,4 - 57,8)	29,9*	(18,8 - 42,6)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %		
Variable socioéconomique								
Indice régional de défavorisation matérielle			p=0,0241				p=0,0026	
Quartile 1 (favorisé)	0	67,7	(58,9 - 75,8)		ab	84,1	(75,1 - 92,2)	
	1 ou plus	32,3	(24,2 - 41,1)		cd	15,9**	(7,8 - 24,9)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	50,3	(42,7 - 57,8)		a	68,2	(60,1 - 75,4)	
	1 ou plus	49,7	(42,2 - 57,3)		c	31,8	(24,6 - 39,9)	
Quartile 4 (défavorisé)	0	52,9	(43,1 - 63,4)		b	63,5	(53,9 - 73,2)	
	1 ou plus	47,1	(36,6 - 56,9)		d	36,5	(26,8 - 46,1)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %				7,6 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p=0,6136				p=0,1379	
Quartile 1 (favorisé)	0	57,9	(49,3 - 66,3)			75,2	(67,4 - 82,4)	
	1 ou plus	42,1	(33,7 - 50,7)			24,8*	(17,6 - 32,6)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	55,4	(48,2 - 62,6)			71,7	(62,2 - 80,2)	
	1 ou plus	44,6	(37,4 - 51,8)			28,3*	(19,8 - 37,8)	
Quartile 4 (défavorisé)	0	52,0	(42,4 - 62,2)			63,5	(53,3 - 73,2)	
	1 ou plus	48,0	(37,8 - 57,6)			36,5	(26,8 - 46,7)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %				7,6 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])		p=0,8937		p=0,0448	
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (très favorisé)	0	57,0	(48,5 - 66,6)	80,5	(70,5 - 88,6) ab
	1 ou plus	43,0	(33,4 - 51,5)	19,5*	(11,4 - 29,5) cd
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	56,7	(47,5 - 65,8)	66,4	(54,6 - 76,4) a
	1 ou plus	43,3	(34,2 - 52,5)	33,6*	(23,6 - 45,4) c
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	54,7	(48,0 - 61,5)	64,5	(55,2 - 73,1) b
	1 ou plus	45,3	(38,5 - 52,0)	35,5	(26,9 - 44,8) d

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
				p>0,05	
Aucun parent	0	56,9	(52,7 - 61,5)	74,9	(69,2 - 80,3) a
	1 ou plus	43,1	(38,5 - 47,3)	25,1	(19,7 - 30,8) b
Au moins un parent	0	49,4*	(30,8 - 66,3)	39,0*	(23,8 - 56,8) a
	1 ou plus	50,6*	(33,7 - 69,2)	61,0	(43,2 - 76,2) b
Non-réponse partielle ¹				4,5 %	
				5,2 %	
Assurance dentaire privée					
				p>0,05	
Oui	0	54,9	(49,1 - 60,2)	73,8	(66,9 - 80,6)
	1 ou plus	45,1	(39,8 - 50,9)	26,2	(19,4 - 33,1)
Non	0	56,5	(48,7 - 64,6)	68,1	(60,8 - 74,7)
	1 ou plus	43,5	(35,4 - 51,3)	31,9	(25,3 - 39,2)
Non-réponse partielle ¹				6,7 %	
				7,4 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 109 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en amalgame pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable buccodentaire							
Niveau d'accumulation de débris		p=0,0063			p=0,2075		
Faible	0	75,5	(59,5 - 91,6)	ab	81,4	(68,8 - 93,1)	
	1 ou plus	24,5**	(8,4 - 40,5)	cd	18,6**	(6,9 - 31,2)	
Moyen	0	57,6	(52,1 - 62,9)	a	68,7	(62,4 - 74,3)	
	1 ou plus	42,4	(37,1 - 47,9)	c	31,3	(25,7 - 37,6)	
Élevé	0	44,6	(33,4 - 55,7)	b	67,5	(52,3 - 81,7)	
	1 ou plus	55,4	(44,3 - 66,6)	d	32,5*	(18,3 - 47,7)	
Non-réponse partielle ¹		0,2 %			0,4 %		
Nombre de dents scellées en dentitions combinées		p=0,0087			p=0,2051		
0 dents	0	60,1	(54,3 - 65,9)	a	66,7	(58,7 - 73,9)	
	1 ou plus	39,9	(34,1 - 45,7)	b	33,3	(26,1 - 41,3)	
1 à 3 dents	0	37,5*	(24,9 - 45,7)	a	70,9	(59,6 - 81,2)	
	1 ou plus	62,5	(50,0 - 75,1)	b	29,1*	(18,8 - 40,4)	
4 dents et plus	0	52,4	(39,7 - 66,2)		75,4	(67,4 - 83,5)	
	1 ou plus	47,6	(33,8 - 60,3)		24,6*	(16,5 - 32,6)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 110 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie parmi ceux ayant au moins une dent présente ou absente pour cause de carie et selon la dentition, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année			
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Combinées (140 faces)	0	88,2	(84,9 - 91,2)	85,9	0	81,9	(77,7 - 86,0)	79,0
	1 ou plus	11,8	(8,8 - 15,1)	14,1	1 à 4	18,1	(14,0 - 22,3)	21,0
Temporaire (88 faces)	0	90,9	(88,1 - 93,5)	89,4	0	90,5	(85,8 - 95,4)	91,9
	1 ou plus	9,1*	(6,5 - 11,9)	10,6	1 ou plus	9,5*	(4,6 - 14,2)	8,1
Permanente (140 faces)	0	96,3	(94,4 - 98,0)	95,4	0	84,4	(80,9 - 88,0)	82,1
	1 ou plus	3,7*	(2,0 - 5,6)	4,6	1 ou plus	15,6	(12,0 - 19,1)	17,9

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	0	88,2	(84,9 - 91,2)	85,9	81,9	(77,7 - 86,0)	79,0
Variable sociodémographique							
Sexe				p>0,05			p>0,05
Masculin	0	90,2	(86,3 - 93,9)		82,6	(76,9 - 88,1)	
	1 ou plus	9,8*	(6,1 - 13,7)		17,4*	(11,9 - 23,1)	
Féminin	0	86,1	(80,8 - 90,6)		81,2	(75,3 - 87,1)	
	1 ou plus	13,9*	(9,4 - 19,2)		18,8*	(12,9 - 24,7)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison				p=0,0383			p=0,4174
Au moins le français	0	91,6	(87,8 - 95,1)	a	79,7	(72,1 - 86,9)	
	1 ou plus	8,4*	(4,9 - 12,2)	b	20,3*	(13,1 - 27,9)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	0	82,2	(73,1 - 90,2)	a	85,7	(80,0 - 91,7)	
	1 ou plus	17,8*	(9,8 - 26,9)	b	14,3*	(8,3 - 20,0)	
Ni le français, ni l'anglais	0	84,0	(76,8 - 90,9)		80,4	(71,5 - 89,0)	
	1 ou plus	16,0*	(9,1 - 23,2)		19,6*	(11,0 - 28,5)	
Non-réponse partielle ¹				1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison		p=0,5443		p=0,8550	
1 enfant	0	83,9	(75,4 - 92,7)	83,1	(74,0 - 91,2)
	1 ou plus	16,1**	(7,3 - 24,6)	16,9*	(8,8 - 26,0)
2 enfants	0	87,6	(82,5 - 91,8)	80,5	(73,7 - 87,4)
	1 ou plus	12,4*	(8,2 - 17,5)	19,5*	(12,6 - 26,3)
3 enfants	0	90,9	(84,9 - 96,4)	82,2	(73,3 - 90,9)
	1 ou plus	9,1**	(3,6 - 15,1)	17,8*	(9,1 - 26,7)
4 enfants ou plus	0	87,6	(74,3 - 98,2)	85,5	(72,7 - 97,0)
	1 ou plus	12,4**	(1,8 - 25,7)	14,5**	(3,0 - 27,3)
Non-réponse partielle ¹		3,1 %		2,7 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	0	86,5	(72,7 - 97,8)	90,0	(78,0 - 99,0)
	1 ou plus	13,5**	(2,2 - 27,3)	10,0**	(1,0 - 22,0)
Diplôme d'études secondaires	0	84,2	(73,5 - 94,3)	82,6	(72,1 - 93,1)
	1 ou plus	15,8**	(5,7 - 26,5)	17,4**	(6,9 - 27,9)
Diplôme d'études postsecondaires	0	88,6	(84,9 - 91,8)	80,4	(75,1 - 85,7)
	1 ou plus	11,4*	(8,2 - 15,1)	19,6	(14,3 - 24,9)
Non-réponse partielle ¹			4,5 %		5,6 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	0	87,2	(81,5 - 92,2)	78,2	(69,3 - 87,3)
	1 ou plus	12,8*	(7,8 - 18,5)	21,8*	(12,7 - 30,7)
Deux parents immigrants récents	0	91,9	(82,5 - 99,1)	n.p.	n.p.
	1 ou plus	8,1**	(0,9 - 17,5)	n.p.	n.p.
Autres combinaisons	0	88,0	(83,4 - 92,3)	82,4	(77,5 - 87,6)
	1 ou plus	12,0*	(7,7 - 16,6)	17,6	(12,4 - 22,5)
Non-réponse partielle ¹			5,4 %		6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation sociale		p=0,1241		p=0,8895	
Quartile 1 (favorisé)	0	92,4	(87,3 - 96,7)	80,6	(74,3 - 86,7)
	1 ou plus	7,6**	(3,3 - 12,7)	19,4*	(13,3 - 25,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	88,0	(83,2 - 92,4)	82,4	(74,4 - 89,2)
	1 ou plus	12,0*	(7,6 - 16,8)	17,6*	(10,8 - 25,6)
Quartile 4 (défavorisé)	0	82,6	(72,1 - 91,6)	83,4	(71,2 - 95,7)
	1 ou plus	17,4**	(8,4 - 27,9)	16,6**	(4,3 - 28,8)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %	
Indice régional de défavorisation matérielle		p=0,0994		p=0,1878	
Quartile 1 (favorisé)	0	88,3	(80,6 - 95,4)	87,5	(79,3 - 94,1)
	1 ou plus	11,7**	(4,6 - 19,4)	12,5**	(5,9 - 20,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	91,8	(87,6 - 95,8)	78,7	(71,7 - 85,7)
	1 ou plus	8,2*	(4,2 - 12,4)	21,3*	(14,3 - 28,3)
Quartile 4 (défavorisé)	0	83,4	(76,6 - 89,8)	81,9	(73,9 - 89,1)
	1 ou plus	16,6*	(10,2 - 23,4)	18,1*	(10,9 - 26,1)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale		p=0,2062		p=0,7677	
Quartile 1 (favorisé)	0	92,1	(86,3 - 96,8)	80,7	(74,3 - 86,8)
	1 ou plus	7,9**	(3,2 - 13,7)	19,3*	(13,2 - 25,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	0	88,2	(82,2 - 93,6)	83,8	(75,4 - 91,2)
	1 ou plus	11,8*	(6,4 - 17,8)	16,2*	(8,8 - 24,6)
Quartile 4 (défavorisé)	0	84,5	(76,8 - 90,9)	81,0	(72,9 - 89,2)
	1 ou plus	15,5*	(9,1 - 23,2)	19,0*	(10,8 - 27,1)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %	
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])		p=0,0794		p=0,2812	
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	0	83,7	(76,0 - 90,6)	83,2	(77,2 - 89,1)
	1 ou plus	16,3*	(9,4 - 24,0)	16,8*	(10,9 - 22,8)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	0	92,8	(87,9 - 97,3)	77,2	(66,9 - 86,9)
	1 ou plus	7,2**	(2,7 - 12,1)	22,8*	(13,1 - 33,1)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	0	88,2	(83,8 - 92,4)	84,6	(78,5 - 90,4)
	1 ou plus	11,8*	(7,6 - 16,2)	15,4*	(9,6 - 21,5)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	0	87,9	(84,4 - 91,3)	82,3	(77,8 - 87,0)
	1 ou plus	12,1	(8,7 - 15,6)	17,7	(13,0 - 22,2)
Au moins un parent	0	89,3	(80,3 - 96,9)	79,8	(64,7 - 92,5)
	1 ou plus	10,7**	(3,1 - 19,7)	20,2**	(7,5 - 35,3)
Aucun parent	0	87,9	(84,4 - 91,3)	82,3	(77,8 - 87,0)
	1 ou plus	12,1	(8,7 - 15,6)	17,7	(13,0 - 22,2)
Non-réponse partielle ¹			5,2 %		4,5 %
Assurance dentaire privée					
Oui	0	88,2	(82,9 - 92,8)	79,9	(73,9 - 86,1)
	1 ou plus	11,8*	(7,2 - 17,1)	20,1	(13,9 - 26,1)
Non	0	88,0	(83,0 - 92,5)	84,1	(78,5 - 89,7)
	1 ou plus	12,0*	(7,5 - 17,0)	15,9*	(10,3 - 21,5)
Non-réponse partielle ¹			7,4 %		6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	0	87,0	(81,5 - 91,9)	86,4	(81,3 - 91,1)
	1 ou plus	13,0*	(8,1 - 18,5)	13,6*	(8,9 - 18,7)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	0	87,7	(80,9 - 93,5)	75,8	(65,2 - 85,6)
	1 ou plus	12,3*	(6,5 - 19,2)	24,2*	(14,4 - 34,8)
75 000 \$ et plus	0	88,6	(80,2 - 95,7)	85,1	(75,1 - 93,9)
	1 ou plus	11,4**	(4,3 - 19,8)	14,9**	(6,1 - 24,9)
Non-réponse partielle ¹			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 111 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie en dentitions combinées (140 faces) selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire					
Niveau d'accumulation de débris		p=0,8204		p=0,3281	
Faible	0	84,5	(62,4 - 100,0)	89,8	(79,7 - 98,3)
	1 ou plus	15,5**	(0,0 - 37,6)	10,2**	(1,7 - 20,3)
Moyen	0	89,0	(85,2 - 92,4)	81,4	(76,8 - 86,2)
	1 ou plus	11,0*	(7,6 - 14,8)	18,6	(13,8 - 23,2)
Élevé	0	88,0	(80,5 - 94,4)	78,5	(64,9 - 90,1)
	1 ou plus	12,0**	(5,6 - 19,5)	21,5**	(9,9 - 35,1)
Non-réponse partielle ¹		0,2 %		0,4 %	
Nombre de dents scellées en dentitions combinées		p=0,8850		P=0,0267	
0 dents	0	88,6	(85,0 - 92,0)	83,4	(77,5 - 89,0)
	1 ou plus	11,4*	(8,0 - 15,0)	16,6*	(11,0 - 22,5)
1 à 3 dents	0	86,5	(77,4 - 95,6)	71,9	(59,9 - 83,0) a
	1 ou plus	13,5**	(4,4 - 22,6)	28,1*	(17,0 - 40,1) b
4 dents et plus	0	87,6	(78,2 - 95,6)	87,0	(80,5 - 93,0) a
	1 ou plus	12,4**	(4,4 - 21,8)	13,0*	(7,0 - 19,5) b

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 112 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales obturées en amalgame pour cause de carie des molaires selon la dentition choisie parmi ceux ayant au moins une dent de la dentition concernée présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Nombre de faces	2 ^e année			p=0,1548	6 ^e année			p=0,3187
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)		Nombre de faces	%	I.C. à 95 %	
Combinées (140 faces)	0	56,1	(51,6 - 60,6)	59,4	0	70,8	(65,0 - 76,2)	69,5	
	1 à 4	24,5	(20,5 - 29,1)	25,5		1 à 2	14,4	(10,6 - 18,6)	17,7
	5 ou plus	19,5	(15,1 - 23,6)	15,1		3 ou plus	14,8	(10,5 - 19,5)	12,8
Permanente (140 faces)	0	93,1†	(90,6 - 95,6)	96,0	0	81,2	(76,4 - 85,7)	84,0	
	1 ou plus	6,9†*	(4,4 - 9,4)	4,0		1 ou plus	18,8	(14,3 - 23,6)	16,0

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 113 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de faces occlusales obturées en matériaux esthétiques pour cause de carie des molaires selon la dentition choisie parmi ceux ayant au moins une dent de la dentition concernée présente ou absente pour cause de carie, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Dentition	Nombre de faces	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Combinées (140 faces)	0	92,8†	(90,0 - 95,2)	88,5	84,8	(81,0 - 88,5)	82,2
	1 ou plus	7,2†*	(4,8 - 10,0)	11,5	15,2	(11,5 - 19,0)	17,8
Permanente (140 faces)	0	96,8	(95,0 - 98,4)	96,6	86,4	(82,8 - 89,9)	85,0
	1 ou plus	3,2**	(1,6 - 5,0)	3,4	13,6	(10,1 - 17,2)	15,0

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Besoin évident de traitement lié à la carie (BET)

Tableau 114 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	19,0	(15,3 - 22,8)	16,7	12,0	(8,5 - 15,9)	10,1
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	20,0	(14,5 - 25,9)		16,4*	(10,8 - 22,3)	a
Féminin	18,0	(13,6 - 22,3)		7,6*	(3,9 - 11,5)	a
Groupe d'âge de la mère			p>0,05			p>0,05
Moins de 35 ans	24,8*	(16,6 - 35,3)		7,5**	(2,4 - 21,4)	
35 ans et plus	17,3	(13,3 - 22,2)		11,8*	(8,5 - 16,1)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,1407			p=0,4797
Au moins le français	18,4*	(13,1 - 24,4)		10,3*	(5,9 - 15,1)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	13,1*	(7,5 - 19,1)		10,7**	(4,0 - 18,6)	
Ni le français, ni l'anglais	26,6*	(15,3 - 38,7)		15,8**	(7,5 - 25,1)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 114 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Nombre d'enfants dans la maison			p=0,0120			p=0,1366
1 enfant	14,8**	(6,3 - 24,0)	a	7,2**	(2,0 - 13,9)	
2 enfants	14,0*	(8,4 - 19,8)	bc	11,8*	(7,1 - 17,1)	
3 enfants	27,2*	(19,1 - 36,0)	b	9,3**	(2,7 - 17,4)	
4 enfants ou plus	33,4*	(17,7 - 50,2)	ac	23,6**	(8,4 - 40,0)	
Non-réponse partielle ¹			3,1 %			2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p=0,0747			p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	29,1**	(13,2 - 47,8)		n.p.	n.p.	
Diplôme d'études secondaires	31,6*	(16,8 - 46,8)		18,7**	(6,5 - 32,3)	
Diplôme d'études postsecondaires	16,0	(11,9 - 20,3)		11,0*	(7,2 - 15,1)	
Non-réponse partielle ¹			4,5 %			5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 114 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	14,9*	(9,5 - 20,7)	5,7**	(1,9 - 9,9) a
Deux parents immigrants récents	30,0**	(15,9 - 49,0)	27,6**	(9,7 - 47,7) a
Autres combinaisons	18,7	(13,3 - 24,2)	12,7*	(7,4 - 18,7)
Non-réponse partielle ¹		5,4 %		6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	19,7*	(13,2 - 27,0)	8,4**	(3,6 - 13,9)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	17,1*	(11,5 - 23,0)	14,8*	(9,5 - 20,4)
Quartile 4 (défavorisé)	22,0**	(11,4 - 35,0)	9,0**	(0,9 - 19,8)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 114 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
			p=0,0321			p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	10,6**	(4,2 - 18,5)	a	n.p.	n.p.	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	19,0*	(13,2 - 25,5)		14,7*	(8,8 - 21,1)	
Quartile 4 (défavorisé)	25,3	(17,7 - 33,3)	a	15,4*	(7,9 - 23,7)	
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale						
			p=0,2649			p=0,0137
Quartile 1 (favorisé)	15,2*	(9,2 - 21,6)		5,5**	(1,9 - 9,8)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	18,2*	(11,2 - 25,0)		15,5*	(9,5 - 21,8)	a
Quartile 4 (défavorisé)	23,9*	(15,5 - 33,6)		14,6*	(7,4 - 21,9)	b
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])						
			p=0,0960			p=0,6132
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	18,3*	(9,7 - 26,9)		10,3**	(4,0 - 18,9)	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	13,2**	(6,4 - 21,0)		14,8**	(7,4 - 23,5)	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	23,2	(18,3 - 28,1)		11,0*	(5,8 - 16,6)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 114 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p<0,05			p=n.p.
Aucun parent	15,3	(11,5 - 19,4)	a	11,5*	(7,9 - 15,6)	
Au moins un parent	41,2*	(27,3 - 57,1)	a	n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle ¹			5,2 %			4,5 %
Assurance dentaire privée			p>0,05			p>0,05
Oui	15,5*	(10,3 - 20,9)		8,9*	(4,6 - 13,2)	
Non	22,9	(16,5 - 29,6)		13,5*	(7,8 - 19,8)	
Non-réponse partielle ¹			7,4 %			6,7 %
Revenu le plus élevé des parents			p=0,0038			p=0,0100
Moins de 40 000 \$	26,3	(20,0 - 32,9)	a	17,2*	(11,2 - 23,4)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	11,0**	(4,5 - 18,5)	a	8,2**	(2,2 - 14,9)	a
75 000 \$ et plus	15,7*	(8,6 - 23,6)		6,2**	(0,5 - 13,4)	b
Non-réponse partielle ¹			10,9 %			13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 114 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin évident de traitement lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	16,4	(12,5 - 21,3)	9,7*	(6,4 - 14,5)
Une fois par jour et moins	25,9	(19,2 - 33,9)	14,8*	(9,6 - 22,1)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	17,3*	(10,4 - 27,4)	8,2**	(4,3 - 15,1)
Non	18,9	(15,0 - 23,4)	13,2*	(9,7 - 17,6)
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	16,3	(12,5 - 21,0)	6,3**	(6,4 - 13,3)
Plus d'une fois par jour	21,6**	(11,1 - 37,7)	10,3**	(3,0 - 29,7)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	32,6**	(17,7 - 52,1)	14,4**	(5,0 - 35,0)
Non	17,9	(13,8 - 22,9)	14,0**	(5,0 - 35,0)
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	17,3	(13,4 - 22,1)	8,9*	(5,9 - 13,1)
Plus d'un an	26,4*	(17,5 - 37,6)	21,3*	(13,0 - 33,0)

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 115 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	3,7*	(1,9 - 5,7)	2,6*	n.p.	n.p.	2,0*
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0.05			p=n.p.
Masculin	2,9**	(0,7 - 5,6)		n.p.	n.p.	
Féminin	4,5**	(2,1 - 7,2)		n.p.	n.p.	
Groupe d'âge de la mère			p>0.05			p=n.p.
Moins de 35 ans	3,9**	(1,5 - 9,6)		n.p.	n.p.	
35 ans et plus	3,9**	(2,2 - 6,8)		n.p.	n.p.	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,3556			p=n.p.
Au moins le français	2,3**	(0,5 - 4,7)		n.p.	n.p.	
Au moins l'anglais, mais pas le français	5,0**	(0,7 - 10,4)		n.p.	n.p.	
Ni le français, ni l'anglais	5,5**	(1,0 - 10,9)		n.p.	n.p.	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 115 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
				p=n.p.
1 enfant	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
2 enfants	3,3**	(0,8 - 6,2)	n.p.	n.p.
3 enfants	6,2**	(1,6 - 12,0)	n.p.	n.p.
4 enfants ou plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				3,1 %
				2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
				p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	15,8**	(3,6 - 30,2)	n.p.	n.p.
Diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études postsecondaires	2,4**	(0,9 - 4,3)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				4,5 %
				5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 115 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	3,9**	(0,5 - 7,9)	n.p.	n.p.
Deux parents immigrants récents	7,6**	(0,5 - 17,3)	n.p.	n.p.
Autres combinaisons	2,8**	(0,8 - 5,1)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹		5,4 %		6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	4,1**	(0,6 - 8,6)	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	3,7**	(1,2 - 6,5)	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 115 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	2,1**	(0,2 - 4,3)	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	5,3**	(0,9 - 10,7)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %	7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	3,2**	(0,3 - 6,5)	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,3**	(0,7 - 8,3)	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	3,3**	(0,6 - 6,6)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %	7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	4,4**	(0,8 - 8,4)	n.p.	n.p.
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	5,1**	(2,2 - 9,0)	n.p.	n.p.

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 115 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	3,1**	(1,3 - 5,1)	n.p.	n.p.
Au moins un parent	9,5**	(2,6 - 18,3)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			5,2 %	4,5 %
Assurance dentaire privée				
Oui	2,4**	(0,5 - 4,9)	n.p.	n.p.
Non	5,6**	(2,2 - 9,5)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			7,4 %	6,7 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	5,6**	(2,3 - 9,5)	n.p.	n.p.
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
75 000 \$ et plus	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			10,9 %	13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 115 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant un besoin de traitement urgent lié à la carie selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95%	%	I.C. à 95%
Variable buccodentaire				
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	3,2**	(1,8 - 5,7)	n.p.	n.p.
Une fois par jour et moins	4,9**	(2,4 - 9,9)	n.p.	n.p.
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	3,8**	(1,0 - 13,6)	n.p.	n.p.
Non	3,7**	(2,1 - 6,2)	n.p.	n.p.
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	3,2**	(1,8 - 5,9)	n.p.	n.p.
Plus d'une fois par jour	6,6**	(1,8 - 21,0)	n.p.	n.p.
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	5,3**	(0,7 - 32,0)	n.p.	n.p.
Non	3,0**	(1,8 - 5,2)	n.p.	n.p.
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	3,5**	(2,0 - 6,2)	n.p.	n.p.
Plus d'un an	3,4**	(0,9 - 12,0)	n.p.	n.p.

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Annexe 4

Agents de scellement de puits et fissures

Tableau 116 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire scellée parmi ceux ayant une dent temporaire présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
%	I.C. à 95 %	Reste du Québec	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec
3,5**	(1,7 - 5,4)	1,6*	n.p.	n.p.	1,6*

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 117 Nombre moyen de dents temporaires scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent temporaire scellée, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
2,60**	(1,35 - 4,32)	2,51	n.p.	n.p.	2,36

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présenté qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 118 Proportion des premières et deuxièmes molaires parmi les dents temporaires scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents temporaires	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Premières molaires	39,5*	(18,6 - 50,5)	31,8*	n.p.	n.p.	25,5**
Deuxième molaires	60,5	(49,5 - 81,4)	68,2	n.p.	n.p.	74,5

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 119 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	27,8 [†]	(23,2 - 32,3)	40,8	46,6 [†]	(41,5 - 51,3)	61,8
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	24,7	(18,2 - 32,0)		49,8	(43,6 - 55,6)	
Féminin	30,9	(24,6 - 37,3)		43,4	(35,1 - 51,3)	
Groupe d'âge de la mère			p>0,05			p<0,05
Moins de 35 ans	23,9*	(16,0 - 34,1)		29,4**	(17,2 - 45,6)	
35 ans et plus	29,6	(25,1 - 34,6)		47,4	(42,1 - 52,9)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,9675			p<0,0001
Au moins le français	28,0	(22,0 - 34,0)		46,8	(39,5 - 53,5)	a
Au moins l'anglais, mais pas le français	28,5*	(19,4 - 38,7)		60,6	(49,3 - 71,0)	b
Ni le français, ni l'anglais	26,9*	(17,7 - 35,8)		26,8	(18,4 - 35,2)	ab
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 119 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
				p=0,9089
1 enfant	29,3*	(19,2 - 39,3)	53,0	(41,6 - 64,8)
2 enfants	28,5	(22,0 - 35,1)	48,6	(41,4 - 55,4)
3 enfants	25,4	(17,6 - 33,4)	38,9	(27,1 - 50,0)
4 enfants ou plus	26,5**	(10,4 - 44,0)	46,4*	(29,0 - 62,9)
Non-réponse partielle ¹		3,1 %		2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				p=0,0015
				p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	21,7**	(10,0 - 36,0) a
Diplôme d'études secondaires	29,6*	(16,8 - 42,7)	39,7*	(25,2 - 52,3)
Diplôme d'études postsecondaires	29,9	(25,0 - 35,1)	52,4	(45,3 - 58,8) a
Non-réponse partielle ¹		4,5 %		5,6 %
Plus haut niveau de scolarité entre les parents				p=0,0011
				p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	16,2**	(3,1 - 31,1) a
Diplôme d'études secondaires	22,9**	(11,2 - 36,8)	36,1*	(21,7 - 51,6)
Diplôme d'études postsecondaires	29,7	(25,0 - 34,4)	51,7	(45,4 - 57,8) a
Non-réponse partielle ¹		3,5 %		3,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 119 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	32,4	(24,3 - 40,2)	59,1	(49,3 - 68,1) ab
Deux parents immigrants récents	23,1**	(9,3 - 38,0)	28,6**	(11,4 - 45,6) a
Autres combinaisons	26,5	(20,5 - 33,4)	42,3	(35,3 - 49,2) b
Non-réponse partielle ¹		5,4 %		6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	26,8	(19,5 - 35,5)	54,1	(44,8 - 63,6) ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	29,1	(23,2 - 35,4)	41,6	(35,1 - 47,4) a
Quartile 4 (défavorisé)	21,3*	(12,7 - 30,6)	38,2*	(22,6 - 52,0) b
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 119 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle			p<0,0001			p<0,0001
Quartile 1 (favorisé)	45,4	(35,3 - 57,8)	ab	64,1	(52,8 - 75,5)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	21,5	(16,3 - 26,7)	a	46,0	(37,8 - 54,0)	ac
Quartile 4 (défavorisé)	20,3*	(12,8 - 27,9)	b	31,2	(23,2 - 39,8)	bc
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p=0,0014			p<0,0001
Quartile 1 (favorisé)	37,7	(29,3 - 47,3)	ab	59,1	(48,6 - 68,8)	ab
Quartiles 2 et 3 (moyen)	19,5*	(13,3 - 26,3)	a	45,8	(38,4 - 52,7)	ac
Quartile 4 (défavorisé)	22,4*	(15,3 - 29,7)	b	28,8*	(19,6 - 37,5)	bc
Non-réponse partielle ¹			9,9 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p=0,0601			p=0,0002
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	35,2	(27,2 - 44,7)		57,2	(46,5 - 67,4)	a
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	29,2*	(18,8 - 39,6)		54,1	(43,7 - 64,1)	b
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	21,8	(16,0 - 28,2)		32,9	(25,8 - 39,4)	ab

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 119 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p<0,05			p<0,05
Aucun parent	29,8	(24,8 - 34,8)	a	50,7	(45,3 - 55,7)	a
Au moins un parent	12,0**	(2,5 - 23,3)	a	17,1**	(5,2 - 30,9)	a
Non-réponse partielle ¹			5,2 %			4,5 %
Assurance dentaire privée			p<0,05			p<0,05
Oui	35,8	(28,5 - 43,1)	a	62,5	(55,1 - 69,7)	a
Non	21,7	(15,4 - 28,4)	a	32,7	(25,8 - 39,7)	a
Non-réponse partielle ¹			7,4 %			6,7 %
Revenu le plus élevé des parents			p=0,0002			p<0,0001
Moins de 40 000 \$	17,4*	(11,8 - 23,2)	ab	29,0	(21,1 - 36,6)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	34,1	(24,2 - 44,7)	a	56,4	(46,6 - 65,8)	ac
75 000 \$ et plus	42,2	(30,5 - 54,0)	b	70,5	(60,1 - 81,4)	bc
Non-réponse partielle ¹			10,9 %			13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 119 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	32,7	(27,1 - 38,8)	49,6	(44,0 - 55,3)
Une fois par jour et moins	16,3*	(10,7 - 24,2)	35,7	(26,5 - 46,0)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	33,6*	(24,4 - 44,1)	49,4	(39,3 - 59,6)
Non	27,3	(22,4 - 32,9)	45,2	(39,2 - 51,4)
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	27,9	(22,9 - 33,5)	50,1	(43,0 - 57,2)
Plus d'une fois par jour	41,5*	(25,9 - 59,0)	52,7*	(36,8 - 68,0)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	13,4**	(4,9 - 31,8)	38,7*	(23,3 - 56,8)
Non	30,9	(26,2 - 36,0)	49,8	(44,4 - 55,2)
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	32,2	(27,5 - 37,3)	50,9	(45,1 - 56,6)
Plus d'un an	9,5**	(4,4 - 19,3)	26,9*	(17,4 - 39,2)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 120 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de dents permanentes scellées parmi ceux ayant au moins une dent permanente présente, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Nombre de dents permanentes scellées	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
0	72,2 [†]	(67,7 - 76,8)	59,2	53,4 [†]	(48,7 - 58,5)	38,2
1 à 3	12,9	(9,8 - 15,8)	11,6	21,1	(17,2 - 25,0)	21,8
4 ou plus	14,9 [†]	(11,3 - 18,7)	29,3	25,5 [†]	(20,5 - 30,5)	40,1

[†] Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 121 Nombre moyen de dents permanentes scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	3,14 [†]	(2,94 - 3,32)	3,50	3,75	(3,46 - 4,04)	3,99
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	3,20	(2,90 - 3,48)		3,63	(3,23 - 4,04)	
Féminin	3,09	(2,83 - 3,31)		3,89	(3,41 - 4,37)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			p>0,05
Au moins le français	3,12	(2,91 - 3,36)		3,63	(3,24 - 4,04)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	3,09	(2,70 - 3,43)		3,89	(3,33 - 4,42)	
Ni le français, ni l'anglais	3,14	(2,70 - 3,56)		3,82*	(2,86 - 5,21)	
Non-réponse partielle ¹			1,4 %			0,5 %
Nombre d'enfants dans la maison			p>0,05			p>0,05
1 enfant	3,05	(2,62 - 3,42)		3,59	(2,92 - 4,28)	
2 enfants	3,22	(2,99 - 3,44)		3,92	(3,38 - 4,47)	
3 enfants	2,85	(2,40 - 3,29)		3,15	(2,59 - 3,64)	
4 enfants ou plus	3,34	(2,72 - 3,92)		4,24	(3,23 - 5,60)	
Non-réponse partielle ¹			2,7 %			1,5 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère			p=n.p.			p>0,05
Pas de diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.		3,68*	(2,42 - 5,23)	
Diplôme d'études secondaires	2,96	(2,50 - 3,46)		3,54	(2,44 - 4,52)	
Diplôme d'études postsecondaires	3,17	(2,95 - 3,37)		3,77	(3,45 - 4,08)	
Non-réponse partielle ¹			2,7 %			3,4 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 121 Nombre moyen de dents permanentes scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	3,28	(3,02 - 3,50)	4,14	(3,58 - 4,67)
Deux parents immigrants récents	3,15	(2,26 - 3,75)	2,98*	(1,70 - 4,21)
Autres combinaisons	2,98	(2,69 - 3,24)	3,56	(3,16 - 4,00)
Non-réponse partielle ¹			3,4 %	5,4 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	3,39	(3,11 - 3,64)	3,90	(3,38 - 4,44)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	2,96	(2,58 - 3,29)	3,85	(3,43 - 4,26)
Quartile 4 (défavorisé)	3,00	(2,55 - 3,44)	3,33	(2,78 - 3,91)
Non-réponse partielle ¹			12,3 %	8,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 121 Nombre moyen de dents permanentes scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	3,10	(2,73 - 3,41)	3,83	(3,38 - 4,30)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	3,07	(2,77 - 3,36)	3,74	(3,32 - 4,24)
Quartile 4 (défavorisé)	3,47	(2,91 - 3,88)	3,54	(2,92 - 4,11)
Non-réponse partielle ¹		12,3 %		8,3 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	3,23	(2,98 - 3,46)	3,96	(3,52 - 4,40)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	3,01	(2,53 - 3,47)	3,62	(3,17 - 4,12)
Quartile 4 (défavorisé)	3,11	(2,65 - 3,51)	3,48	(2,79 - 4,13)
Non-réponse partielle ¹		12,3 %		8,3 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	3,06	(2,77 - 3,33)	4,10	(3,59 - 4,53) a
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	3,34	(2,99 - 3,64)	3,76	(3,20 - 4,36)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	3,05	(2,74 - 3,37)	3,30	(2,87 - 3,70) a

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 121 Nombre moyen de dents permanentes scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent permanente scellée selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p>0,05			p<0,05
Aucun parent	3,17	(2,97 - 3,34)		3,86	(3,55 - 4,16)	a
Au moins un parent	2,58*	(1,43 - 3,67)		2,58*	(1,74 - 3,36)	a
Non-réponse partielle ¹			4,8 %			4,4 %
Assurance dentaire privée			p>0,05			p<0,05
Oui	3,19	(2,96 - 3,40)		4,08	(3,65 - 4,48)	a
Non	3,01	(2,63 - 3,33)		3,16	(2,81 - 3,62)	a
Non-réponse partielle ¹			2,7 %			3,4 %
Revenu le plus élevé des parents			p>0,05			p>0,05
Moins de 40 000 \$	3,10	(2,71 - 3,47)		3,24	(2,75 - 3,90)	
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	3,20	(2,83 - 3,56)		3,85	(3,24 - 4,45)	
75 000 \$ et plus	3,15	(2,84 - 3,45)		4,05	(3,51 - 4,58)	
Non-réponse partielle ¹			11,0 %			11,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 122 Proportion des types de dents parmi les dents permanentes scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents permanentes	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Premières molaires	99,9	(99,6 - 100,0)	99,8	75,4	(69,6 - 81,1)	79,1
Deuxièmes molaires	0,0**	(-)	0,0**	9,3*	(6,4 - 12,0)	8,9*
Premières prémolaires	0,1**	(0,0 - 0,4)	0,1**	9,9*	(6,3 - 13,4)	6,8
Deuxièmes prémolaires	0,0**	(-)	0,0**	5,4*	(3,3 - 8,0)	4,8
Incisives et canines	0,0**	(-)	0,1**	0,0**†	(-)	0,4**

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 123 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une molaire permanente scellée parmi ceux ayant au moins une molaire permanente présente selon la condition clinique, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Condition clinique	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune variable	27,9†	(23,4 - 32,6)	41,2	45,2†	(39,9 - 50,1)	61,3
Nombre de faces cariées au stade de carie 4 à 6, absentes ou obturées pour cause de carie, en dentition permanente (128 faces), parmi les élèves ayant au moins une face permanente présente ou absente pour cause de carie¹						
Aucune face	27,7	(23,0 - 32,9)	38,0	48,6	(41,0 - 55,9)	61,1
Au moins une face	29,2*	(16,6 - 42,0)	37,6	39,7	(32,0 - 47,6)	51,4

¹ Le test global du khi-deux n'est pas effectué pour les variables de croisement à deux modalités dans le cas d'une proportion. Seul le test empirique basé sur la différence de deux proportions est effectué.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 124 Nombre moyen de molaires permanentes scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une molaire permanente scellée, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
3,14	(2,94 - 3,32)	3,50	3,28 [†]	(3,05 - 3,48)	3,55

[†] Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 125 Proportion des types de dents parmi les dents scellées en dentitions combinées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Type de dents permanentes	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Premières molaires	94,2 [†]	(90,3 - 97,7)	97,9	75,3	(69,6 - 81,1)	78,7
Deuxièmes molaires	5,6 ^{†**}	(2,2 - 9,6)	1,8 [*]	9,4 [*]	(6,7 - 12,1)	9,5
Premières prémolaires	0,1 ^{**}	(0,0 - 0,4)	0,1 ^{**}	9,9 [*]	(6,3 - 13,4)	6,7
Deuxièmes prémolaires	0,0 ^{**}	(-)	0,0 ^{**}	5,4 [*]	(3,3 - 8,0)	4,7
Incisives et canines	0,0 ^{**}	(-)	0,1 ^{**}	0,0 ^{†**}	(-)	0,4 ^{**}

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

[†] Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 126 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent scellée en dentitions combinées, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
29,0 [†]	(24,0 - 34,1)	41,1	46,6 [†]	(41,5 - 51,3)	61,9

[†] Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 127 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le nombre de dents scellées en dentitions combinées, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Nombre de dents scellées	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
0	71,0	(65,9 - 76,0)	58,9	53,4	(48,7 - 58,5)	38,1
1 à 3	13,0	(9,6 - 16,3)	11,5	21,1	(17,2 - 25,0)	21,7
4 ou plus	16,0	(12,4 - 20,1)	29,6	25,5	(20,5 - 30,5)	40,3

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 128 Nombre moyen de dents scellées des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une dent scellée en dentitions combinées, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
3,31	(3,08 - 3,56)	3,56	3,76	(3,46 - 4,05)	4,02

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Annexe 5

Hygiène buccodentaire

Tableau 129 Score moyen des indices de débris, de tartre et d'hygiène buccodentaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Indice	2 ^e année			6 ^e année		
	Score moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Score moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Débris	1,39†	(1,33 - 1,47)	1,14	1,27†	(1,20 - 1,34)	0,96
Tartre	0,03†*	(0,02 - 0,04)	0,06	0,10	(0,07 - 0,12)	0,11
Hygiène buccodentaire	1,42†	(1,35 - 1,49)	1,20	1,37†	(1,29 - 1,44)	1,08

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du score moyen doit donc être interprétée avec prudence.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	Faible	6,7*†	(4,1 - 9,7)	16,6	10,8†	(7,6 - 14,3)	26,7
	Moyen	70,1	(64,7 - 75,0)	67,2	72,4†	(67,9 - 77,0)	63,4
	Élevé	23,2	(18,6 - 28,3)	16,2	16,8†	(12,8 - 20,6)	9,9
Variable sociodémographique							
Sexe				p=0,6757			p=0,0084
Masculin	Faible	6,3**	(2,9 - 10,3)		7,2**	(3,5 - 11,3)	
	Moyen	68,9	(61,6 - 75,2)		70,8	(63,8 - 77,4)	
	Élevé	24,8	(18,3 - 32,0)		22,0*	(15,5 - 28,9)	
Féminin	Faible	7,0*	(3,5 - 10,6)		14,4*	(9,3 - 20,0)	
	Moyen	71,4	(64,9 - 78,1)		73,9	(67,5 - 80,2)	
	Élevé	21,6	(15,8 - 28,0)		11,7*	(7,2 - 16,4)	
Groupe d'âge de la mère				p>0.05			p>0.05
Moins de 35 ans	Faible	4,1**	(1,5 - 10,6)		10,9**	(4,4 - 24,9)	
	Moyen	66,0	(56,6 - 74,3)		71,3	(53,0 - 84,5)	
	Élevé	30,0*	(21,5 - 40,1)		17,8**	(7,4 - 36,9)	
35 ans et plus	Faible	7,5*	(4,9 - 11,5)		11,3	(8,6 - 14,9)	
	Moyen	72,4	(66,2 - 77,8)		71,9	(67,3 - 76,1)	
	Élevé	20,1	(15,4 - 25,9)		16,70	(13,4 - 20,8)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison		p=0,2445		p=n.p.	
Au moins le français	Faible	5,6**	(2,5 - 9,1)	8,8*	(4,6 - 13,1)
	Moyen	73,1	(66,5 - 78,9)	74,7	(67,3 - 81,6)
	Élevé	21,3	(15,7 - 27,9)	16,6*	(10,5 - 23,5)
Au moins l'anglais, mais pas le français	Faible	8,7**	(3,4 - 15,5)	19,2*	(12,1 - 26,6)
	Moyen	71,5	(61,5 - 81,3)	67,6	(59,6 - 75,6)
	Élevé	19,8*	(12,1 - 28,0)	13,3*	(6,8 - 19,7)
Ni le français, ni l'anglais	Faible	7,0**	(1,2 - 13,3)	n.p.	n.p.
	Moyen	61,6	(50,6 - 72,6)	75,1	(64,8 - 85,2)
	Élevé	31,4*	(21,4 - 42,5)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle¹		1,9 %		1,3 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Nombre de faces	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison					
1 enfant	Faible	n.p.	n.p.	11,1**	(4,5 - 17,8)
	Moyen	79,4	(69,3 - 89,3)	75,3	(65,3 - 85,7)
	Élevé	n.p.	n.p.	13,6**	(6,3 - 20,8)
2 enfants	Faible	9,4**	(4,6 - 15,4)	11,6*	(7,1 - 16,1)
	Moyen	71,1	(63,6 - 77,8)	70,0	(63,9 - 76,2)
	Élevé	19,5	(13,8 - 25,6)	18,5*	(13,0 - 23,9)
3 enfants	Faible	4,6**	(0,9 - 9,2)	11,7**	(4,4 - 20,0)
	Moyen	62,9	(52,5 - 72,8)	75,4	(64,6 - 85,2)
	Élevé	32,5	(23,0 - 42,8)	12,9**	(5,7 - 21,3)
4 enfants ou plus	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	65,7	(46,3 - 82,7)	74,8	(59,4 - 88,9)
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				3,1 %	2,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	72,4	(54,9 - 88,8)	71,3	(55,1 - 86,5)
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études secondaires	Faible	n.p.	n.p.	9,7**	(3,2 - 17,7)
	Moyen	55,6	(41,6 - 69,7)	70,8	(58,2 - 84,6)
	Élevé	n.p.	n.p.	19,6**	(5,8 - 30,8)
Diplôme d'études postsecondaires	Faible	7,8*	(4,3 - 11,4)	12,4*	(8,4 - 16,6)
	Moyen	72,7	(66,5 - 78,2)	72,4	(66,8 - 77,9)
	Élevé	19,5	(14,7 - 24,7)	15,3	(11,1 - 19,3)
Non-réponse partielle¹				4,5 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	Faible	8,4*	(4,3 - 13,0)	17,9*	(11,2 - 24,6)
	Moyen	76,1	(69,3 - 82,4)	69,8	(62,4 - 77,3)
	Élevé	15,5*	(9,3 - 22,4)	12,3*	(6,4 - 18,4)
Deux parents immigrants récents	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	68,3	(52,0 - 83,2)	70,4	(56,5 - 86,9)
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Autres combinaisons	Faible	4,4**	(1,4 - 8,1)	7,8**	(3,7 - 12,9)
	Moyen	67,4	(59,8 - 74,7)	73,8	(66,6 - 80,5)
	Élevé	28,2	(21,6 - 34,9)	18,5*	(12,6 - 25,0)
Non-réponse partielle ¹				5,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Faible	3,1**	(0,5 - 6,4)	15,1*	(9,9 - 21,0)
	Moyen	76,8	(69,0 - 83,9)	72,2	(64,4 - 79,2)
	Élevé	20,1*	(12,7 - 28,0)	12,7*	(7,7 - 18,4)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Faible	7,9*	(3,9 - 12,5)	8,8**	(4,4 - 14,0)
	Moyen	69,9	(63,5 - 76,0)	70,8	(63,0 - 78,8)
	Élevé	22,2	(15,9 - 29,0)	20,4*	(13,4 - 27,2)
Quartile 4 (défavorisé)	Faible	11,7**	(3,6 - 20,8)	6,7**	(0,4 - 15,4)
	Moyen	57,5	(46,9 - 67,8)	76,6	(65,7 - 86,7)
	Élevé	30,8*	(21,7 - 40,9)	16,7**	(7,5 - 27,3)
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle		p=n.p.		p=0,0457	
Quartile 1 (favorisé)	Faible	14,5**	(6,6 - 22,8)	17,2*	(10,4 - 24,1)
	Moyen	75,5	(64,6 - 86,1)	73,7	(64,4 - 83,0)
	Élevé	10,0**	(3,3 - 17,7)	9,1**	(3,5 - 15,0)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Faible	5,3**	(2,2 - 9,0)	9,4*	(5,1 - 14,4)
	Moyen	68,1	(60,3 - 75,4)	69,7	(62,0 - 77,1)
	Élevé	26,6	(19,7 - 34,2)	20,9*	(13,8 - 27,7)
Quartile 4 (défavorisé)	Faible	n.p.	n.p.	7,8**	(2,4 - 14,9)
	Moyen	68,2	(58,1 - 77,4)	74,2	(65,1 - 82,4)
	Élevé	n.p.	n.p.	18,0*	(10,2 - 25,7)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %	
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale		p=0,0704		p=0,0227	
Quartile 1 (favorisé)	Faible	7,2**	(3,0 - 11,8)	16,3*	(10,5 - 22,5)
	Moyen	76,4	(68,8 - 84,5)	73,8	(66,5 - 81,0)
	Élevé	16,4*	(9,5 - 23,5)	9,9*	(5,0 - 14,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Faible	8,9**	(4,2 - 14,5)	7,1**	(3,3 - 11,4)
	Moyen	66,6	(57,2 - 75,0)	69,0	(58,7 - 79,1)
	Élevé	24,6*	(17,0 - 32,8)	23,9*	(13,9 - 34,1)
Quartile 4 (défavorisé)	Faible	4,7**	(0,6 - 9,8)	8,4**	(2,3 - 16,1)
	Moyen	66,1	(57,1 - 75,0)	73,8	(65,1 - 81,6)
	Élevé	29,2*	(20,9 - 38,0)	17,8*	(10,8 - 25,0)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])		p=0,0008		p=0,0392	
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	Faible	13,0**	(6,0 - 19,6)	16,0*	(9,9 - 21,9)
	Moyen	67,1	(58,1 - 76,0)	65,9	(57,8 - 73,8)
	Élevé	19,9*	(13,1 - 27,6)	18,1*	(11,5 - 25,9)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	Faible	4,9**	(1,1 - 9,5)	10,4**	(4,4 - 17,3)
	Moyen	82,0	(73,5 - 89,2)	67,3	(57,9 - 76,8)
	Élevé	13,0**	(5,4 - 22,0)	22,3*	(13,2 - 31,5)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	Faible	3,5**	(1,0 - 6,7)	7,3**	(2,7 - 13,7)
	Moyen	64,5	(55,9 - 72,6)	81,1	(73,6 - 87,6)
	Élevé	31,9	(23,5 - 41,0)	11,7*	(6,5 - 17,4)
Prestations de l'aide sociale		p=n.p.		p=n.p.	
Aucun parent	Faible	6,8*	(4,1 - 9,7)	12,1	(8,4 - 16,0)
	Moyen	72,0	(66,6 - 76,8)	71,3	(66,1 - 76,5)
	Élevé	21,2	(16,7 - 26,0)	16,7	(12,3 - 21,1)
Au moins un parent	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	62,0	(44,3 - 77,8)	80,0	(67,4 - 92,8)
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹		5,2 %		4,5 %	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Assurance dentaire privée					
Oui	Faible	8,4**	(4,3 - 13,6)	13,5*	(8,6 - 18,4)
	Moyen	71,5	(64,3 - 77,4)	74,2	(67,2 - 81,1)
	Élevé	20,1	(14,4 - 26,4)	12,3*	(7,4 - 17,6)
Non	Faible	5,7*	(2,5 - 8,8)	9,5*	(5,0 - 14,6)
	Moyen	70,3	(62,7 - 77,7)	69,6	(62,5 - 76,8)
	Élevé	24,0*	(16,9 - 31,8)	20,9	(14,6 - 27,2)
Non-réponse partielle ¹			7,4 %		6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	Faible	5,8**	(2,3 - 9,4)	9,9**	(5,0 - 15,8)
	Moyen	63,4	(55,7 - 70,6)	67,8	(60,3 - 75,1)
	Élevé	30,8	(23,2 - 39,5)	22,3	(15,7 - 28,5)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	Faible	4,5**	(1,2 - 9,0)	12,9**	(5,5 - 20,2)
	Moyen	80,2	(72,4 - 87,4)	74,4	(63,9 - 84,5)
	Élevé	15,3*	(8,8 - 22,2)	12,8**	(4,4 - 22,8)
75 000 \$ et plus	Faible	13,6*	(6,5 - 20,5)	14,0**	(6,4 - 22,8)
	Moyen	73,2	(63,2 - 83,6)	74,6	(63,8 - 84,6)
	Élevé	13,2**	(5,5 - 21,6)	11,4**	(4,9 - 18,5)
Non-réponse partielle ¹			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95%	%	I.C. à 95%
Variable buccodentaire					
Brossage des dents la veille de l'examen		p<0.05		p>0.05	
Deux fois par jour	Faible	7,5*	(5,0 - 11,1)	12,8*	(9,3 - 17,4)
	Moyen	73,8	(68,6 - 78,4)	72,5	(66,5 - 77,8)
	Élevé	18,7	(14,4 - 23,9) a	14,7	(10,9 - 19,5)
Une fois par jour et moins	Faible	3,9**	(1,6 - 8,8)	6,0**	(2,9 - 12,1)
	Moyen	63,2	(53,5 - 71,9)	74,1	(65,5 - 81,2)
	Élevé	33,0	(24,5 - 42,7) a	19,9*	(14,1 - 27,5)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen		p>0.05		p>0.05	
Oui	Faible	6,9**	(2,7 - 16,3)	12,9**	(7,5 - 21,3)
	Moyen	65,2	(54,3 - 74,7)	71,9	(61,8 - 80,1)
	Élevé	28,0*	(19,8 - 38,1)	15,3*	(9,9 - 22,8)
Non	Faible	7,15*	(4,8 - 10,6)	11,6*	(8,1 - 16,4)
	Moyen	73,1	(67,8 - 77,7)	72,2	(66,1 - 77,6)
	Élevé	19,8	(15,3 - 25,2)	16,2*	(10,0 - 21,6)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 130 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen		p>0.05		p>0.05	
Une fois par jour et moins	Faible	7,1*	(4,6 - 10,7)	11,6	(8,3 - 16,1)
	Moyen	73,4	(67,7 - 78,4)	73,3	(66,7 - 79,0)
	Élevé	19,6	(15,1 - 24,9)	15,1*	(10,8 - 20,7)
Plus d'une fois par jour	Faible	6,4**	(1,8 - 20,4)	18,6**	(8,9 - 34,8)
	Moyen	60,7	(43,7 - 75,5)	61,90	(44,5 - 76,8)
	Élevé	32,9**	(18,9 - 50,6)	19,5**	(8,2 - 39,7)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen		p>0.05		p>0.05	
Oui	Faible	8,4**	(2,1 - 28,4)	10,4**	(5,5 - 27,2)
	Moyen	65,5	(48,1 - 79,6)	58,5	(39,8 - 75,1)
	Élevé	26,0**	(13,7 - 43,9)	31,1**	(16,5 - 50,6)
Non	Faible	6,8*	(4,4 - 10,5)	11,8	(9,0 - 15,5)
	Moyen	71,0	(65,6 - 75,8)	74,0	(68,8 - 78,6)
	Élevé	22,2	(17,9 - 27,3)	14,1*	(10,4 - 19,0)
Visite chez le dentiste		p>0.05		p>0.05	
Un an et moins	Faible	6,9*	(4,3 - 10,7)	12,1	(9,3 - 15,6)
	Moyen	69,4	(63,6 - 74,7)	73,5	(68,9 - 77,6)
	Élevé	23,7	(19,0 - 29,2)	14,5	(11,1 - 18,6)
Plus d'un an	Faible	5,4**	(2,0 - 13,4)	7,6**	(2,7 - 17,8)
	Moyen	76,4	(64,8 - 85,1)	65,8	(54,4 - 75,6)
	Élevé	18,2**	(10,0 - 30,9)	27,1*	(18,1 - 38,4)

1 La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	Faible	n.p.	n.p.	98,0	95,4	(93,4 - 97,3)	94,9
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	
Variable sociodémographique							
Sexe				p=n.p.			p=n.p.
Masculin	Faible	n.p.	n.p.		95,2	(92,3 - 98,1)	
	Moyen	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	Élevé	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
Féminin	Faible	n.p.	n.p.		95,6	(92,2 - 98,5)	
	Moyen	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	Élevé	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison					
Au moins le français	Faible	n.p.	n.p.	94,0	(90,5 - 97,1)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Au moins l'anglais, mais pas le français	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ni le français, ni l'anglais	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				1,9 %	1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison					
1 enfant	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
2 enfants	Faible	n.p.	n.p.	96,2	(93,4 - 98,8)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
3 enfants	Faible	n.p.	n.p.	92,1	(85,2 - 97,9)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
4 enfants ou plus	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				3,1 %	2,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	Faible	n.p.	n.p.	87,4	(75,9 - 98,3)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études secondaires	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études postsecondaires	Faible	n.p.	n.p.	95,6	(92,9 - 98,0)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				4,5 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Deux parents immigrants récents	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Autres combinaisons	Faible	n.p.	n.p.	93,4	(90,0 - 96,6)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				5,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Faible	n.p.	n.p.	94,0	(90,2 - 97,2)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle					
Quartile 1 (favorisé)	Faible	n.p.	n.p.		
	Moyen	n.p.	n.p.		
	Élevé	n.p.	n.p.		
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Faible	n.p.	n.p.	94,2	(90,0 - 97,9)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Faible	n.p.	n.p.	96,0	(92,0 - 99,5)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
					p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	Faible	n.p.	n.p.	96,3	(92,6 - 99,6)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Faible	n.p.	n.p.	94,9	(90,5 - 98,6)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Faible	n.p.	n.p.	94,4	(89,8 - 98,9)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	Faible	n.p.	n.p.	92,5	(88,9 - 96,1)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	Faible	n.p.	n.p.	95,5	(93,3 - 97,4)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Au moins un parent	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				5,2 %	4,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 131 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le niveau d'accumulation de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau d'accumulation de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Assurance dentaire privée					
Oui	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non	Faible	n.p.	n.p.	93,1	(89,4 - 96,6)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			7,4 %		6,7 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	Faible	n.p.	n.p.	92,0	(87,7 - 96,1)
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
75 000 \$ et plus	Faible	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moyen	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Élevé	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	Aucune	n.p.	n.p.	1,5*	n.p.	n.p.	4,6
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	33,1	n.p.	n.p.	40,9
	1/3 aux 2/3 de la surface	49,6	(43,0 - 55,7)	49,0	56,1†	(51,5 - 60,4)	42,3
	Plus des 2/3 de la surface	37,6†	(31,6 - 44,0)	16,5	23,7†	(19,4 - 27,7)	12,2
Variable sociodémographique							
Sexe				p=n.p.			p=n.p.
Masculin	Aucune	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	1/3 aux 2/3 de la surface	49,3	(41,0 - 57,1)		55,5	(49,0 - 62,5)	
	Plus des 2/3 de la surface	39,1	(31,5 - 46,7)		28,4	(21,1 - 35,3)	
Féminin	Aucune	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	1/3 aux 2/3 de la surface	50,0	(42,3 - 57,8)		56,7	(48,8 - 63,5)	
	Plus des 2/3 de la surface	36,1	(29,3 - 43,6)		19,0	(14,0 - 24,6)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	50,7	(35,4 - 65,5)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	39,3*	(25,3 - 52,9)
Diplôme d'études secondaires	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	47,0	(33,7 - 59,5)	53,7	(39,7 - 67,4)
	Plus des 2/3 de la surface	46,9	(34,0 - 60,4)	27,2*	(13,4 - 40,7)
Diplôme d'études postsecondaires	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	52,2	(44,4 - 59,8)	57,5	(52,1 - 62,8)
	Plus des 2/3 de la surface	33,5	(26,9 - 40,7)	20,6	(15,8 - 25,3)
Non-réponse partielle¹					
				4,5 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	55,7	(45,0 - 65,9)	58,2	(50,4 - 65,4)
	Plus des 2/3 de la surface	34,0*	(23,5 - 44,5)	19,6*	(13,0 - 26,8)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	49,7	(41,4 - 57,2)	51,0	(45,2 - 56,8)
	Plus des 2/3 de la surface	37,4	(29,2 - 46,2)	29,0	(23,1 - 34,7)
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	39,6	(28,6 - 50,1)	69,1	(55,5 - 82,7)
	Plus des 2/3 de la surface	41,5*	(29,2 - 54,8)	16,4**	(6,3 - 26,9)
Non-réponse partielle ¹					
			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle				p=n.p.	p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	54,4	(41,8 - 66,7)	53,1	(41,3 - 64,6)
	Plus des 2/3 de la surface	25,3*	(15,7 - 35,9)	19,7*	(10,5 - 29,7)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	49,8	(39,9 - 58,8)	57,6	(49,6 - 65,5)
	Plus des 2/3 de la surface	38,0	(29,2 - 47,3)	22,8	(16,4 - 29,4)
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	46,3	(35,8 - 55,8)	56,8	(48,4 - 65,3)
	Plus des 2/3 de la surface	44,7	(34,3 - 55,5)	28,1	(19,3 - 37,1)
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	55,4	(44,5 - 65,9)	56,5	(47,7 - 64,4)
	Plus des 2/3 de la surface	30,8*	(21,2 - 40,9)	17,5*	(11,4 - 24,1)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	47,2	(37,1 - 56,6)	54,1	(44,2 - 63,3)
	Plus des 2/3 de la surface	37,5	(29,0 - 47,0)	28,7	(20,1 - 37,2)
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	46,3	(37,1 - 55,1)	58,6	(49,7 - 67,4)
	Plus des 2/3 de la surface	43,7	(33,6 - 54,3)	25,6*	(16,9 - 34,6)
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
				p=n.p.	p=n.p.
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	54,0	(41,9 - 64,9)	51,5	(42,7 - 59,7)
	Plus des 2/3 de la surface	27,8*	(18,5 - 39,0)	19,7*	(12,3 - 28,1)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	56,7	(43,2 - 70,0)	58,1	(50,1 - 65,9)
	Plus des 2/3 de la surface	32,9*	(19,5 - 46,7)	23,7*	(15,6 - 31,1)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	42,2	(33,7 - 50,0)	58,0	(50,9 - 65,6)
	Plus des 2/3 de la surface	47,3	(38,4 - 56,2)	26,7	(20,0 - 33,6)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	51,7	(44,7 - 58,0)	53,7	(48,8 - 58,5)
	Plus des 2/3 de la surface	34,6	(28,7 - 41,1)	23,6	(18,9 - 28,0)
Au moins un parent	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	72,2	(60,4 - 84,2)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	20,8**	(7,6 - 33,3)
Non-réponse partielle ¹			5,2 %		4,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Assurance dentaire privée					
Oui	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	49,5	(41,7 - 57,3)	53,1	(45,4 - 60,9)
	Plus des 2/3 de la surface	39,0	(31,6 - 47,1)	29,9	(22,7 - 37,1)
Non	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	51,6	(43,4 - 59,5)	58,7	(51,7 - 65,6)
	Plus des 2/3 de la surface	33,6	(25,7 - 41,8)	16,0*	(10,4 - 21,8)
Non-réponse partielle ¹				7,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 132 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de débris et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de débris	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	49,4	(40,8 - 57,2)	51,8	(44,5 - 59,3)
	Plus des 2/3 de la surface	40,3	(32,4 - 49,1)	32,8	(25,2 - 40,6)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	47,3	(38,6 - 55,9)	53,7	(42,7 - 64,2)
	Plus des 2/3 de la surface	39,6	(29,4 - 49,6)	19,2*	(10,2 - 29,6)
75 000 \$ et plus	Aucune	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	54,3	(41,6 - 68,1)	61,8	(50,3 - 73,6)
	Plus des 2/3 de la surface	24,4*	(13,7 - 35,8)	11,1**	(4,4 - 18,4)
Non-réponse partielle¹			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	Aucune	90,2 [†]	(87,0 - 93,2)	79,2	76,5	(70,6 - 82,0)	69,4
	Moins du 1/3 de la surface	5,4 ^{*†}	(2,9 - 8,2)	13,8	7,8 ^{*†}	(5,0 - 11,0)	20,1
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	6,4	13,1	(9,2 - 17,4)	9,3
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	0,7 ^{**}	2,6 ^{**}	(0,9 - 4,6)	1,2 [*]
Variable sociodémographique							
Sexe				p=n.p.			p=0,4604
Masculin	Aucune	90,9	(86,8 - 94,6)		73,2	(66,1 - 80,4)	
	Moins du 1/3 de la surface	5,0 ^{**}	(1,9 - 8,9)		8,7 [*]	(4,4 - 13,4)	
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.		15,6 [*]	(10,3 - 21,3)	
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.		2,4 ^{**}	(0,2 - 5,6)	
Féminin	Aucune	89,4	(85,5 - 93,4)		79,7	(72,2 - 86,5)	
	Moins du 1/3 de la surface	5,7 [*]	(2,6 - 8,9)		6,9 [*]	(3,7 - 10,9)	
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.		10,6 [*]	(5,3 - 16,8)	
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.		2,8 ^{**}	(0,3 - 5,7)	

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison					
Au moins le français	Aucune	92,0	(88,3 - 95,4)	76,4	(68,2 - 84,3)
	Moins du 1/3 de la surface	4,0**	(1,4 - 7,0)	5,8**	(2,4 - 9,8)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	13,9*	(7,6 - 21,1)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	3,8**	(0,8 - 7,3)
Au moins l'anglais, mais pas le français	Aucune	90,2	(83,8 - 95,8)	83,9	(73,8 - 92,5)
	Moins du 1/3 de la surface	6,4**	(1,3 - 12,2)	6,3**	(1,8 - 11,7)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ni le français, ni l'anglais	Aucune	86,4	(77,0 - 94,0)	67,1	(53,7 - 80,3)
	Moins du 1/3 de la surface	8,4**	(1,8 - 17,1)	12,4**	(5,0 - 21,5)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
			1,9 %		1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison					
1 enfant	Aucune	n.p.	n.p.	81,4	(71,2 - 91,1)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	6,2**	(0,7 - 12,2)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
2 enfants	Aucune	91,1	(86,8 - 95,0)	74,1	(66,3 - 81,5)
	Moins du 1/3 de la surface	4,3**	(1,6 - 7,2)	7,9**	(3,9 - 12,6)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
3 enfants	Aucune	88,6	(82,4 - 94,5)	n.p.	n.p.
	Moins du 1/3 de la surface	6,4**	(1,6 - 11,7)	n.p.	n.p.
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
4 enfants ou plus	Aucune	n.p.	n.p.	67,2	(48,6 - 86,1)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	14,3	(2,4 - 28,9)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				3,1 %	2,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	Aucune	n.p.	n.p.	64,7	(45,6 - 81,8)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	10,7**	(1,1 - 22,1)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études secondaires	Aucune	85,2	(75,2 - 93,6)	76,7	(63,8 - 88,8)
	Moins du 1/3 de la surface	7,2**	(0,9 - 15,2)	8,3**	(1,9 - 16,3)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études postsecondaires	Aucune	91,2	(88,0 - 94,3)	80,2	(74,3 - 85,7)
	Moins du 1/3 de la surface	5,1*	(2,7 - 7,7)	5,7**	(2,4 - 9,4)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	11,8*	(7,5 - 16,5)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	2,3**	(0,4 - 4,5)
Non-réponse partielle ¹				4,5 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	Aucune	93,1	(88,6 - 97,3)	88,5	(81,0 - 95,5)
	Moins du 1/3 de la surface	3,1**	(0,0 - 6,8)	3,9**	(0,6 - 7,4)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Deux parents immigrants récents	Aucune	n.p.	n.p.	52,0*	(30,4 - 76,3)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	15,0**	(1,0 - 29,4)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Autres combinaisons	Aucune	88,3	(82,9 - 93,0)	74,9	(67,2 - 82,8)
	Moins du 1/3 de la surface	6,6**	(2,9 - 11,3)	8,3*	(4,6 - 12,4)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	13,6*	(8,0 - 19,7)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	3,3**	(0,8 - 6,4)
Non-réponse partielle¹				5,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	84,1	(76,1 - 91,7)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	6,4**	(1,8 - 11,6)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	91,1	(86,2 - 95,5)	75,9	(68,0 - 83,0)
	Moins du 1/3 de la surface	5,6**	(1,9 - 9,7)	7,7**	(3,7 - 12,3)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	11,8*	(6,7 - 17,5)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	4,7**	(1,2 - 8,6)
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	55,7	(41,4 - 72,4)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	8,3**	(1,6 - 16,7)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle				p=n.p.	p=n.p.
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	89,6	(82,1 - 96,8)	80,1	(68,4 - 90,7)
	Moins du 1/3 de la surface	6,5**	(0,1 - 13,8)	4,6**	(0,2 - 10,5)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	93,0	(87,9 - 97,0)	73,0	(65,8 - 80,1)
	Moins du 1/3 de la surface	3,6**	(1,0 - 6,6)	7,8**	(3,6 - 12,3)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	15,7*	(9,8 - 21,9)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	3,5**	(0,5 - 7,3)
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	88,3	(81,0 - 94,8)	76,8	(66,8 - 86,9)
	Moins du 1/3 de la surface	6,3**	(1,0 - 13,5)	8,7**	(3,3 - 14,9)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	n.p.	n.p.	82,5	(73,9 - 90,5)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	5,3**	(1,0 - 10,3)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	89,5	(83,0 - 94,9)	75,2	(67,5 - 82,4)
	Moins du 1/3 de la surface	7,5**	(2,8 - 13,0)	9,4**	(4,0 - 15,7)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	90,0	(84,3 - 95,1)	68,7	(58,8 - 79,2)
	Moins du 1/3 de la surface	5,3**	(1,2 - 10,4)	7,3**	(2,8 - 12,6)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
				p=n.p.	p=n.p.
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	Aucune	90,4	(84,9 - 95,7)	82,7	(71,4 - 91,8)
	Moins du 1/3 de la surface	5,1**	(1,3 - 8,9)	7,5**	(2,7 - 13,1)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	Aucune	n.p.	n.p.	80,2	(68,6 - 90,7)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	5,5**	(0,9 - 11,1)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	Aucune	90,1	(85,1 - 94,5)	68,9	(58,5 - 79,1)
	Moins du 1/3 de la surface	5,5**	(1,7 - 10,1)	9,8**	(5,0 - 15,1)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	17,0*	(9,5 - 25,4)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	4,3**	(0,9 - 8,2)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	Aucune	91,0	(87,8 - 94,1)	79,7	(73,8 - 85,1)
	Moins du 1/3 de la surface	5,1*	(2,7 - 7,7)	6,5*	(3,5 - 9,9)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	10,8*	(6,6 - 15,1)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	3,1**	(1,1 - 5,4)
Au moins un parent	Aucune	84,2	(71,7 - 95,5)	60,7	(42,6 - 79,2)
	Moins du 1/3 de la surface	9,9**	(0,6 - 22,4)	13,1**	(2,3 - 26,1)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			5,2 %		4,5 %
Assurance dentaire privée					
Oui	Aucune	92,4	(88,3 - 96,1)	70,2	(61,5 - 78,5)
	Moins du 1/3 de la surface	4,1**	(1,4 - 7,3)	8,5*	(4,5 - 12,8)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	18,1*	(11,4 - 12,8)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	3,3**	(0,8 - 6,2)
Non	Aucune	87,7	(82,5 - 93,1)	86,6	(80,6 - 92,1)
	Moins du 1/3 de la surface	7,2**	(2,8 - 12,0)	4,9**	(1,4 - 8,8)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			7,4 %		6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 133 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la superficie de la face la plus recouverte de tartre et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Superficie de la face la plus recouverte de tartre	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	Aucune	88,5	(83,1 - 93,5)	64,0	(54,9 - 73,7)
	Moins du 1/3 de la surface	7,6**	(3,0 - 12,7)	10,8*	(5,6 - 16,4)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	21,5*	(14,5 - 28,5)
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	3,6**	(0,8 - 6,8)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	Aucune	n.p.	n.p.	86,1	(77,7 - 93,4)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	5,1**	(0,3 - 11,0)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
75 000 \$ et plus	Aucune	n.p.	n.p.	87,8	(79,6 - 95,5)
	Moins du 1/3 de la surface	n.p.	n.p.	4,7**	(0,7 - 9,5)
	1/3 aux 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Plus des 2/3 de la surface	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle¹			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 134 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon l'indice d'hygiène buccodentaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Indice d'hygiène buccodentaire	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Bon	36,1 [†]	(29,7 - 42,0)	57,7	42,3 [†]	(37,0 - 48,0)	64,4
Moyen	n.p.	n.p.	42,0	n.p.	n.p.	34,9
Médiocre	n.p.	n.p.	0,3 ^{**}	n.p.	n.p.	0,7 ^{**}

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Annexe 6

Maladies des gencives

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année			6 ^e année		
		%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	Aucune	22,8*	(15,2 - 31,3)	31,1	16,3*	(10,7 - 22,6)	19,1
	Légère	52,8	(46,5 - 59,1)	47,1	48,4	(42,4 - 54,4)	49,3
	Modérée	n.p.	n.p.	19,1	n.p.	n.p.	28,2
	Grave	n.p.	n.p.	2,7*	n.p.	n.p.	3,4
Variable sociodémographique							
Sexe				p=n.p.			p=n.p.
Masculin	Aucune	25,1*	(16,5 - 34,5)		11,4**	(6,2 - 17,8)	
	Légère	51,2	(43,6 - 59,1)		47,6	(40,3 - 55,1)	
	Modérée	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	Grave	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
Féminin	Aucune	20,5*	(11,8 - 29,9)		21,0*	(12,6 - 29,6)	
	Légère	54,5	(46,9 - 61,9)		49,1	(41,6 - 57,2)	
	Modérée	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	
	Grave	n.p.	n.p.		n.p.	n.p.	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison					
Au moins le français	Aucune	22,9*	(14,4 - 32,1)	11,4**	(5,9 - 18,7)
	Légère	52,0	(44,5 - 59,6)	55,1	(45,9 - 63,8)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Au moins l'anglais, mais pas le français	Aucune	22,1**	(10,8 - 34,1)	22,9**	(11,3 - 35,7)
	Légère	52,6	(41,8 - 63,9)	43,9	(35,4 - 52,6)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ni le français, ni l'anglais	Aucune	24,1**	(10,4 - 39,3)	19,8**	(9,9 - 31,8)
	Légère	52,7	(39,8 - 65,9)	35,8*	(24,7 - 49,5)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle¹					
			1,9 %		1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison					
1 enfant	Aucune	21,8**	(10,0 - 36,6)	14,7**	(6,4 - 23,9)
	Légère	53,8	(41,4 - 65,1)	49,5	(37,0 - 61,5)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
2 enfants	Aucune	26,2*	(16,1 - 36,6)	16,5*	(10,0 - 23,6)
	Légère	50,4	(42,0 - 59,0)	48,2	(40,9 - 55,2)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
3 enfants	Aucune	14,7**	(7,3 - 22,9)	17,6**	(7,3 - 29,6)
	Légère	62,1	(53,2 - 70,9)	49,9	(37,2 - 63,6)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
4 enfants ou plus	Aucune	29,5**	(12,8 - 48,3)	17,2**	(4,9 - 33,6)
	Légère	33,5*	(18,4 - 49,4)	41,4*	(23,5 - 62,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				3,1 %	2,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère					
Pas de diplôme d'études secondaires	Aucune	14,8**	(2,8 - 28,6)	15,2**	(4,2 - 28,4)
	Légère	48,6*	(27,3 - 69,2)	30,4**	(16,1 - 48,5)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études secondaires	Aucune	15,6**	(5,0 - 27,2)	15,1**	(6,4 - 26,1)
	Légère	47,0	(35,2 - 60,0)	52,1	(35,8 - 67,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études postsecondaires	Aucune	24,9*	(16,2 - 34,6)	16,4*	(9,4 - 24,6)
	Légère	53,3	(45,9 - 60,7)	50,5	(43,0 - 57,5)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			4,5 %		5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents					
Deux parents non-immigrants	Aucune	22,5*	(12,7 - 33,2)	17,4*	(9,2 - 26,8)
	Légère	46,9	(37,7 - 56,4)	49,5	(39,8 - 59,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Deux parents immigrants récents	Aucune	22,8**	(8,5 - 38,3)	n.p.	n.p.
	Légère	52,4	(35,6 - 68,4)	n.p.	n.p.
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Autres combinaisons	Aucune	23,0*	(14,5 - 32,6)	17,4*	(10,7 - 25,4)
	Légère	56,3	(47,9 - 65,0)	45,2	(37,4 - 53,6)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				5,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	22,5**	(10,2 - 37,1)	21,0**	(10,9 - 32,4)
	Légère	53,5	(40,7 - 65,6)	49,5	(40,2 - 59,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	24,4*	(14,2 - 35,0)	12,5*	(7,0 - 18,8)
	Légère	53,4	(44,5 - 62,2)	50,8	(43,1 - 58,7)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	22,1**	(9,3 - 36,8)	17,2**	(6,8 - 29,3)
	Légère	50,7	(37,5 - 63,5)	39,3*	(25,0 - 55,6)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique					
Indice régional de défavorisation matérielle					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	22,6**	(10,2 - 37,0)	17,8**	(7,7 - 28,5)
	Légère	53,8	(40,4 - 67,0)	57,7	(43,7 - 68,9)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	22,2*	(12,2 - 32,9)	16,5**	(8,9 - 25,3)
	Légère	54,5	(45,8 - 62,8)	46,1	(37,8 - 54,8)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	25,4*	(13,8 - 38,0)	14,9**	(7,8 - 23,6)
	Légère	49,7	(38,8 - 60,6)	45,3	(35,0 - 56,4)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale					
Quartile 1 (favorisé)	Aucune	20,7**	(9,4 - 34,4)	18,9**	(9,3 - 29,3)
	Légère	53,8	(42,2 - 64,7)	55,0	(46,0 - 64,5)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartiles 2 et 3 (moyen)	Aucune	28,0*	(15,4 - 40,5)	17,4**	(9,2 - 27,4)
	Légère	54,7	(42,7 - 67,2)	45,5	(35,0 - 56,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Quartile 4 (défavorisé)	Aucune	21,0**	(11,1 - 32,2)	11,7**	(5,2 - 19,4)
	Légère	49,9	(41,0 - 58,7)	44,5	(34,1 - 55,9)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			9,9 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])					
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	Aucune	26,8**	(11,3 - 43,1)	21,0**	(9,5 - 32,9)
	Légère	57,6	(44,4 - 70,4)	47,3	(37,6 - 56,9)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	Aucune	25,5**	(6,8 - 45,9)	16,0**	(5,4 - 28,3)
	Légère	45,7*	(31,3 - 60,5)	50,7	(38,3 - 62,9)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	Aucune	18,4*	(10,1 - 27,8)	13,0**	(6,0 - 21,4)
	Légère	54,1	(46,1 - 691,3)	47,3	(38,6 - 56,2)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale					
Aucun parent	Aucune	24,7*	(16,3 - 33,9)	16,8*	(10,8 - 23,6)
	Légère	52,0	(45,1 - 58,7)	48,3	(42,0 - 54,8)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Au moins un parent	Aucune	11,4**	(2,0 - 23,9)	12,8**	(2,0 - 26,8)
	Légère	56,7	(40,1 - 73,4)	49,3*	(31,9 - 70,1)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹			5,2 %		4,5 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Assurance dentaire privée					
Oui	Aucune	25,1*	(14,5 - 35,9)	18,3*	(10,0 - 27,4)
	Légère	48,3	(39,7 - 57,3)	49,8	(41,2 - 58,5)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non	Aucune	19,3*	(11,9 - 27,8)	13,4*	(8,0 - 19,7)
	Légère	57,5	(49,1 - 65,1)	49,3	(40,3 - 58,6)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹				7,4 %	6,7 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 135 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon le plus haut niveau de gravité de la gingivite et les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	Niveau de gravité de la gingivite	2 ^e année		6 ^e année	
		%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Revenu le plus élevé des parents					
Moins de 40 000 \$	Aucune	21,2*	(13,0 - 30,4)	14,2*	(8,0 - 21,0)
	Légère	53,5	(45,5 - 61,7)	44,3	(35,8 - 54,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	Aucune	20,3**	(9,9 - 32,7)	19,3**	(8,6 - 31,0)
	Légère	54	(42,6 - 65,2)	45,5	(34,1 - 57,7)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
75 000 \$ et plus	Aucune	28,8**	(13,9 - 44,4)	18,5**	(7,5 - 31,0)
	Légère	51,7	(38,1 - 65,1)	53,4	(39,7 - 66,0)
	Modérée	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Grave	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle¹			10,9 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 136 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire présentant un saignement gingival, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
24,4	(19,4 - 29,7)	21,8	35,4	(28,2 - 42,3)	31,6

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 137 Score moyen pour l'indice gingival des élèves de 2^e et 6^e année du primaire, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

2 ^e année			6 ^e année		
Score moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Score moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
0,62 [†]	(0,52 - 0,71)	0,48	0,72 [†]	(0,61 - 0,82)	0,58

[†] Valeur significativement différente de celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Annexe 7

Traumatismes dentaires

Tableau 138 Nombre moyen d'incisives permanentes fracturées ou perdues à la suite d'un traumatisme dentaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant fracturé ou perdu au moins une incisive permanente à la suite d'un traumatisme selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Reste du Québec
Aucune	1,55	(1,24 - 1,87)	1,26	1,51	(1,28 - 1,72)	1,43
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	1,73*	(1,06 - 2,41)		1,68	(1,37 - 2,00)	
Féminin	1,44	(1,12 - 1,69)		1,28	(1,04 - 1,56)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p>0,05			p>0,05
Au moins le français	1,40*	(1,00 - 1,95)		1,42	(1,15 - 1,70)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	1,39*	(1,00 - 2,25)		1,29	(1,06 - 1,53)	
Ni le français, ni l'anglais	1,59	(1,00 - 2,00)		1,96*	(1,37 - 2,69)	
Non-réponse partielle ¹			6,5 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 138 Nombre moyen d'incisives permanentes fracturées ou perdues à la suite d'un traumatisme dentaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant fracturé ou perdu au moins une incisive permanente à la suite d'un traumatisme selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	1,72*	(1,00 - 2,51)	1,33	(1,10 - 1,62)
2 enfants	1,51	(1,13 - 2,02)	1,62	(1,20 - 2,08)
3 enfants	1,00	(1,00 - 1,00)	1,35	(1,13 - 1,58)
4 enfants ou plus	n.p.	n.p.	1,64*	(1,00 - 2,39)
Non-réponse partielle ¹				
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	1,57	(1,13 - 2,00)
Diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	1,53*	(1,00 - 2,18)
Diplôme d'études postsecondaires	1,42	(1,07 - 1,87)	1,48	(1,20 - 1,75)
Non-réponse partielle ¹				

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 138 Nombre moyen d'incisives permanentes fracturées ou perdues à la suite d'un traumatisme dentaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant fracturé ou perdu au moins une incisive permanente à la suite d'un traumatisme selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	1,00	(1,00 - 1,00)	1,45	(1,12 - 1,84)
Deux parents immigrants récents	n.p.	n.p.	1,77**	(1,00 - 3,04)
Autres combinaisons	1,75*	(1,24 - 2,35)	1,46	(1,20 - 1,79)
Non-réponse partielle ¹				
		6,5 %		10,3 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	1,37*	(1,00 - 1,98)	1,70	(1,27 - 2,06)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	1,59*	(1,00 - 2,27)	1,20	(1,05 - 1,36)
Quartile 4 (défavorisé)	n.p.	n.p.	1,81*	(1,04 - 2,39)
Non-réponse partielle ¹				
		12,9 %		9,0 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 138 Nombre moyen d'incisives permanentes fracturées ou perdues à la suite d'un traumatisme dentaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant fracturé ou perdu au moins une incisive permanente à la suite d'un traumatisme selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
Quartile 1 (favorisé)	1,16	(1,00 - 1,51)	1,46	(1,08 - 1,86)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	1,78*	(1,14 - 2,33)	1,57*	(1,20 - 2,09)
Quartile 4 (défavorisé)	1,31*	(1,00 - 1,85)	1,46	(1,19 - 1,70)
Non-réponse partielle ¹		12,9 %		9,0 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				
Quartile 1 (favorisé)	1,51*	(1,04 - 2,07)	1,57	(1,21 - 1,91)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	1,28**	(1,00 - 2,09)	1,36	(1,15 - 1,60)
Quartile 4 (défavorisé)	1,63*	(1,00 - 2,00)	1,62*	(1,07 - 2,24)
Non-réponse partielle ¹		12,9 %		9,0 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	1,67*	(1,05 - 2,27)	1,49	(1,08 - 1,87)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	1,54*	(1,00 - 2,00)	1,65	(1,16 - 2,13)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	1,40	(1,00 - 1,78)	1,41	(1,18 - 1,64)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 138 Nombre moyen d'incisives permanentes fracturées ou perdues à la suite d'un traumatisme dentaire des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant fracturé ou perdu au moins une incisive permanente à la suite d'un traumatisme selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	1,43	(1,13 - 1,79)	1,53	(1,29 - 1,77)
Au moins un parent	n.p.	n.p.	1,34*	(1,00 - 1,85)
Non-réponse partielle ¹				
			3,2 %	3,8 %
Assurance dentaire privée				
Oui	1,28*	(1,00 - 1,71)	1,43	(1,12 - 1,72)
Non	1,61*	(1,06 - 2,21)	1,38	(1,17 - 1,64)
Non-réponse partielle ¹				
			9,7 %	10,3 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	1,76	(1,26 - 2,24)	1,56	(1,24 - 1,88)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	1,35*	(1,00 - 2,15)	1,33	(1,00 - 1,67)
75 000 \$ et plus	1,00	(1,00 - 1,00)	1,36*	(1,00 - 2,06)
Non-réponse partielle ¹				
			9,7 %	12,8 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 139 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	5,8*	(3,3 - 8,6)	6,9	16,9†	(13,5 - 20,5)	26,3
Sexe						
Masculin	4,3**	(1,6 - 7,2)		19,0*	(13,0 - 25,1)	
Féminin	7,3**	(3,5 - 11,7)		14,8*	(10,1 - 19,9)	
Groupe d'âge de la mère						
Moins de 35 ans	5,3**	(2,1 - 12,6)		22,2**	(10,6 - 40,6)	
35 ans et plus	5,9*	(3,7 - 9,3)		15,5	(12,3 - 19,5)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,8553			p=0,6872
Au moins le français	4,9**	(2,0 - 8,0)		16,1	(11,6 - 20,9)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	6,3**	(2,4 - 11,1)		16,7*	(10,1 - 23,4)	
Ni le français, ni l'anglais	5,6**	(0,0 - 13,6)		19,8*	(11,9 - 28,5)	
Non-réponse partielle ¹			1,9 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 139 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
1 enfant	7,3**	(1,3 - 14,4)	17,5*	(9,3 - 26,1)
2 enfants	5,5**	(2,1 - 9,9)	16,1	(11,1 - 21,0)
3 enfants	3,5**	(0,1 - 7,8)	17,5*	(9,8 - 25,0)
4 enfants ou plus	n.p.	n.p.	19,6**	(5,1 - 35,3)
Non-réponse partielle ¹			3,1 %	2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
Pas de diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	15,3**	(5,2 - 27,9)
Diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	20,9*	(10,6 - 32,2)
Diplôme d'études postsecondaires	5,3*	(2,9 - 7,9)	15,5	(11,6 - 19,7)
Non-réponse partielle ¹			4,5 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 139 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	6,1**	(2,2 - 10,6)	16,7*	(10,8 - 23,5)
Deux parents immigrants récents	n.p.	n.p.	34,2*	(17,3 - 49,1) a
Autres combinaisons	5,7**	(2,2 - 9,8)	13,2*	(8,6 - 18,1) a
Non-réponse partielle ¹			5,4 %	6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	8,1**	(2,9 - 13,8)	16,2*	(10,0 - 23,3)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	4,1**	(1,3 - 7,4)	15,2*	(9,8 - 20,8)
Quartile 4 (défavorisé)	n.p.	n.p.	26,0*	(13,0 - 38,5)
Non-réponse partielle ¹			9,9 %	7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 139 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Variable socioéconomique				
Indice régional de défavorisation matérielle				
				p=0,3487
Quartile 1 (favorisé)	8,1**	(2,4 - 14,0)	18,9*	(11,3 - 27,3)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	5,3**	(2,1 - 8,8)	16,6*	(11,1 - 22,6)
Quartile 4 (défavorisé)	3,9**	(0,3 - 7,9)	16,5*	(9,9 - 24,0)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale				p=0,7488
				p=0,3747
Quartile 1 (favorisé)	7,4**	(3,2 - 11,7)	15,5*	(10,7 - 21,5)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	5,1**	(1,4 - 9,6)	18,7*	(11,5 - 25,5)
Quartile 4 (défavorisé)	3,8**	(0,3 - 8,4)	17,3*	(10,3 - 24,7)
Non-réponse partielle ¹		9,9 %		7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])				p=0,3238
				p=0,4564
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	7,8**	(3,8 - 12,0)	13,2*	(7,8 - 18,8)
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	6,4**	(0,0 - 14,0)	17,6*	(11,3 - 23,9)
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	4,0**	(1,4 - 7,0)	19,1*	(13,4 - 25,2)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 139 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Prestations de l'aide sociale			p>n.p.			p>0,05
Aucun parent	6,0*	(3,4 - 9,0)		16,9	(12,9 - 21,1)	
Au moins un parent	n.p.	n.p.		18,7**	(7,4 - 32,2)	
Non-réponse partielle ¹			5,1 %			4,5 %
Assurance dentaire privée			p>0,05			p<0,05
Oui	5,7**	(2,2 - 9,7)		11,7*	(7,5 - 16,2)	a
Non	5,4**	(2,0 - 9,3)		21,1	(15,7 - 26,6)	a
Non-réponse partielle ¹			7,2 %			6,7 %
Revenu le plus élevé des parents			p=0,8308			p=0,0022
Moins de 40 000 \$	5,5**	(2,2 - 9,4)		24,3	(18,0 - 30,2)	ab
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	6,6**	(2,1 - 11,4)		12,2**	(5,1 - 19,5)	a
75 000 \$ et plus	5,0**	(1,1 - 9,7)		10,5**	(4,5 - 17,1)	b
Non-réponse partielle ¹			10,7 %			13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 139 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant au moins une incisive permanente fracturée ou perdue à la suite d'un traumatisme dentaire parmi ceux ayant au moins une incisive permanente présente ou perdue selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95 %	Nombre moyen	I.C. à 95 %
Variable buccodentaire				
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	6,5*	(4,0 - 10,2)	17,8	(14,0 - 22,3)
Une fois par jour et moins	3,06**	(1,1 - 8,6)	16,4*	(10,4 - 24,8)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	8,3**	(3,1 - 20,4)	17,5*	(11,1 - 26,4)
Non	4,4**	(2,5 - 7,7)	17,0*	(12,5 - 22,8)
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	6,0**	(3,4 - 9,7)	17,7	(13,5 - 22,8)
Plus d'une fois par jour	9,1**	(2,7 - 26,7)	13,9**	(6,4 - 27,6)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	4,7**	(1,1 - 18,2)	20,4**	(8,4 - 41,7)
Non	5,0**	(3,0 - 8,2)	16,5	(13,0 - 20,6)
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	5,7*	(3,7 - 8,8)	15,2	(11,7 - 19,6)
Plus d'un an	4,3**	(1,3 - 13,4)	26,4*	(18,1 - 36,8)

[†] La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Annexe 8

Fluorose dentaire

Tableau 140 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Aucune	12,8†*	(8,8 - 16,9)	6,2	11,2*	(7,6 - 15,0)	9,0
Variable sociodémographique						
Sexe			p>0,05			p>0,05
Masculin	12,6*	(7,1 - 18,7)		11,5*	(6,2 - 17,6)	
Féminin	13,0*	(7,8 - 18,8)		10,9*	(6,2 - 16,0)	
Groupe d'âge de la mère			p>0,05			p>0,05
Moins de 35 ans	16,9*	(10,9 - 25,3)		12,7**	(4,4 - 31,7)	
35 ans et plus	12,0*	(8,3 - 16,9)		11,3	(7,9 - 15,8)	
Langue(s) la(les) plus souvent parlée(s) à la maison			p=0,3651			p=0,2581
Au moins le français	10,3*	(5,9 - 15,4)		8,6*	(4,6 - 13,1)	
Au moins l'anglais, mais pas le français	15,2*	(8,6 - 22,8)		12,9**	(5,7 - 22,0)	
Ni le français, ni l'anglais	15,7**	(6,3 - 26,5)		16,4**	(7,0 - 25,5)	
Non-réponse partielle ¹			2,2 %			1,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 140 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Nombre d'enfants dans la maison				
				p=0,2114
1 enfant	n.p.	n.p.	6,5**	(0,6 - 13,0)
2 enfants	13,3*	(8,0 - 19,3)	14,6*	(8,3 - 21,2)
3 enfants	16,2**	(7,1 - 25,3)	8,3**	(1,8 - 16,0)
4 enfants ou plus	n.p.	n.p.	10,5**	(0,9 - 23,3)
Non-réponse partielle ¹			3,4 %	2,7 %
Plus haut niveau de scolarité de la mère				
				p=n.p.
Pas de diplôme d'études secondaires	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Diplôme d'études secondaires	15,8**	(4,6 - 29,1)	9,6**	(1,2 - 20,0)
Diplôme d'études postsecondaires	12,5*	(8,4 - 16,8)	13,3*	(8,7 - 18,1)
Non-réponse partielle ¹			4,1 %	5,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 140 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Statut d'immigration des parents				
Deux parents non-immigrants	10,8*	(5,8 - 16,2)	9,8**	(4,4 - 16,2) a
Deux parents immigrants récents	15,0**	(4,8 - 26,7)	30,3*	(14,3 - 44,8) ab
Autres combinaisons	13,8*	(7,1 - 21,2)	10,5*	(6,0 - 15,0) b
Non-réponse partielle ¹		5,8 %		6,7 %
Indice régional de défavorisation sociale				
Quartile 1 (favorisé)	17,7*	(10,5 - 25,6)	14,1**	(6,2 - 21,9)
Quartiles 2 et 3 (moyen)	10,6*	(5,5 - 16,2)	10,9*	(5,9 - 16,5)
Quartile 4 (défavorisé)	12,1**	(2,3 - 23,0)	9,5**	(1,3 - 20,3)
Non-réponse partielle ¹		10,8 %		7,6 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 140 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %		%	I.C. à 95 %	
Variable socioéconomique						
Indice régional de défavorisation matérielle						
			p=0,0253			p=0,2123
Quartile 1 (favorisé)	7,4**	(2,3 - 13,3)	a	15,1**	(5,3 - 25,8)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	11,6*	(6,4 - 17,8)		14,0*	(7,5 - 21,4)	
Quartile 4 (défavorisé)	20,8*	(11,0 - 30,1)	a	6,4**	(1,7 - 12,4)	
Non-réponse partielle ¹			10,8 %			7,6 %
Indice régional de défavorisation matérielle et sociale			p=0,5099			p=0,2995
Quartile 1 (favorisé)	10,1*	(5,2 - 15,9)		15,5**	(7,4 - 24,2)	
Quartiles 2 et 3 (moyen)	15,5**	(7,6 - 24,4)		11,3**	(5,2 - 17,9)	
Quartile 4 (défavorisé)	14,5**	(5,7 - 25,0)		8,0**	(2,9 - 14,1)	
Non-réponse partielle ¹			10,8 %			7,6 %
Indice de défavorisation de l'école (Indice de milieu socioéconomique de l'école [IMSE])			p=0,4491			p=0,1403
Déciles 1, 2, 3 et écoles privées (favorisé)	10,1*	(5,5 - 15,1)		11,9*	(5,9 - 18,7)	
Déciles 4, 5, 6 et 7 (moyen)	11,4**	(4,0 - 19,7)		15,9**	(6,4 - 25,4)	
Déciles 8, 9 et 10 (défavorisé)	15,4*	(8,3 - 22,7)		7,1**	(2,9 - 12,2)	

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 140 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	%	I.C. à 95 %	%	I.C. à 95 %
Prestations de l'aide sociale				
Aucun parent	13,6*	(9,2 - 18,3)	11,9*	(7,8 - 16,4)
Au moins un parent	10,8**	(2,5 - 22,1)	n.p.	n.p.
Non-réponse partielle ¹		5,6 %		4,5 %
Assurance dentaire privée				
Oui	12,0*	(6,9 - 17,9)	11,4**	(6,0 - 17,8)
Non	15,7*	(9,2 - 22,1)	12,4*	(7,4 - 17,6)
Non-réponse partielle ¹		7,8 %		6,7 %
Revenu le plus élevé des parents				
Moins de 40 000 \$	14,5*	(8,2 - 20,9)	11,7*	(6,6 - 17,1)
Entre 40 000 \$ et 74 999 \$	14,1**	(7,2 - 22,0)	10,6**	(3,8 - 18,1)
75 000 \$ et plus	10,6**	(4,2 - 18,7)	11,2**	(4,4 - 20,1)
Non-réponse partielle ¹		10,8 %		13,3 %

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 140 Proportion des élèves de 2^e et 6^e année du primaire ayant de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure selon les caractéristiques, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013 (suite)

Variable de croisement	2 ^e année		6 ^e année	
	Nombre moyen	I.C. à 95%	Nombre moyen	I.C. à 95%
Variable buccodentaire				
Brossage des dents la veille de l'examen				
Deux fois par jour	12,6*	(9,0 - 17,4)	11,1*	(7,4 - 16,5)
Une fois par jour et moins	13,4*	(5,6 - 25,5)	12,7*	(7,8 - 19,8)
Utilisation de la soie dentaire la veille de l'examen				
Oui	13,9**	(6,4 - 25,00)	9,0**	(4,7 - 16,5)
Non	13,1*	(8,9 - 18,9)	12,7*	(8,8 - 18,0)
Nombre de collations sucrées par jour la semaine précédant l'examen				
Une fois par jour et moins	12,1*	(8,6 - 16,7)	11,5*	(7,4 - 17,5)
Plus d'une fois par jour	12,2**	(4,2 - 30,4)	8,7**	(2,9 - 23,1)
Prise de collations sucrées au coucher la veille de l'examen				
Oui	7,0**	(1,8 - 23,6)	3,3**	(0,5 - 18,4)
Non	12,2*	(8,5 - 17,1)	11,8*	(8,2 - 16,9)
Visite chez le dentiste				
Un an et moins	11,9*	(8,2 - 16,9)	9,0*	(5,6 - 14,0)
Plus d'un an	16,7**	(8,2 - 31,0)	23,1*	(15,4 - 33,1)

¹ La non-réponse partielle de la variable de croisement est calculée sur les répondants visés par l'indicateur.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

† Valeur significativement différente de celle du Québec, au seuil de 5 %.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Note : Deux modalités statistiquement différentes au seuil de 5 % sont identifiées par une lettre commune.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.

Tableau 141 Répartition des élèves de 2^e et 6^e année du primaire selon la gravité de la fluorose dentaire sur les incisives permanentes supérieures parmi ceux ayant au moins une incisive permanente supérieure, ÉCSBQ-Montréal 2012-2013

Niveau de gravité de la fluorose	2 ^e année			6 ^e année		
	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)	%	I.C. à 95 %	Reste du Québec (%)
Sans fluorose	n.p.	n.p.	80,2	n.p.	n.p.	79,9
Discutable	n.p.	n.p.	12,0	n.p.	n.p.	10,6
Très léger	n.p.	n.p.	7,1	n.p.	n.p.	8,3
Léger	n.p.	n.p.	0,6**	n.p.	n.p.	1,0*
Modéré	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Sévère	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur du nombre moyen doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur du nombre moyen n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.p. : Non présentée. Certaines cellules ont moins de cinq répondants entraînant le masquage de la donnée pour des raisons de confidentialité.

Source : Infocentre de santé publique, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013*.